



Ex Libris.

HIPPOCRATES II

pequeños

Sucedaneo ventajoso del
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO

Iodo-Tánico

de las enfermedades
POTLOGIA :
Infección
anchurilla contiene 5 grs.
Dosis :
2 a 5 cucharillas diarias

DIADERMINE

Nuevo Excipiente
- para POMADAS

soluble en agua

No contiene ni cuers
grasos ni polvos
o mancha la ro
Adhiere perfectamen
la superficie
Es absorbida por
piel de modo nota
Se vende en pomos
60, 125, 250, 500 gr. y 1

Reemplaza
con gran ventaja la
Vaselina, la Lanolina
y otros cuerpos
grasos en la prepa-
ración de las
pomadas, ungentos,
etc., etc.
Inalterable
Estéril

Lecitina Lemaitre

ESPECIFICO
- - - DE LA - -
Demineralización fosforada

Enfermedades conmuti
en general
Tuberculosis, Apen
Raquitismo, Neurast
y Afecciones nervi
del crecimiento
Debilidad y convalece
POSOLOGIA : 1 cucharad
contiene 0 gr. 10 lecitina
Niños : 2 a 3 cucharad
Adultos : 6 a 10 -

LA
LECITINA
es un
producto muy frágil
La forma
granulada de Lemaitre
preparado con cacao
la hace
INALTERABLE

Arsiquina Lemaitre

COMBINACIÓN
de Clorhidrato neutro
y de Metilarsinato
disódico

Indicaciones :
PALUDISMO
y sus complicaci
Fiebres intermiten
Neuralgias
Anemia palustri
Niños :
Adultos :
De 2 a 4 pildoras
De 4 a 12 pildoras

PILDORAS
conteniendo
Clorhidrato neutro de
quina... 0 gr. 10 c.
Metilarsinato disódico
0 gr. 005 m.
En más eficaz
de los
preparados
de quina

Literatura y Muestras a la disposición de los Señores Médicos.
M. PETOLLE, 2, rue du Faub^o-St-Denis, PARIS. Por Mayor: BONETTI FRÈRES, 12, rue Vavin, PARIS y



95300
HIPPOCRATIS

APHORISMI,

ATQUE PRÆSAGIA

LATINE VERSA

CUM RECOGNITIONE, ET NOTIS

ANDREÆ PASTÆ

BERGOMATIS.

EDITIO ALTERA AB AUCTORE
emendata, & observationibus quamplu-
rimis medicis aucta.

ACCEDUNT HUIC IPSI EDITIONI
*Prolegomena, in quibus de Aphorismorum, Præ-
sagiorumque auctore, de utrorumque scriptorum
præstantia, deque sententiarum in eisdem
contentarum usu, differitur.*

VALENTIÆ: Typis Salvatoris Fauli, juxta Regale
Collegium Corporis Christi.
M. DCC. LXXIII.



Hippocrates toto vitæ tempore, dum alia multa opera scriberet, sententias, quæ occurrebant dignæ, ut in omnium studiosorum ore essent, utpote verissimæ, & cum ratione, tum etiam experimento confirmatissimæ, in quacumque medicinæ parte essent, excipiebat, exceptasque omnes in hoc opus Aphorismorum congesit: quas ego perinde memoriter discere discipulis meis suadeo. Nam ita nulla in parte præceptorum medicinæ erunt inopes. *Vallesius, comm. sect. I. aph. Hipp. I.*

Quemadmodum Hippocrati summa semper apud medicorum filios fuit auctoritas: ita inter opera, quæ posteritati reliquit, Aphorismi maxime, aurei sane illi, rotundi, & ab omnibus medicæ artis cultoribus memoriæ merito imprimendi, solent commendari. *Aët. Erudit. ann. 1684. pag. 429.*



P R Æ F A T I O.

CUm ea quæ in aphorismos scribuntur, idest contractis brevibus, concisisque sententiis enarrantur, obscura ferme sint, atque ambigua, nec paucis verbis explicari satis, dividique queant: operam dedi, ut Hippocratis aphorismos, atque præsagia, quæ semel edidi strictim exposita, paulo plenius explanata iterum pervulgarem. Secutus igitur ordinem in prima editione servatum ad singulos aphorismos, singulaque præsagia explicationem postulantia, notas apposui, productiones quidem ad ea, quæ majorem in medendo usum, atque utilitatem habent, contractiones, quæ minorem. Ideoque de ea medicinæ parte ubi disputatur, quæ quia ad alendos egrotantes pertinet, diætetices appellatur, cum apud nos hodie minus excolatur subtilius, neque ad curanda, ut Hippocrates consueverat, febricitantium corpora, sed ad eadem conservanda tantummodo præscribatur; nihil præter veteres notas, quibus satis ea res explicatur, addendum esse existimaui. Neque uberiores ibi explicationem adhibui, morbi indicantur cuique ætati, annique tempori, aerisque familiares statui; descriptionem morborum notis jam exstantibus comprehensam sufficere posse ratus, ne scilicet, aut non necessariis, aut etiam commentitiis, inanibusque sententiis magnitudo voluminis cresceret, quæ rejicere sola per se plurimos consuevi.

Reliqua vero loca, unde aut propria morborum signa sumuntur, aut auxilia petuntur morborum, aut signa præsangiendi futura per morbos emanant; fusiori interpretatione conatus sum aperire, nonnullas
emen-

emendando notas, plurimas augendo, novas etiam apponendo plurimas, conquisitis undique, electisque medicis præceptis, ac monitis. Quorum sane maximam partem ex ipsius medicinæ parentis Hippocratis, ejusque interpretum principum libris excerpti, cætera vero ex quotidiana mea observatione deprompsi, longoque usu artis. Aliquot præterea morborum historias adjunxi, perspicua brevitate exaratas, omnique prorsus ratiocinatione remota, ut ipsa re, veritas exquiratur, naturæque mutationes pernoscantur, ac motus.

Mibi namque quammaxime cavendum esse proposui, ne physiologicas disputationes in notas invehrem meas; tum quia causarum investigatio, quæ ex conjectura pendent perdifficili, ac lubrica, spem sæpe fallit, tum quia Hippocratis instituto, morique consentaneum esse duxi, si opinionum comentis, quæ dies delet, rejectis, tanti viri dogmata infinito labore, naturæque assidua notatione parta, ejusdem naturæ judiciis, animadversionibusque explanarem, quæ nullis seculorum ætatibus mutantur. Quibus credibiliter ductus rationibus ajebat Cardanus in Hippocratis progn.
 „Hippocratem quæro, quoniam plurimum continet
 „veritatis: oportet igitur veritatem inquirere, non
 „verborum expositionem.“

Demum diligenter curavi, ut involuta quæque sic evolverem, sic ea quæ obscura sunt patefacerem, ut quid quæque dictio, ac quæque vox sonet, vel ii facile intelligant, qui ac medicinæ studium ingrediuntur, nedum qui jamdiu ingressi sunt, pro quibus utrisque expositionem hanc meam potissimum edidi, adjectio multo locupletiori rerum indice, quo facilius res ipsæ, earumque significationes, ac usus, morborumque descriptiones, quæ non ubique exstant, inveniri queant. IN

IN APHORISMOS, PRÆSAGIAQUE *Hippocratis Prolegomena.*

ANtequam ad aphorismorum explicationem transeamus, investiganda sunt quædam; primoque quærendum de aphorismorum, præsagiorumque auctore, deinde de horumce scriptorum præstantia, post de modo, quo prodita in iis dogmata sunt accipienda. Ad primum quod attinet, aphorismos, quo *Celsus* recitat, haud uno in loco *Hippocrati* tribuit. *Galenus* aphorismorum librum inter *Hippocratis* scripta genuina reponit. *Erotianus*, & *Svidas* in numero eorum, quæ ab *Hippocrate* exarata sunt, eundem recipiunt: Cooque eum ipsum *Hippocrati* vindicat *Oribasius* (a) auctoritate fretus *Rufi*, *Lyci* (b) *Pelopis*, aliorumque multorum: ait-

(a) Ignoratur, quisnam hic auctor fuerit, qui sub *Oribasii* nomine aphorismos interpretabatur *Hippocratis*. Latinum, Christianumque scriptorem putat fuisse *Fabricius*, *Bibl. Græc.* vol. 12. pag. 644.

(b) Hic est ille *Lycus* Macedo, quem non minori convicio *Galenus* afficit, quod ab *Hippocrate* nonnumquam recesserit, quam *Thessalum*, *Julianumque* vexet, quorum ille cum *Hippocratem*, tum antiquos impudentissime contempsit omnes; hic quadraginta octo libros adversus *Hippocratis* aphorismos conscripsit. Singuli porro videntur *Hippocratis* phylologicas disputationes potissimum improbasse.

aitque , aphorismos *Hippocratis* apud Græcos ,
 Latinosque (a) „ ex studiosissima *Coi* opera , &
 „ sollicita indagine inclaruisse.“ Ex quo plures
 antiquos habuere interpretes ; nam *Galenus Ma-*
rinum nominat , *Heraclidem* , *Herophilum* (b),
Bachium , *Sabinum* , *Zeuxim* : *Oribasius Galenum*
 recenset , *Lycum* , *Domnum* , *Attalionem* , *Pelo-*
pem. His ipsummet *Oribasium* addere possumus,
 atque *Philotheum* (c) , omisis recentioribus,
 quorum tantus est numerus , ut affirmare au-
 deat *Martianus* (d) „ nullum esse in re literaria
 „ opus quod plures habuerit expositores, quam
 „ liber aphorismorum.“ Quem tamen is ipse
 Mar-

(a) *Oribasius in præfat. comm. aph. Hipp. pag. 3. edit. Vener.*

(b) *Schulzius, Hist. med. period. 2. cap. 3. exempla-*
ria Galeni putat esse corrupta , *comm. VII. aph. 64. le-*
gendumque esse : * *ho Eerophileios Baccheios*, * *Herophi-*
leus Bachius , nequaquam autem : * *Eerophilos*, *ho Bak-*
cheios, * *Herophilus Bachius* ; quod nusquam constat,
 fuisse interpretem *Hipp. aphorismorum Herophilum*. Id
 tamen non sine dubitatione acciperem : nam alibi nus-
 quam *Galenus* , quum *Bachium* nominat , *Herophilum* ei,
 aut *Herophileum* affigit.

(c) *Theophilum* appellat *Fabricius* , *ibid. pag. 649. me-*
dicum protospatharium , eundemque monachum , ac
 philosophum ex antiquis codicibus. Cæterum præter
Galenii , *Oribasii* , *Philotheique* interpretationes , veterum
 interciderunt reliquæ ; nec supersunt , nisi quædam *Lyci*
 fragmenta in operibus *Galenii*.

(d) *Præfat. annot. ad lib. I. aph. Hipp.*

Martianus nonnullis aliis (a) ei suffragantibus, ex variis *Hippocratis* præceptis mavult esse conflatum, quam ab *Hippocrate* scriptum: cum tanti auctoris gravitate convenire non videatur, selectiores sententias hinc inde colligere, quæ, si totum opus respicias, nec methodum, nec doctrinæ perfectionem continent. Præter quam quod manifeste apparet, quam plures sententias ex aliis *Hippoc.* libris in præsens opus translatus, longe perfectiores in proprio fonte reperiri; nec paucasque esse, quæ aphoristice descriptæ mendacio non carent, quæ juxta proprii loci descriptionem indubitatam veritatem continent. Hæc ille.

At non probat, aphorismorum librum ex sententiis hinc inde descriptis fuisse confectum. Æque enim quis dixerit, aphorismos ex aphor. libris fuisse translatos in reliquos libros. Nec video, cur *Hippocratis* gravitati adversetur, se
dog-

(a) Nec enim, inquit *Vossius de philos.* pag. 83. à vero abludit eorum opinio, quæ ab alio ex variis *Hippocratis* operibus bono judicio excerptos aphorismos arbitratur. Hæc quoque de iis habet *Schelhammerus, Introduct. in art. med. Conringii cap. 3. pag. 121.* „Rectius se habent“ intellige, quam cætera pathologica *Hippocratis* aphorismi, in quibus plurima incomparabili *Hippocratis* ingenio digna continentur: quamvis etiam de his, an ab *Hippocrate* eo, quo nunc extant, ordine sint editi; & non potius post ipsius obitum ab alio collecti, merito possit dubitari.“

dogmata , quæ sparsim scripserat , in unum opus , quo facilius perdiscerentur , contulisse. Quod ipsum scimus à viris præstantissimis non sine laude , atque utilitate factum. Quod si præposteram sententiarum dispositionem *Hippocratis* famæ nocere posse arbitretur ; nullus eorum , qui ei inscribitur , non nocebit liber. Quotus enim quisque est reliquus , qui plane hoc vitio careat ? Neque doctrinæ imperfectio , quam urget , quemquam movere debet. Etenim cum aphoristice ea tradatur , id est angustis , concisisque sententiis enunciatur , sic est in suo genere absoluta , atque perfecta , ut non sit , quod amplius quærat. Ad hæc emendationes , quas ipse è propriis , ut ait , fontibus petit , exiguæ porro , minimæque sunt , inque tanto perspicuarum sententiarum numero adeo paucae , ut nullæ esse videantur. Postremo cum , non *perpaucas sententias mendacio non carere* , affirmaverit , videtur potius gloriosa , quam vera locutus. Nusquam enim quod dicit probat : ac ne *Galenum* quidem , quem sæpe carpit , jure semper , meritoque carpit.

Cæterum siqua falsa in aphorismis occurrunt , si inania , si obscuriora , si præpostere distributa , si bis scripta , si pugnantia , qualia vel in reliquis *Hippocratis* scriptis offendimus ,

non

non est cur miremur (a) ; „ cum post tot am-
 „ nensium (quorum multi, sive in transmutan-
 „ dis literis, vel vuculis omittendis, vel in
 „ quibusdam marginalibus in textum admitten-
 „ dis, culpa non vacant) manus ad nos de-
 „ mum pervenerint ; “ cumque potissimum in-
 venti sint, qui ausi sunt (b) complura in vetu-
 stissimis scripturis immutare, iisque (c) non
 pauca de suo addere ; quorum nonnulla *Gale-
 nus* ex se rejicere conatus est, nonnulla quo-
 que ex probatissimorum interpretum auctori-
 tate, qui quæcumque ab *Hippocratis* mente, &
 elocutionis modo deficerent, optime calle-
 bant.



Tan-

(a) Auctor præfat. ad edit. græc. lat. aph. *Hippocr.*
Caesbekian. Lugud. Bat. Videndus quoque *Le Clerc.* in
Histoir. de la Medic. part. 1. lib. 3. cap. 30. p. m. 231.

(b) *Dioscorides*, & *Artemidorus Capito* Alexandrini,
 cum *Hadriano* imperante *Hippocratis* scripta edidissent,
 complura, quæ minus intelligerent, immutarunt, auctore
Galeno, op. class. 7. pag. 197. Græci licet fuerint, aut
 ibi degerint, ubi græco sermone loquerentur.

(c) Vid. *Galenus comm. V. aph. 62.* Id debuerat ani-
 madvertisse *Capuanus*, aut saltem meminisse, dixisse se,
Sermone 4. pag. m. 108. scriptorum *Hippocratis* partim
 esse deperdita, partim defectuosa, & mutilata, partim
 adulterina, atque interjecta, vel à discipulis, vel à qui-
 busvis aliis : quorum oblitus, ut maledico dente infe-
 ctetur *Hippocratem*, ejusdem aphorismos invadit, ger-
 manos esse ratus, integros, incorruptosque omnes.

Tanta porro est aphorismorum præstantia, atque utilitas, ut nisi credere velimus, aphorismorum librum, ut * *Hyperbolikoos* * *Svidas* scripsit *humani vim ingenii superare*; ratas tamen firmasque laudes habere debeamus, quas *Martianus* iis tribuit, inquiens: *inter omnes libros, qui Hippocratis nomine inscribuntur, præsens opus aphorismorum omnium consensu principatum tenet. In eo enim præclariores sententiæ comprehenduntur, quæ per universam Asclepiadum doctrinam disseminatæ, eam illustrant, & exornant, in unum redactæ, hoc opus numquam satis admirandum constituunt.* Et sane quid præclarius *Hippocrates* observatione diuturna notaverat, quidquid (a) sparsim scripserat, quidquid à præceptoribus traditum (b), atque à ma-

(a) Vid. *Galen. de crisib. I. cap. 6.*

(b) Præceptores habuit *Hippocrates* parentem, nomine *Heraclidem*, *Gorgiam* rethorem, *Herodicum* medicum *Gorgiæ* fratrem; qui jam inventam non invenit gymnasticam; sed modum curandi morbos gymnastice, *Plato de rep. & Democritum*, si fides *Tzetæ, chiliad. 7. hist. 155.* Sed nihil minus sapiunt *Hippocratis* scripta, nedum aphorismorum liber; quam *Democriteam* philosophiam, *Herodique* medicinam, si tres de diata libros exceperis, scriptumque de *insomniis*, quæ scite *Clericus l. c. cap. 13.* *Herodico* tribuit. Quin *Herodici* methodus *6. epid. sect. 3.* vehementer damnatur. In causis morborum eruendis *Hippocrates* sequitur *Heracliti* dogma de igneo principio, si quidem id ipsum posuerit *Heraclitus*;

ut

majoribus (a) acceptum, respondere didicerat, in (b) unum librum contraxit, quem *Soranus* par-

ut scribit *Laterius de philos. vit. lib. 9. p. m. 306.* & non aërem, ut quidam rebantur, notante *S. Empirico adv. mat. pag. m. 304.* Fortasse quoque primarum qualitatum doctrinam ab *Alcmaëone* sumpsit *Hippocrates*, de quibus *Plutarchus de nat. lib. 5. cap. 30.* In morbis vero curandis, ita *Pythagoricos Hippocrates* sequitur, ut, nisi dixeris cum. *R. Abr. in cabal. histor. apud Genebrard. Hippocratem*, repugnante ratione temporum, *Pythagoræ* fuisse discipulum; sectatorem certe negare nequiveris, quod ex diætetica ejusdem curandi ratione liquet, dierumque doctrina criticorum exulta.

(a) Hos inter erat *Hippocrates Gnosidici* filius, avus *Hippocrutis* nostri, cui de *fracturis* tribuitur liber; proavus *Gnosidicus* medicus, *epist. Hipp. ad Philopœm.* abavus nomine *Nebrus* itidem medicus, *orat. Thessal. ad Athoniens.* aliique cum ejusdem *Nebridi* generis, tum alius *Æsculapici*. Neque enim quis recte senserit, si, *Plinio, lib. 29. cap. 1.* *Isidoroque, Orig. lib. 4. cap. 3.* à bello Trojano ad Peloponnesiacum, medicinam latuisse opinantibus, censeat nullos tum temporis extitisse medicos: nam & extitisse medicos ex *Cyropad. Xenoph. lib. 8.* & plura medicorum scripta ex ejusd. *De fac. & dic. Socrat. lib. 4.* constat; sed claros non fuisse ex *Celso* liquet, *Præfat. lib. 1.* omnesque obscuravit *Hippocrates*, ut *Homerus* poetas *Sexti* judicio *Empirici l. c. pag. 35.*

(b) *Stupanus* putat, *Hippocratem* in aphorismos contulisse è templo *Æsculapii* remedia: crematoque jam templo, clinicem instituisse *Varro* credidit apud *Plinium*. *Strabo* cremati templi non meminit, sed ex descriptis ibi curationibus ea *Hippocratem* agitalle, ait, dicit, quæ ad victus rationem pertinent: * *phasi de Hippocraten m-x-lista ek toon hanakeimnoon therapeioon Entautha gymnasthai*

partes divisit (a) in tres, Rufus in quattuor, *Galenus* in septem: quarum quintam partem bifariam distribuit *Oribasius*, ut sextum librum muliebria constituent: inque eo duos interjecit aphorismos prorsus vanos, absurdosque, qui in cæteris exemplaribus non leguntur impressis.

Germana porro *Coi* effata, septem hisce libris comprehensa, egregia quidem sunt omnia, sed alia aliis præstantiora. Miranda plane sunt præcepta (b) de victu ægrotantium, quæ prima aphorismorum sectione traduntur. Ea quippe natura dictasse videtur *Hippocrati*: nam cibi fastidium, quod ferme morbum comitatur vigentem, naturam cibum averfari, ægriusque

CO-

sthai ta peri tas diaitas. * Lib. 14. pag. m. 755. *Tzetzes* scribit *Hippocratem* bibliothecam cremasse *Coorum*; *Gnidiorum Andreas* apud *Soranum*. Ex quo *Capuanus* nedum plagiarium *Hippocratem*, sed & indoctum appellat. At dissipatur calumnia ex accusatorum inconstantia. Verisimileque non est, pro suis venditasse curationes *Hippocratem* in templi parietibus inscriptas, depictasque in tabulis, adeoque in oculis omnium positas. Multo minus se, seu templum, seu bibliothecam combussisse: nam *quis credet*, ait *Schulzius* l. c. pag. 210. tanti criminis reo cives suos anniversarium sacrum celebrasse, quod ad suam usque ætatem factum fuisse apud *Soranum* legimus?

(a) Vid. *Oribasii præfat. ad Hipp. aph.*

(b) Mirum est præcepta isthæc de victu aliquantulum laudasse *Capuanum*, qui *Hippocratem* petulantissime despicit, contemnit, irridetque ingeniosus quidem, at elatus homo, captiosusque, atque audax.

coqui, ac digeri, ea quæ ingesta sunt, indicat; perturbataque nos docet natura victum per id temporis esse subtrahendum; incipiente vero morbo, aut jam inclinato, quibus temporibus minor esse solet cibi averfatio, majorque robur ventriculi, exhibendum esse paulo pleniorrem. Plurimi quoque facienda sunt dogmata, quæ de purgatione ad acutos morbos adhibenda produntur. Hæc namque, cum purgationem, nisi materia turgeat, dissuadeant, materiamque ut plurimum non turgere declarent, una præcipiunt, ut plurimum à purgatione nobis esse cavendum. Quod si hujuscemodi præceptis addideris, nusquam *Hippocratem*, ubi de acutis, peracutisque agit morbis, sanguinis detractionem nominasse; victus vero rationem sæpe, fufiusque fuisse persecutum (nam, & * *therapeiai*, * *curationes* victum significant, auctore *Oribasio*, I. *aphor.* 6. facile intelliges eundem *Hippocratem* (a) vetustiorum *Ægyptiorum*

(a) Horum medicinam ostendit *Isocrates* in laude *Busiridis*. Scribit enim, Sacerdotes multis vitæ commoditatibus fruantes, invenisse medicinam, salutarem quidem, quæ in victus ratione consistit, non ancipitem, quæ periculosis pharmacis curat: ex quo & saluberrime, & diutissime eos ait vivere. * *Metha boon bioteuontes tois men soomafin hiatrikeen exeuron epikourian hou diakinduneuomenois pharmakois chroomeneen, alla ioioutois, à teen men asphaleian echei omoiam tee trophee tee catha ceme-*

rum (a) *Pythagoreorumque* fere instituisse vestigiis, quibus præcipuum erat diæta ad morbos remedium. Quæ sane medendi methodus, qua natura, nec importuno victu oneratur, nec medicamentis à coctione, subindeque etiam avocatur à crisi, non modo ejusmodi crises efficere poterat, ut adjutricem medici manuum vix umquam exposcerent, sed etiam (b) certio-

*eemeran, tas de oopheleias teelicautas, hoofte ekeinous omologoumenoos bygieinotatous, cai macrobiootatous einai. **

(a) *Jamblicus, de vita Pythagor. cap. 29. de Pythagoreis locutus ait, eos maxime excoluisse partem diæticam, pharmacis minus, & vix alibi quam in vulneribus, ulceribusque curandis usos fuisse, unguentis, & cataplasmatibus, magis quam reliquos, curasse. Hanc eandem Indorum esse medicinam, Strabo refert, lib. 15. pag. m. 818. his verbis: * teen de iatreian dia siteioon to pleon, ou dia pharmacoön epiteleisthai. Toon pharmacoön de malista eudokimein ta epichrista, kai ta cataplasmata. Talla de cacourgias poly metekein. * Id est, artem eorum medendi in victus ratione esse positam, nequaquam autem in medicamentis, præter inunctiones, & cataplasmata: cætera quippe maleficio non vacant.*

(b) Observatio cresium, dierumque criticorum cur non æque nobis, atque antiquis respondeat, causam affert *Schulzius*, in climatum diversitate positam, diverso victus genere, diversaque medendi methodo. Etenim *Hippocratis ævo, idem inquit, pag. 250. ,, vix nisi diæteti-
,, ca adhibebantur; sicque natura sibi magis sub tali
,, medico, quam apud nos relinquebatur, qui in acutis
,, pharmacis præcipue pugnamus, alexipharmacis san-
,, guinem incendimus, sanguinis missione sæpe etiam
,, non*

tiolem reddere dierum (a) criticorum doctrinam, quam à Pythagora acceptam experimentis firmavit *Hippocrates*, nec repudiavit *Galenus*, licet ab ejusdem medicina deflexerit (b).

Ex

„ non parum turbamus: prorsus ut miraculo proximum
 „ videri debeat, si nobis non eadem agitantibus eadem
 „ evenirent.“ Iteratas sanguinis detractiones accusat *Clericus* l. c. pag. 205. *Schelhammerus* regiones nostras Græcia frigidiores. At Scythia longe frigidior, quam Germania, quam Anglia erat: attamen icimus, non in ea minus, quam in Lybia, vera fuisse observata *Hippocratis*, præn. lib. III. n. 41.

(a) *Asclepiadem* dierum criticorum doctrinam repudiassè ait *Celsus* lib. 3. cap. 4. *Cæliusque acut.* lib. 1. cap. 14. *Celsus* ipse omnem dierum delectum, discrimenque sustulit. Quod cum facit, non tam effectum dierum persequitur, quam effectus causam à *Pythagoricis* numeris ductam. Nos vero non vim ullam, mysteriumque numerorum agnoscimus, sed naturam miramur, quæ alio dierum numero salutares fere edit motus, alio autem infidos, exitiososque. Id ipsum deprehendisse *Archigenem*, *Heraclidem Tarentinum*, *Philotimum*, *Dioclem*, aliosque experientissimos viros testatur *Galenus*, de dieb. decret. cap. 2.

(b) Hujus rei certiores nos faciunt germani *epidemiolum libri primus, tertiusque*; in quibus cum plures acuti morbi describantur, nec sanguinem, nisi semel Anaxioni missum fuisse legamus, tamen longe sæpius eundem in iis detractum fuisse, arbitratur *Galenus*, ut ne videretur ipse, qui phlebothomiæ indulgebat, à tanti viri fama usuque discessisse. Verum si *Hippocrates*, ne minima quidem remedia filet adhibita, qui sanguinis detractionem, si plus semel usurpasset, reticere potuerit? vide plura apud *Le Clerc.* pag. 204. ed. Amstel. 1723. Sola diætâ
 usum

Ex quo satis *Naldium* mirari non queo medicum cubicularium *Alexandri VII.* Pontificis maximi, qui ob minus cognitam, comprehensamque methodum medendi Hippocraticam, in eam miserabiliter opinionem delapsus est, ut putaret, aphorismos, *Hippocratem* non ad medicos scripsisse erudiendos, sed ad eos instruendos, qui interea dum medici abessent ab ægro tante, eidem, ii operam studiumque navarent.

Itaque & se tenuit *Hippocrates*, quin naturæ motus, quorum vim magnam (a) in morbis

usum *Hippocratem* ad morbos curandos *Schelhammerus* ait fuisse, *Introd. Corint. c. 6. pag. 231.* quem quidem hic idem improbat eidem accedente *Barkero*, *essai sur la conform. de la medec. chap. 1. pag. 56.* *Hippocratis* ævo, vix nisi diætetica fuisse tentata ad morbos percurandos, supra affirmantem attulimus *Schulzium*. *Clericus* ait, princeps, & læpe unicum fuisse, diætam *Hippocrati* ad morbos remedium, *pag. 190. & 206. cit. edit.* discrimenque inter *Hippocratis*, *Galenique* medicinam statuit, *pag. 660.*

(a) *Folius* apud *Bartholin. cent. I. epist. 61.* *Genga* in *præfat. ad anat. chirurg. & Barker. l. c. pag. 55. seqq.* infimulare non verentur *Hippocratem*, quod cum duo, & quadraginta curasset ægros, septendecim tantummodo servasset, ut videre est in *I. & III. epid. lib.* Quid? nonne pauciores etiam liberasse potuerat aut ducta medicamentis aluo, aut vena secta? Nonne aliquando febres incidunt pessimæ, quæ omnem dexteritatem eludunt artificum? Nonne præteritis annis, vix ulli sanabantur pleuritici, quibusdamque in locis ne unus quidem è multis, servatis licet *Trilleri* monitis? Sed ingenuus ille vir non

re-

bis curandis pernoverat, prohiberet, & ejusdem conatuum, mutationumque spectator venatorque diligens internoscendorum morborum notas, signaque è sputis, sudoribus, urinis, dejectionibus, multisque ex aliis tradidit, quibus perniciofa secerni à salutaribus possent. Longe vero cæteris excellunt ejusdem præfagiendi præcepta, quippe quæ vel ab iis (a) optima judicata sunt, qui *Hippocratica* curandi monita institutaque mutarunt. Atque ea quidem hic loci strictim, summatimque traduntur, articulatim vero, distincteque in libro præfagiorum: qui cum cæteris scriptis, qui *Hippocratis* nomine inscribuntur, ordine, & gravitate plurimum præstet, nemo est, inquit *Mercurialis lib. progn. pag. 85.* „qui *Hippocratis* esse neget: immo vero, si quid est, in quo ipsum admirari oporteat, plane hæc pars est, quam omnes veteres medicos, & maxime coluisse, atque in ea excelluisse constat.“ Hunc porro librum partes in tres divisit *Galenus*; in quorum singulis ex certis signis multorum morborum, qui acuti nominantur, natura describitur, & longe plurima

¶¶¶

præ-

reticuit, quos restituere nequivit. Nostri sæpe gloriosos casus prædicant, infelices silent, dubiaque remedia pro certis, exploratisque venditant.

(a) *Celsus*, lib. 2. præfat. pag. 41.

præcepta dantur salutarem, mortiferumque reliquorum exitum, brevemque, & longum, facilem, difficilemque prænoscenti.

Atque utinam *Cous* signa ex pulsu addidisset, quibus futura prænunciare possemus. Sed nobis ea reticuit, aut quia (a) ipsi minus nota, perspectaque fuerint, aut quia fallaciora esse crederet, quam ea quæ ex ægrotantis spiritu, multisque ex aliis duxerat. Plurimis tamen esse facienda ex pulsu signa, nemo ignorat, qui satis sit in mediorum artibus exercitatus. *Gelsusque* ipse, quamvis (b) fallacissimas res venas nominet, iis (c) tamen credidit. Legimusque,

(a) Non est ferenda silentio *Capuani* malitia, qui, ut *Hippocratem* sibi ipsum probet contradixisse, ex diversis *Hippocraticis* scriptis eruit pugnares tententias; ut eum ipsum ignorasse pulsum ostendat, loca quæ ex pulsu notas habent, ex eisdem scriptis non adducit, pag. m. 130. Veruntamen cum perraro, fereque obcurius pulsus in *Hippocraticis* libris indicetur, constat hanc medicinæ partem omnium minime excoluisse cum vetustissimos medicos, tum vel ipsum *Hippocratem*: verique simile est, eosdem consuevisse minus ex pulsu febrem percipere, quam ex acri, intensiorique calore corporis. Vid. *Gariopont.* de febrib. cap. 7. & *Stephan. Atheniens.* §. 15.

(b) Med. lib. 3. cap. 6. pag. m. 129.

(c) Vid. lib. 2. cap. 7. pag. 63. lib. 3. cap. 4. pag. 122. & cap. 19. pag. 156. lib. 5. cap. 26. n. 8. pag. 285. & n. 15. pag. 287. Cælius porro Aurelianus longe pluribus morbis ex pulsu addidit signa; inque hac parte cæteros veteres superavit.

que, ante ipsum medicos (a) signa ex pulsu consuluiffe ad futura prænoscenda. Quin ante *Praxagoram* (b), *Herophilumque*, à quibus maxime de pulsibus est elaboratum, *prædictorum* auctor (c), venarum contrectationem valere ait ad errores devitandos (d). Vix enim
 ulla

(a) Cicero antiquior Celso lib. 2. de divinatio. ait: *Medici signa quadam habent, ex venis, ex spiritu agroti, multisque ex aliis futura præsagiunt.*

(b) Hic in mulicos pedes pulsum descripsit per gradus ætatum, nimiam tamen propter subtilitatem desertus. *Plin. hist. nat. lib. 9. cap. 37. & lib. 25. 1. Galenus quoque ad nimiam subtilitatem pulsum doctrinam reduxit, auctore Conringio Introduct. cap. 6. Vana pleraque in eadem doctrina deprehendit Schelhamerus; falsaque probat esse ex Cleyero, quæ de Cinentibus medicis morbos ex pulsu cognoscentibus prædicantur; & impossibilia, quæ auctor lib. de veter. cant. & viribus rythmi, nimirum Isaacus Vossius, ab Eropeis expollulat, ut scilicet pulsum ad mulicas leges describant. Addit. ad introd. Conringii cap. 6. pag. 227. seqq.*

(c) * *Epeita teesi chersî psausanta tees gastros te, cai toon phleboon eesson estin exapatasthai, hee mee psausanta.* * Id est: deinde qui manus contrectavit ventrem, ac venas, minus falli potest, quam qui non contrectavit. *Prædict. iib. 2. de pulsu quoque ut signo hæc habentur, 4. Epid. * en toisin exytatoisi toon pyretoon oi sphygmoi pygnoratoi, cai megistoi.* * *Acutissimarum febrium pulsus maximi, & celerrimi.* Ibidemque: * *Zoïlou tou tectonos sphygmoi tromoodees, cai noothoi.* * *Zoili fabri pulsus tremuli imbecillique.* Et lib. 2. morb. mul. * *sphygmoi pros cheira psairontes.* * *Pulsus ad manum debiles.*

(d) Celsus, lib. 1. præf. pag. 17.

ulla perpetua praecepta medicinalis ars recipit. Ut
injuria quidem perstringat Capuanus Hippocra-
tem (ecquando autem non injuria perstringit?)
 quod observaverit omnibus omnino (a) febricitantibus victum non convenire humidum; nec (b) lethalem semper esse morbum in gravida muliere acutum; nec (c) inediam senes sustinere universos; nec (d) elapsum per vulnus omentum perpetuo putrescere; nec (e) quotidie febrem qualibet discuti, eam licet quotidie excipiat rigor; nec (f) semper citius finiri pleuritidem, in qua per initia excreatur, aliaque his similia. Quorum singula, reliquaue omnia, quæ in aphorismorum præfagiorumque libris occurrunt, præcepta, si vix ulla excipiantur, quæ inania, falsaue sunt, ac admodum probabiliter, aut interjecta (g), & adulterina, aut depravata; nemo ignorat, non esse

(a) I. aph. 16.

(b) V. aph. 30.

(c) I. aph. 13.

(d) VI. aph. 58.

(e) IV. aph. 63.

(f) I. aph. 12.

(g) At ponamus ea quæ inania falsaue sunt, per pauca tamen, germana esse incorruptaque, *Hippocratemque* interdum dormitasse, numquid propterea vaniloquum dicemus *Hippocratem*, ejusque aphorismos divinos ironice cum *Capuano* appellabimus?

esse accipienda , ut perpetuæ , æternæque veritatis dogmata , sed ut observata , quæ ut plurimum vera esse res ipsa atque eventus ostendit , summorumque hominum evincit auctoritas. Quid enim impudentius *Sinapio*? (nam „Verderius audiri non debet“ quia secreta artis ignorat „*Bartholin. cent. 3. epist. med. 4.*) „qui in præfatione tractatus , cui titulus : “ *Absurda vera* (rectius dixisset : *vere*) & *paradoxa de vanitate, falsitate, & incertitudine aphorismorum Hippocratis, libri 1. 2. 3. 4.* ausus est effutire , observasse se , ut plurimum fallere aphorismos plurimos. Idque ut probet, singulis aphorismis notas apposuit vanis , falsis incertisque refertas sententiis , captiosisque ratiunculis , quas nemo prudens sine fastidio legerit ; nedum refellere cogitaverit , cum *Hippocratis* (a) observationes facile se per se ipsas

(a) Hæ observationes philosophiam constituunt eam, ob quam auctor operis nuncupati : *L' esprit des nations*, inquit *lib. 1. cap. 7.* Hippocrate le seul qui ait survécu à l' ancienne physique , également ancien , & moderne: ob eamque omnium ferme gentium elogia consecutus est *Cous* ; sitque instar omnium illud *Baconis Hist. vit. & mort.* quum ait : „Hippocrates *Cous* medicus insignis centum , & quattuor annos vixit“ (hanc eandem ætatem posuere Tzetzes , & Svidas. Hanc ipsam ætatem Soranus nonnullis arridere scribit , aliis nonaginta annorum , aliis octoginta quinque , quos Schulzius sequi-

ipſas defendant contra calumniatores quos-
cumque.

Ut igitur quædam eorum, quæ genera-
tim attigimus, particulatim explicemus, ſcien-
dum eſt, I. generale præceptum eſſe auctore
Jacotio, comm. coac. pag. 247. „ſigna omnia,
„quæ boni aliquid, aut mali certo prænun-
„ciant, firma & conſtantia eſſe debere.“ Nam
& ſingultus niſi (a) *ſit frequens*, & *præter con-*
ſuetudinem continuus, (b) hepar non indicat
inflammatum: & (c) ſtrangulatio ſine tumore,
niſi perſiſterit, febricitantem non tollit; labo-
remque ſomnus, ſi ſemel tantum, atque iterum
(d) faciat, mortem non præmonſtrat futuram.

II. Ubi aut ſuppuratio dicitur expectanda,
ſive (e) ob hypocondriorum tumorem, ſive
ob

quitur, aliis demum centum & novem, quibus Caſtel-
lanus adhæret) „artemque ſuam tam longa vita com-
„probavit & honeſtavit: vir cum prudentia quadam
„doctus, in experientia & obſervatione multus, non
„verba aut methodos captans, ſed nervos tantum ſcien-
„tiæ ſeparans, & proponens.“ Plura hujus viri elogia
habent *Fabricius, bibl. græc. Meibomius, comm. in juſtur.*
Hipp. Thomas Pope Blount, cenſur. celebr. autor. & Lin-
danus, op. Hipp. tom. 2. in fine.

(a) Celfus lib. 2. cap. 7. pag. 62.

(b) Aph. Hipp. V. 58.

(c) Ibid. IV. 34. & 35.

(d) Ibid. II. 1.

(e) Præſag. Hipp. I. num. 34.

(*) ob destillationem, five (a) ob dolorem ventris diuturnum; aut abscessus prædicitur futurus, aut (b) ex torminibus hydrops præ-nunciatur, aut quid aliud scribitur hujusmodi; subjiendum omnino est, *Galen*i iudicio (c) *nisi morbus hominem morte præripiat*.

III. Non ignorandum, convulsionem tam (d) ex vulnere, quam (e) ex epoto veratro ortam non ideo lethalem appellari, quia perpetuo mortem afferat ægrotanti, sed quia periculosa res est, morteque sæpius finiri solita. Idem de quocumque alio morbo, morbique signo, quod lethale esse dicitur, iudicium esto.

IV. Neque singula, quæ lethalia dicuntur, sunt æqualiter metuenda, sed alia aliis periculosiora, magisque mortifera. Etenim nonnullos (f) ex atræ bilis exitu convalescere observavimus morbo ineunte; vix ullos (g) eodem protracto, quum extenuata, confecta-que sunt corpora. Lethaliaque (h) cerebri, sep-
ti

(*) Aph. Hipp. VII. 38.

(a) Ibid. 32.

(b) Ibid. IV. 11.

(c) Comm. VII. aph. Hipp. 22.

(d) Aph. Hipp. V. 2.

(e) Ibid. 1.

(f) Ibid. IV. 22.

(g) Ibid. IV. 23.

(h) Ibid. VI. 18.

ti transversi, ventriculi, intestinorum, vesicæ, jecorisque vulnera interdum sanata fuisse novimus, numquam vero cordis, quæ in sinus penetrassent.

V. Causæ manifestæ vim signis detrahunt observante *Vallesio*, *comm. in Hipp. tom. 2. col. 325*. Nam dentium fridor, si consuetus accedat ad febrem, periculum minuit, quod (a) creat insolitus. Metumque extenuat, si cui palpebræ (b) non committuntur per somnum, consuetudo dormiendi non commissis palpebris. Sine periculo quoque est pulsus perquam concitatus, exiguusque atque intermittens in eo, in quo talis inest per bonam valetudinem proprietas pulsus. Neque nos terrere debet frigidus frontis, faciei que sudor acutis in febribus, quandoquidem frigus contrahat sudor ab aëre, locisque frigidis. Neque perturbatus somnus (c) in iis, qui cum sani sint, conqueri, vociterare, exsurgere, ægrius spirare, timere, concutique solent per somnum. Nec demum anxietas, corporisque jactatio (d) ac pedum, brachiorumque inconcinna proje-

ctio,

(a) Præfag. Hipp. I. n. 24.


(b) Ibid. n. 14.

(c) Aph. Hipp. II. 1.

(d) Præfag. I. n. 19.

ctio, ubi hæc ipsa, aut ab æris æstu, aut à teneriore quadam, molliorque vi animi profiscuntur. *Sunt enim quædam, ait Celsus lib.2. cap. proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum præſagiri poteſt.*

VI. Lethali cuique signo vim plura addunt, detrahuntque. Ac primo morbi qui dominantur similes: quod docuisse videtur *Hippocrates*, quum inquit (a): *item popularium graſſantium quoque morborum impetum obſervare oportet.* Etenim vagantibus ſalutaribus morbis ſigna non perinde terrent lethalia, ac ſi graſſentur mortiferi. Nam per id temporis ne bonis quidem fidendum eſt ſignis. Deinde etiam ſputorum, dejectionum, urinarumque ratio. Si quidem cruditate vigente, quum acutis in febribus (b) urina fulva, tenuisque profunditur, aut in pleuritide ſputum tenuius, album rotundum, ſpumofumque redditur, taliaque diutius permanent; lethalia pluris æſtimanda ſunt ſigna, quam ſi dejection (c) craſſeſcat, ſputumque æquale læveque fiat, celeriterque feratur, ac facile; atque in urina (d) perpetuo album rubrumve ſedimentum, læve tamen



æqua-

(a) Ibid. III. n. 39.

(b) Ibid. II. n. 30.

(c) Ibid. n. 16.

(d) Ibid. n. 26.

æqualeque resideat. Hæc enim coctio appellatur, quæ salutarem crîsim, signorumque pravorum mitigationem, recessumque promittit: cum è contra (a) cruditas aut nullam crîsim, aut malam procreet, qua signa fiunt deteriora, ingravescit aut recrudescit morbus, sæpeque etiam homo moritur.

VII. Considerare quoque oportet signa comitantia, & subsequencia reliqua. Id namque quod malum est, majus malum efficitur; quod lethale, multo evadit lethalius signorum accessione lethalium. Contra salutaribus notis unum quodpiam lethale signum comitantibus, aut consequentibus, ita vis ejus extenuatur, ut brevi sæpe conquiescere soleat; aut, si persistat, morbum quidem producere, perraro autem ægrotantem occidere valeat. Nec sine causa. Nam vix una quæpiam pars corporis graviter ægrotat, quin ob cognitionem, consensumque mirabilem plures aliæ percellantur, afflictæque ipsius unius partis signo sua quæque pars reliqua adjiciat indicia.

VIII. Idcirco, qui recte pernoscere futura de-

(a) Percelebre est illud effatum Hipp. lib. I. epid. sect. 2. Coctiones omnes crîsis celeritatem, securitatemque denunciant: cruda vero, & incocta, & in pravos abscessus conversa, aut longitudinem, difficultatemque morbi significant, aut ejusdem reversionem, aut mortem.

desiderat , non modo considerata sunt ei
 signa , variæque expendendæ singulorum vi-
 res , sed etiam bona conferenda cum bonis,
 vicissimque bona cum malis , & mala compa-
 randa cum bonis. Hoc quippe modo prædi-
 ctio , si ad scientificam non evehitur certitu-
 dinem , ecquis enim ex conjecturali arte præ-
 cepta exquiret perpetua ? „ cum ne finitæ qui-
 „ dem vitæ Democritus satis certas notas esse
 „ proposuit , quibus medici credidissent (a);“
 certior profecto evadet , longeque perfectior.
 Quod si ne sic quidem fieri potest , quomi-
 nus à medicis deserti doctissimis interdum
 convalescant , inque spem erecti moriantur
 homines ; est tamen danda fides præceptis ab
Hippocrate traditis. Præclare enim *Celsus* (b):
Non itaque si quid vix millesimo in corpore ali-
quem decipit , id fidem non habet , cum per in-
numerabiles homines respondeat.

* * * * *

* * * * *

* * * *

EPI-

(a) *Celsus* lib. 2. cap. 6. pag. 57.

(b) L. c.

EPISTOLA

PRIMÆ EDITIONI PRÆFIXA.

ANDREAS PASTA
DISCIPULIS SUIS

S. D.


QUæ vero potissimum præstiterim, ut assiduis postulationibus vestris cumulatissime satisfacerem, hæc sunt. Primum Hippocratis aphorismi, ejusdemque præsegia latine reddita, ut emendatiora typis, quam unquam ante, recuderentur, curavi. Deinde Leonicensi versionem, quam non una de causa sequor, in nonnullis locis pravam, in pluribus autem perobscuram recognovi post viros studio atque doctrina præstantissimos. Eodem vitio laborantem recensui præsagiorum versionem à Copo factam. Quod cum ne id quidem vobis satis esse intelligerem in tam recondita, subtili, multiplicique Hippocratis doctrina, quedam adjeci, pauca tamen, & ea summatim, ne scilicet mentes obruerem, sed erigerem vestras. At enim, mihi nunc audire videor, quid jam novo interprete opus, cum fere nescias, utrum plures sint aphorismi, an interpretes? aut si opus est, quid lucis notæ afferent breves rebus in reconditis, atque subtilibus? Ne vivam, si interpretem egero;

cum

cum tot veterum, recentiorumque studiis, atque artibus hanc sibi ereptam provinciam fateatur oportet, qui nolit actum agere. Irritos enim fore conatos post Hollerium, qui in aphorismis interpretandis longe omnes multumque superat, quis ignorat? Nec mediocrem laudem consecuti sunt Vallesius, Heurnius, Tozzius, Hecquetus, Fickius, & omnium nuperime Gorterus, viri doctrina, rerum copia, ac sententiarum varietate abundantissimi. Sed in his brevitate fortasse desideraveris ad juvanda adolescentium studia: quorum alii, rerum multitudine perterrentur, quominus ea, quæ attente, quæ sæpius legenda sunt, legant; alii ea quoque, quæ perlegerint, memoria satis comprehendere, servareque nequeunt. Quare non putavi esse alienum utilitati vestræ, si ex optimis interpretibus, aliisque claris viris excellentissima quæque libassem, rejecis iis, quæ supervacua sunt, & nullum in medendo, aut certe exiguum usum habent. Aphorismos, qui plani, atque evidentes visi mihi sunt, intactos reliqui, ne artem longam efficerem sine necessitate longiorem. Nam cognito, exempli causa, bonum esse delirium sedari somno, parum hercule scire interest, quamobrem sit bonum: aut si constet, vino epoto famem extinguere, parum ars detrimenti capiet, si causam ignorem; aut incrementi, si exploratam habeam, atque perspectam. Non eo tamen hæc dico, ut summorum interpretum labores improbem; sunt enim & hi consulendi; quamvis

vis non ante legendos suadeam, quam aphorismos
 perceperitis, atque adeo edidiceritis, ut vobis num-
 quam excidant. Satius quippe est, scire prius, peni-
 tusque intelligere, quid agat natura, cui medico pa-
 rendum est, quam cur agat, & quibus artibus ex
 iis cognoscere, qui omnia quaecumque in aphorismis
 sunt, non minus scientiæ, quam cæssarum perveſti-
 gatione comprehendunt. Expetenda in primis sunt
 præcepta ad usum artis necessaria, quam ab expe-
 rimento ortam fuisse scimus, exemplo præeunte.
 Ideoque jure vereque parens medicinæ appellatur
 Hippocrates, eumque omnia gymnasia, omnesque me-
 dicorum scholæ concelebrant, divinumque nominant,
 quia hanc ipsam condidit naturæ legibus judiciis-
 que, quæ dies confirmat, non opinionum commentis,
 quæ in dies mutantur, innixam. Quod reliquum est,
 quamvis per notas scripserim breves, nihil tamen
 commisi, quamobrem huc ea, quæ cum vobis præfer-
 tim, tum provectioribus quoque medicis usui fore
 cognoveram, non conferrem omnia. Quin etiam, quod
 ad variam aphorismorum significationem attinet, ea
 his notis comprehensa sunt, quæ in pluribus vel lo-
 cupletissimis interpretibus desiderantur. Illud porro
 impensius curavi, ut paulo fusius, atque accuratius
 exponerentur, quæ ad alendos agros pertinent, pur-
 gandaque eorundem corpora. Præclara mihi Brudus,
 & Martianus suppeditarunt, quæ pauci in suos com-
 mentarios retulere. Ipse quoque quædam protuli à

Galeno, cæterisque interpretibus discrepanda, quorum arbitros statuo eruditos viros; eisque meas, si quæ sunt aliæ, ad græci textus emendationem, significationemve spectantes conjecturas relinquo. Obscuriores demum locos explanare non indiligenter studui, ut eos non modo vos intelligatis, qui aliquantum estis in medicorum artibus, & disciplinis versati, sed etiam ii, qui ab eisdem abhorrent, modo ne latinas ignorent literas, universam queant artem in aphorismis, præsagiisque repositam paucis diebus, facileque consequi, perceptæque, quod quam brevissime explicetur, meminisse. Valete.



HIPPOCRATIS

JUSJURANDUM

Vertente Foesio.

PER Apollinem Medicum, & Æsculapium, Hygiamque & Panaceam jurejurando affirmo, & Deos, Deasque omnes testor, me quantum viribus, & judicio valuerò quod nunc juro, & ex scripto spondeo, plane observaturum. Præceporem quidem qui me hanc artem edocuit, parentum loco habiturum, ei-que cum ad victum, tum etiam ad usum necessaria, grato animo communicaturum, & suppeditaturum. Ejusque posteros apud me eodem loco quo germanos fratres fore, eosque si hanc artem ediscere volent, absque mercede, & singrapha edocturum. Præceptionum quo-

quoque & auditionum, totiusque reliquæ Disciplina, cum meos, & ejus qui me docuit liberos, tum Discipulos qui Medico jure jurando nomen, fidemque dederint, participes facturum, aliorum præterea neminem: Victus quoque rationem quantum facultate, & judicio consequi potero, ægris utilem me præscripturum. Neque cujusquam precibus adductus, alicui medicamentum lethale propinabo, neque hujus rei author ero. Neque simili ratione mulieri pessum subdititium ad fœtum corrumpendum exhibebo: Sed castam & ab omni scelere puram, tum vitam, tum artem meam perpetuo præstabo. Neque vero calculo laborantes secabo, sed magiltris ejus artis peritis id munus concedam. In quamcumque autem domum ingressus fuero, ad ægrotantium salutem ingrediar, omnem injuriæ inferendæ, & corruptelæ suspicionem procul fugiens, tum vel maxime rerum venerearum cupiditatem erga mulieres juxta, ac viros, tum ingenuos, tum servos. Quæ vero inter curandum, aut etiam medicinam minime faciens, in communi hominum vel videro, vel audiero, quæ minime in vulgus transferri oporteat, ea arcana esse ratus filebo. Hoc igitur jusjurandum si religiose observavero, ac minime irritum fecero, mihi liceat cum summa apud homines existimatione perpetuo vitam felicem degere, & artis uberrimum fructum percipere. Quod si illud violavero, & perjavero, contraria mihi contingant.



Hæ ** nomina designant Græca.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO I.

I. ****
* V * experimentum periculosum, iudicium
* * difficile. Nec solum se ipsum præstare
**** oportet opportuna facientem, sed & æ-
grum, & assidentes, & exteriora.

II. IN perturbationibus ventris, & vomitibus spon-
taneis, si *qualia* oportet purgari, purgentur, confert, &
A le-

I. *Præcept.* Acutis præsertim in morbis, qui brevi vel oc-
cidunt, vel liberant. Hinc illud: *Principiis obsta. Periculosum.*
Tum quia *differt corpus à corpore, natura à natura*, Hipp. tum
quia *similitudines quandoque vel peritos Medicos fallunt*, Idem.
Difficile. Eo quod difficulter assequimur immediatam morbi cau-
sam, ob incomprehensibilem minimarum partium, quæ firmæ
sunt, structuram, non minus quam fluidarum nexum, naturam,
vires: nec facile scimus ante morbi exitum, salutaris ne sit fu-
turus sudor, urina, vomitus, dejectio, sputum, fluxus sanguinis,
an secus. *Exteriora.* Huc referendus aer, lintea, stragula, lectus,
cubiculum, odores, alimenta, medicamenta, quorum singula
apta esse debent ad vincendum morbum.

II. *Perturbationibus.* Dejectionibus. *Qualia.* Rectius, *qua-
liter oportet.* Id est, si humores evacuentur tempore opportuno,
quantitate convenienti, prægressis signis coctionis, sine mole-
stia, & per loca lege naturæ commoda. Igitur si cui vomitus ip-
se per se movetur, aut alvus *qualite* oportet solvitur, nimirum

leviter ferunt; sin minus, contra. Sic & vasorum inanition, si *quidem* fiat, *qualiter* fieri debet, confert, & bene tolerant; sin minus, contra. Inspecere itaque oportet, & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conveniat, aut non.

III. *Corpora exercitatorum*, qui summum bonitatis attingunt, *periculosa*, si in extremo constiterint: neque enim possunt in eodem statu permanere, neque quiescere;

sine molestia, prægressisq; coctionis signis, ac ea quantitate, qualitateq; , quæ morbo respondeat; talis evacuatio & ægrotanti confert, id est, ejus morbum imminuit, & facile fertur, id est, ea æger ipse evadit alacrior: sin minus aut permanet, aut ingravescit morbus, atque infirmatur homo. Tum enim, qui prodeunt succi, vi morbi prodeunt, id est, inordinatis perversisq; solidorum motibus, non iis, qui secundum naturam sunt, ejiciuntur. Quo fit, ut cruda ferè vomantur, dejicianturq; , & incocta, aquosa, tenuia, spumosa, divulsa, inodora, variegata; quibus utique seu morbi longitudo, seu ejusdem recrudescencia, quam recidivam dicimus, seu mors ipsa quoque significatur. Sæpè etiam evenit, ut nec tollat, nec levet evacuatio morbum, tamen sustineatur ab homine. Id ubi accidit, commodum est, quoadusque ferunt vires, eam finire: quippè qua plenitudo detrahitur, ut progressu temporis prodesse queat. Nam *levata*, auctore Galeno, *natura ab eo, quo velut sarcina premitur, facilius quod reliquum est & consumit, & concoquit. Vasorum inanition.* Id est, purgatio, quæ medicamentis vomitum, aut alvum cicientibus fit, quum natura aut segnius movet alterutrum, aut prorsus non movet, cum movere deberet.

III. *Exercitatorum.* Qui in gymnasio exercitabantur, athletæ dicti. *Bonitatis.* Rectius, *plenitudinis.* *Periculosa.* Ob metum disruptionis vasorum, febrium ardentium, inflammationum, syncopæ, apoplexiæ. *Compressiones.* Rectius, *extenuationes.* *Qualis natura.* Id est, tandiu extenuanda sunt hæc corpora, dum acquisitam summam plenitudinem amiserint, & ad naturalem constitutionem fuerint reducta. *Ad extremum deducunt.* Quæ nimia dejectione, nimiove vomitu ægrotantem fatigant, atque exhauriunt: quod quidem præstant fortiora purgantia remedia, interdum & mediocria, si sæpius atque inconsulto exhibeantur.

re; cum verò non quiescant, nec possint proficere in melius; reliquum est igitur, ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim solvere expedit, ut rursus corpus nutrirì incipiat; neque compressiones ad extremum ducendæ; periculosum enim; sed qualis natura fuerit ejus, qui debet perferre, ad hoc ducere convenit. Sic & evacuationes, quæ ad extremum deducunt, periculosæ; & rursus refectiones, cum extremæ fuerint, periculosæ.

IV. Victus tenuis, atque exquisitus, in morbis quidem longis, semper; in acutis vero, in quibus non convenit, periculosus. Et rursus, qui ad extremum devenit tenuitatis, gravis est: nam & repletiones, quæ ad extremum deveniunt, graves sunt.

V. In tenui victu ægri delinquant, quo fit, ut magis lædantur. Quicumque enim error committitur, major in hoc fit, quam in paulo pleniori victu. Propterea etiam

fa-

IV. *Victus tenuis.* Succus ex ptissana collata expressus, cremor ptissanæ plerisque dictus. Ptissana pultis genus erat, quod ferè ex hordeo parabatur aqua persuso, siccato, & cortice exuto, diuque reposito, tum in 10. aut 15. aquæ partibus decocto, donec colliquesceret. Hanc, totam ptissanam, & ptissanam non collatam Græci nominabant. Sanorum æquè, ac febrientium victus erat sic, ut hi minus, illi plus assumerent. *Non convenit.* Ut in simpliciter acutis, qui 14. diebus finiuntur. In his, atque in acutis quibuscunque, si vires ptissanam non ferunt collatam, tota ptissana utendum est. *Extremum tenuitatis.* Victum extremè tenuem, seu tenuissimum. Hunc verissimile est in aquæ potu fuisse situm, cui parum interdum liquoris instillabatur parati ex favis dulcissimis decoctis, sive ex favis, & aceto; sive ex aceto, & melle. *Gravis.* Quum morbi natura, aut morbi tempora, aut ægri vires hunc victum respuunt.

V. *Delinquant.* Si quis error incidit in victu, aut qualibet alia re, plus is læditur, qui tenui victu, quam qui paulo pleniori utitur: nimirum plus læditur, qui succo ptissanæ, quam qui tota ptissana utitur. Ideo tenui victum præfert paulo pleniorē Hipp. sic tamen, ut quum morbus maximam acquirit vehementiam, victu utendum sit tenuissimo. *Vid. Aph. 8.*

sanis periculosus exiit valde exquisitus victus, & constitutus, quoniam errores gravius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus eo, qui sit paulo plenior, magis periculosus.

VI. Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt.

VII. Ubi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu utendum est. Ubi vero non, sed pleniorē victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quanto morbus extremis remissior fuerit.

VIII. Quando morbus in suo vigore constiterit, tum victu tenuissimo utendum est.

IX. Conjectari autem oportet, an æger cum victu

suf-

VI. *Remedia.* Rectius, *curationes*, quas victu exequi tenuissimo, seu, ut alias scribitur, extremè tenuissimo, solebat Hipp. Interpretes ad quavis remedia sententiam extendunt, quæ extrema dicuntur, cujusmodi missio sanguinis ad animi deliquium, purgatio fortis, & crudelis chirurgia est.

VII. *Peracutus.* Ille est, qui quarta judicatur, seu finitur, die, quique acutissimus quoque dicitur, & per extrema symptomata, seu morbi accidentia, dignoscitur. Nam si febriens quis maximè sitiat, doleat, vigilet, aut, præter consuetudinem, corporis positum assidue mutet: brachiaque, cervicem, & crura inæqualiter dispergat ac nudet, morbus indubie quarta finietur die.

Remissior. Seu quanto morbus levior fuerit peracutis morbis, seu quanto remotior à vigore, id est, statu fuerit.

VIII. *Vigore.* Si morbus crism die septima habiturus est, & vigorem seu maximam vehementiam eadem ipsa die, aut parum ante; tenui victu utendum erit primis quatuor diebus, tribus autem reliquis tenuissimo, peractaque crisi sensim ad pleniorē transeundum. Crism porro septima fore indicat dolor capitis, vigilia, & delirium, si hæc cum acuta febre continenter affligerint, undecima vero die, si intermiserint, aut quædam eorum desint.

IX. *Conjectari.* Ex ægri viribus, & morbi vehementia conjectandum, quousque duraturus sit morbus, atque adeo quo

sufficiat perdurare, donec morbus consistat; & nunquid prius ille deficiat, nec possit cum victu perdurare, vel morbus ante deficiat, atque hebetescat.

X. Quibus igitur statim morbus consistit, his statim tenuis victus adhibendus est: quibus vero posterius debet consistere, his, & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibus subtrahendus: prius vero uberius agendum, ut æger sufficiat.

XI. In accessionibus abstinere oportet; nam cibum dare nocuum est; & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

XII. Accessiones vero, & constitutiones morbi indi-
ca.

victu sustinendus sit æger ad id temporis, quod morbi status dicitur, & vigor. Nam si ante id temporis ægrotantem tenuius nutries, quam oportet; siquidem vires consent, coquetur humor, solveturque morbus ante vigoris tempus: sin deficiant, inconcoctis humoribus, morietur æger ante statum morbi, seu vigoris tempus.

X. *Consistit.* Id est, ad vigorem evehitur: qui si extremos labores affert, non tenuem, sed tenuissimum victum expostulat. *vid. Aphor. 7. & 8.* Hinc fortasse legendum * *leptotatoos* * *tenuissime*, non autem * *leptoos* * *tenuiter*. *Prius vero.* In principio morbi, & augmento liberalius indulgendum, ut æger morbi vigorem ferre valeat, quo tempore, & paulo etiam ante, victus est maximè extenuandus.

XI. *In accessionibus.* Accessio, sive paroxysmus tempus est, quod febris ortu, incremento, & statu finitur. Circuitus tempus est, quod ortu unius febris, & alterius circumscribitur: ut quotidianæ febris est horarum 24. tertianæ 48. *Abstinere.* Dare tamen cibum oportet biliosis, quibus os ventriculi biliosis humoribus tentatur facile, & exquisitioris sensus est, febribus syncopalibus laborantibus, morboque extenuitis, & famelicis melancholicis, alioqui facile eis linqueretur animus. *Ballon epid. l. I.*

XII. *Morbi indicabunt.* Id est, morbi natura, & anni tempus, & paroxysmorum modi indicabunt tempora morbi universalialia, nimirum morbi principium, incrementum, & vigo-
rem,

cabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, live quotidie, live alternis diebus, live per majora intervalla fiant. Sed & ex his, quæ mox apparent, indicia sumuntur; quemadmodum in morbo laterali, si circa initia statim sputum appareat, morbum breviat: si vero postea appareat, producit. Et urinæ, & alvi excrementa, & sudores, & quæcunque apparuerint, vel bonam morborum judicationem, vel malam, vel breves, vel longos fore morbos ostendunt.

XIII. Senes facillimè jejunium ferunt: secundo loco, qui ætatem consistentem habent, minus adolescentes, omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt vividiore.

XIV. Qui crescunt plurimum habent calidi innati; plurimo igitur egent alimento, alioquin corpus absumitur. Senibus vero parum calidi innati inest; paucis propterea fomitibus egent, quia à multis extinguuntur. Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acutæ fiunt; frigidum enim eorum corpus.

XV. Ventres hieme, & vere natura calidissimi sunt,
&

rem, seu constitutionem, declinationemque. Quæ mox apparent.* *Epiphainomena* * propriè signa sunt, quæ non simul cum morbo invadunt, sed paulo post superveniunt, ut sputum in pleuritide, quam morbum lateralem appellat.

XIII. *Senes.* Senes crudi, & virides dicti à 50. ad 67. annum. Hi sunt parum, & raro cibandi. Contra decrepiti paucio quidem cibo, sed frequenti, nutriendi sunt.

XIV. *Qui crescunt.* Pueri, & adolescentes. *Calidi innati.* Videtur Hipp. secutus *Heraclitum*, ignem pro rerum principio atque elemento ponentem. *Paucis.* Id est, parciori alimento nutriri debent. *Non similiter.* Febres senum non solere esse ardentes, haberi tamen debere in eisdem magnas, licet videantur exiguæ, scribit *Vallesius*. Quod si accadat, ut ardentibus juvenum febribus laborent senes, eos omninò interituros arbitratur *Hollerius*.

XV. *Ventres.* Id est, ventriculus, atque intestina. *Calidissimi sunt.* Id est, valentissimi. Nam hæ partes ceteræque, quæ
in-

& somni longissimi; quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est; unde & pluribus egent alimentis, indicio sunt ætates, & athletæ.

XVI. Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maximè verò pueris, & aliis, qui tali victu uti consueverunt.

XVII. Et quibus semel, aut bis; & quibus plura ne, an pauciora, & per partes oporteat afferre, considerandum. Condonandum autem aliquid tempori, & regioni, & ætati, & consuetudini.

XVIII. Ætate, & autumno cibos difficillimè ferunt, hieme facillimè: secundum locum ver habet.

XIX. His, qui per circuitus accessionem habent, nihil dare oportet, neque cogere, sed subtrahere de cibis ante *judicationem*.

XX.

intus sunt, hieme minus, quam ætate calent, & vere. *Plurimus est*. Hipp. per calorem cibos concoqui arbitrabatur. Recentiores verò calorem non negantes, alimenta, putant, atteri in ventriculo cum *Erasistrato*, succisque etiam salivalibus digeri. *Ætates, & athletæ*. Id est, indicio sunt pueri, & adulescentes, qui ob succorum digestivorum vim, & robur ventriculi vicinarumque partium; tum etiam athletæ, qui ob exercitationem uberiori victu indigent.

XVI. *Febricitantibus*. Qui actu febricitant; nam intermissionis tempore solidiores cibi conceduntur. *Pueris*. Etiam non febrientibus; iis namque mollioribus, & humidis cibis uti confert. *Lib. de salub. diet.*

XVII. *Semel aut bis*. Docebit morbus, atque ægri vires, semel ne, an bis die, larga manu, an parca, & an per partes exhibendus sit cibus: tum si sic semper fieri oporteat, eodemque modo: an vero quid immutandum. *Condonandum*. Id est, concedendum aliquid anni tempori, &c.

XVIII. *Difficillimè ferunt*. Id est, ægerrime coquunt, & distribuunt. Hinc his temporibus parum cibi & sæpius dandum, hieme plurimum & raro, vere autem medio modo nutriendum.

XIX. *His, qui*. In paroxysmis periodicis febrium cibum aufer-

XX. Quæ judicantur, & judicata sunt integre, neque movere, neque novare aliquid, live medicamentis, live aliter irritando, sed finire.

XXI. Quæ ducere oportet, quo maximè natura vergit, per loca conferentia, eo ducere.

XXII. Concocta purgare, atque movere; non cruda, nec in principiis, modo non turgant; plurima vero non turgent.

XXIII. Dejectiones non multitudine sunt æstimandæ;

ferri oportet: at postquam paroxysmus, seu accessio transit; & crisis, exempli gratia sudor, instat, tunc subtrahendum de cibis, qui dari solent peracta crisi, febreque finita; id est, parcius alimentum dandum, quam tempore intermissionis febris.

XX. *Quæ judicantur.* Judicatio est morbi solutio, Hipp. de præcep. Ergo si qua morbus evacuatione solvitur critica, eaque perseverante, spes est, eundem solutum iri ex toto; nequaquam erit talis evacuatio adjuvanda remediis, ne nimia fiat, sicque vires exsolvantur.

XXI. *Qua ducere.* Id est, quæ evacuare oportet. Hæc sententia ad imperfectam crisin pertinet; quum natura humores, quos ab utilibus secrevit, evacuare aggreditur; sed tardius & imperfectius. *Per loca conferentia.* Id est, per loca consueta, & commoda juvabit naturæ motum Medicus humores blande educendo.

XXII. *Concocta.* Docemur concoctos humores medicamento purgante, aut quovis alio educendos esse, crudos vero nequaquam, neque per initia morbi, nisi turgant, quod raro contingit. Turgent humores, non cum huc illucque effrenes & perturbati feruntur, doloremque modo sursum, modo deorsum inferunt; ut plurimi putant; (tum enim purgatione forti, aut levi infestius, & periculosius quicquam?) sed cum ad intestina subsederint, & ægrotantibus turgentæ, seu molestæ tensionis sensum excitant sic, ut sponte plerique medicamentum expostulent. *Vid. Martian. in comm.* Sic non datur medicamentum ante 5. nisi murmuraverit venter. *Lib. de rat. viñt. acut. n. 50.*

XXIII. *Qualiter oportet.* Id est, tempore opportuno, quantitate convenienti, prægressis signis coctionis, sine molestia,

dæ; sed si deſciantur, *qualiter oportet*, & ægri facile tolerant. Atque ubi uſque ad animi deſectionem expedit ducere, faciendum, ſi æger poſſit tolerare.

XXIV. In acutis *morbis* raro, & in principiis medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum.

XXV. Si *qualiter* oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt; ſi contra, difficulter.



B

APHO-

neque ex brevibus intervallis, neque admodum fœtida, perliquida, albicantia, vehementer ruſa, aut viridia reddantur excrementa, *Animi deliquium*. Cum *Hipp.* non uno in loco extremas damnet evacuationes, ſuſpicari æquum eſt, hanc aphoriſmi partem adjectam fuiſſe. Plerique cum *Galeno*: * *ta choreonta* * *dejectiones*, *excretiones*, ad ſanguinis miſſionem extendunt ſic, ut interdum ad animi deliquium mitti ſanguinem expediat. Quod tamen *Celfus* improbat; nec *Hipp.* in germanis ſcriptis ſanguinem ultra coloris mutationem educit.

XXIV. In *acutis*. Id eſt, iis in febribus, quæ cum æſtu, ſiti, & vigiliis vehementer, & continenter affligunt. *Et in principiis*. Toto eo tempore, quod à vigore, & declinatione diſtinguitur. Si quando in acutis purgandum eſt, *vid. Aphor.* 22. certè per id temporis faciendum.

XXV. Si *qualiter*, *vid. Aph.* 23.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO II.

- I. **I**N quo morbo somnus laborem facit , mortales ;
 si vero juvat , non mortale.
- II. Ubi somnus delirium sedat , bonum.
- III. Somnus , atque vigilia , utraque si modum exce-
 sserint , malum.

IV.

I. *Laborem facit.* Hæc sententia ita ferè exponitur, ut mor-
 tale sit , si somnus febrim , aut delirium , aut sitim , aut dolo-
 rem semper adaugeat , aut inferat. At hic intelligi videtur ,
 * *Hypnos tarachoo-dees* * *somnus turbulentus* , ut in *lib. coac.* quo
 sæpè æger aut cum timore expergiscitur , non assuetus , aut
 surgit , aut huc illuc convertitur , & jactatur , aut loquitur ,
 aut exclamat , aut dolet , aut difficulter respirat. Hæc si non
 semel , aut bis , sed ei semper per somnum incidant , aliaque
 prava signa adsint , lethale est. *Si vero juvat.* Id est , si pla-
 cidus sit somnus , suavis , & cum respiratione libera , qualis
 sani hominis esse solet , quique dicitur italice : *far pro.*

II. *Ubi somnus.* Unum affert exemplum *Hipp.* ut quæ si-
 milia , contrariaque sunt , intelligantur , reliqua. Sic si somnus
 aut febrim , aut sitim , aut anxietatem , aut dolorem tollat ,
 bonum : contra , malum , si hæc is augeat ex *Valles. Deli-*
rium. Tam si febrim comitem habeat , quam si ea vacet. *Se-*
dat. * *Payei.* * Vocem *Hipp.* familiarem esse notat *Mercurialis* ,
 quæ perinde significat , ac cessare faciens , & in totum delens.
 „ Non tamen certa omninò speranda salus ; nam alio morbo
 „ æger interire potest , inflammatione , aut abscessu , qui in-
 „ tus alitur , aut non tota materia morbifica , sed ejus tantum
 „ portione evicta , aut perniciosi humoris fervore paululum re-
 „ misso , vel intermisso , deinde redeunte , ut in *Philini uxo-*
 „ re. „ *Liebaut.*

III. *Si modum exceſſerint.* Si assidue ferè aut dormiat , aut

IV. Non satietas, non fames, neque aliud quidquam, quod modum *naturæ* exceſſerit, *bonum*.

V.

vigilet æger, nec longus ſomnus, nec diuturna vigilia præceſſerit. A criſi enim unum diem & noctem quoddam dormiſſe, *Galenus* ſcribit. Id ipſe nonnullis accidiſſe vidi poſt vehementes inteſtinorum, renumque cruciatus. Sic pueri interdum utiliter duos dormiunt dies: interdumque etiam quidam ægrotantes poſt 6. 7. 12. & 20. quoque dierum vigiliam in longum tempus dormire coguntur, *Hollerio* obſervante. Conſulenda igitur eſt ægrotantis natura, ætas, conſuetudo, habitus, ſtatus præcedens, anni tempus, regio, victus ratio, & alia huiusmodi, ut ſciamus, an ſomnus & vigilia modum, necnè, naturæ excedant, id eſt, vi ne morbi naturam ſuperantis, an naturæ morbum vincentis, producantur. Sed ut qui modum excedit ſomnus, nec levis eſt, nec alacritatem affert, nec vires reficit; ſæpè quoque difficili reſpirationi jungitur, ſic qui modum ſervat, licet provehatur, ferè ægrum levat & alacriorem reddit. Idem de vigilia iudicium eſto. *Qua de mea liceat mihi meminiffe materteræ. Hæc quinque menſes ſine febre vigilabat, donec Medicus quidam doctus tantum ei Peruviani corticis dedit, quantum tollendæ febrī ſufficit, extemploque ſomnum reſtituit.*

IV. Non ſatietas. Ob id inquit Hipp. ſanitatis ſtudium eſt non repleri cibis, impigrum eſſe ad labores. Quæ tamen imbecillis, nedum ægrotantibus, fugienda prorsus eſt; interdum ſanis hominibus prodeſſe ſatietatem notat *Ceſus*, præcipitque, eos, modo in convictu eſſe, modo ab eodem ſe retrahere, modo plus juſto, modo non amplius aſſumere, fortaſſe quod largior cibus ſumptus corpus purgat per cruditates, & cholericas paſſiones, *Sex. Philoſ. pyrrh. hypoth.* Ideoque haud ſemel in *lib. de diæt.* repletiones ciborum & potuum ad purganda corpora præſcribuntur. Verum nos hodie ad eadem evacuanda edacitati, ac ebrietati præferimus longè tutiora remedia: quique parce, continenter, ſobricque vivit, ſalubrius vivit. *Non fa-*
mes. Utenim fames opportunè adhibita impura ſanat corpora, humidaque ſecat, ita ultra modum producta vim debilitandi, occidendique habet, *de vet. med.* Eam porro, qui creſcunt, vix ſuſtinent; quique ſunt piarocholi * *ta anoo* * id eſt, quorum ventriculus ſuccis ſcatet acribus. Hi quippè ea preſſi vo-

munt,

V. Spontaneæ lassitudines morbos prænunciant.

VI. Quicumque dolentes parte aliqua corporis omnino dolorem non sentiunt, his mens ægrotat.

VII.

munt, torquentur, animo deficiunt, nervorumque distentione capiuntur. Hystericarum virginum, mulierumque inediam nonnullæ diutissimè ferunt. *Uxor mea dulcissima, antequam mihi nuberet, uteri, nervorumque morbis affecta vehementibus, dies egit duo & viginti prorsus sine cibo, & potu, nihilo tamen minus satis alacris. Duodecim mille tulerat dies anno præcedenti.*

Nec aliud. Siquidem alibi scripserat: Labor, cibus, potus, seminus, venus, omnia mediocria esse debent. Adde & cetera, ut aerem, quietem, vigiliam, excretionem, & retentionem excrementorum, animique affectus, ex *Holler*.

V. *Spontaneæ.* „ Quia absque motu & calore, vel ulla alia „ occasione externa oriuntur. „ *Mercurial.* *Lassitudines.* „ Ut sæpius videmus nonnullos genua habere quasi fatigata, „ grave universum corpus, & membra gravia, ita ut prædore „ movere non audeant „ *Hollerius.* Id ubi sine causa manifesta accidit, & aut perseverat, aut sæpius revertitur, ut plurimum morbum prænunciat.

VI. *Dolentes.* Qui urgente causa doloris, nullo modo dolorem percipiunt, aut longè minus percipiunt, quam deberent. Ut in pleuritide & peripneumonia, si dolor magnus repente occultetur, febris, siti, tussi, respirandi difficultate, vigiliisque permanentibus, aut incrementibus; si in erysipelate, in ossium fracturis, in vulneribus, in angina, ceterisque inflammationibus, præsertim internis, continuo dolor, qui modo vehementius urgebat, sine ratione, id est, sine crisi, sineve in aliam partem decubitu, aut sine solutione, vel imminutione morbi, evanescat, intereaque febris, corporis jactatio, vigiliæ, æstus, aliaque prava signa persistent, premantque, vel delirare hominem, vel deliraturum „ suspicari æquum est „ Hoc autem sæpe, id est, ferè semper solet evenire „ *Philotheus.* *Mens ægrotat.* Æger licet sapienter loquatur, agatque. Non enim modo delirat, qui aliena à ratione facit, aut loquitur, sed etiam qui dolorem non sentit, quem sentire deberet, qui non sitit cum per febrem exæstuet; & qui taciturnior, aut loquacior, quam pro consuetudine, est, aut oculos frequentius movet, clausos-

VII. Quæ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet ; quæ verò brevi, breviter.

VIII. Si à morbo cibum assumens quis non corroboratur , pluri alimento corpus uti significatur; quod si non assumenti cibum hoc accadat, scire oportet , quod indiget evacuatione.

IX. Corpora cum quispiam purgare voluerit , oportet fluida facere.

X. *Impura* corpora quanto plus nutries , tanto magis lædes.

XI. Facilius est *refici* potu , quam cibis.

XII.

fosve perpetuo habet , quique motibus cietur incompressis ; aut si verecundus , & sine dolore est , tamen flatum cum strepitu emittit. Hi enim omnes paullo post ferè solent in absurdos delabi sermones.

VII. *Longo*. Ut uno mense , aut pluribus. *Lente*. Id est, alimento modico , qualitate mediocriter nutriente , & brevibus intervallis , & ter , aut quater die. *Breviter*. Id est , celeriter , pleniusque in qualitate , copia , & frequentia.

VIII. *Assumens*. Benè appetens , & iusta quantitate cibum sumens. *Non corroboratur*. Scilicet non vires , non alacritatem , non colorem , nec habitum recuperat corporis. *Pluri*. Copiosiore , aut crassiore sic , ut concoqui nequeat , atque in corpus digeri universum. Modicus ergo , & mediocriter nutriens ei convenit. *Non assumenti*. Id est , cibum fastidienti.

IX. *Fluida*. Utebantur ad id veteres cibis humidis , quiete corporis , balneis , fomentis , leni frictione. Cohibebant insuper alvum , cui pharmaco vomitus movendus erat ; eamque solvebant , cum per inferiorem ventrem purgandum esset. *v. Aph. 67. VII.*

X. *Impura*. Quibus cibi est fastidium , fitis , oris amarities , atque insuavitas.

XI. *Potu*. Qui celeri nutritione indigent , iis humidum ad reficiendas vires medicamen optimum. *De aliment*. Nihil porro vino promptius vires instaurat , præsertim meraciori , profusa dejectas alvo , aut nimis sudoribus , aut fluxu sanguinis. Quam primum enim id fauces subit ac stomachum , sic soli-

XII. Quæ relinquuntur in morbis *post judicationem*, recidivas facere consueverunt.

XIII. Quibuscumque crisis, id est judicatio, fit, his nox gravis ante accessionem; quæ verò subsequitur, magna ex parte levior exiit.

XIV. In profluviiis alvi mutationes, excrementorum juvant, nisi ad mala mutatio fiat.

XV.

lida harum partium irritat, ut reliqua ceterarum partium momento erigantur: ex quo arteriæ micant fortius, & homo reviviscere incipit. Jurulenta vero, cum ea ipsa solida multo segnius irritent, vires quoque longè segnius, tardiusque recreant; quamquam uberius, postquam vasa sanguinis ingressa fuerint, imbecillos nutriant. Quamobrem una quoque ad ea confugere expedit.

XII. *Quæ relinquuntur.* Ut si fitis remanet, insuavitas oris, cibi fastidium, vigiliæ, somni turbulenti, lassitudo totius corporis. *Judicationem.* Crisim, v. *Aph. seq.*

XIII. *Crisis.* Id est, judicatio, quæ solutio est morbi, duas habet partes: perturbationem, seu accidentium maximam vehementiam, & succi peccantis evacuationem. *Nox gravis ante accessionem.* Nimirum gravis ob criticam perturbationem, quæ tum temporis incidit, primaque crisis pars est. *Magna ex parte levior.* Ferè namque levior est nox, quæ evacuationem succi peccantis sequitur, aut comitatur. *Accessionem.* Paroxysmum, seu criticam perturbationem, quæ evacuationem præcedit humoris morbifici.

XIV. *In profluviiis.* Cum in iis, quæ per acutas febres fiunt, tum in ceteris, quæ sine febre sunt, aut ei, exiguæ tamen, intermittentique junguntur, si excrementorum copia, coloris, compages, modus evacuationis, excretionumque numerus post aliquot mutetur dies, bonum est, modo ne ad mala transitus fiat; ut quum liquida dejectio in perliquidam, crassiuscula in liquidam, mediocris in copiosorem, quæ vires exhauriat, permutatur; aut ubi ex flava fit æruginosa, ex hac viridis, ex viridi nigra, aut si cui alvus cum stridore, frequenterque, & ex brevibus intervallis fertur, quæ ante contrario modo ferebatur. *Vid. lib. II. præfag. not. 13. seqq.*

XV. Ubi fauces ægrotant , aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere oportet. Nam si bilio-
sæ fuerint, corpus una ægrotat ; si verò similes sanis, tu-
tum est corpus nutrire.

XVI. Ubi fames , laborandum non est.

XVII. Ubi cibus præter naturam plus ingestus est,
hic morbum facit ; ostendit autem sanatio.

XVIII. Eorum , quæ universim , & velociter nu-
triant , veloces quoque fiunt excretiones.

XIX. Acutorum morborum non omninò sunt cer-
tæ prænuntiationes , aut salutis , aut mortis.

XX. Quibus juvenibus adhuc alvus humecta est , his
senescentibus exsiccat : quibus verò juvenibus adhuc al-
vus sicca est , his senescentibus humectatur.

XXI.

XV. *Tubercula.* Intellige quæcumque cutis vitia. *Excre-
tiones.* Non alvi modo dejectiones , sed & urinas , & sputa in
quantitate , qualitate , colore , tempore , & modo quo pro-
deunt.

XVII. *Plus.* Id est , copiosior , quam possit ventriculus co-
quere.

XVIII. *Universim , & velociter.* Id est , affatim, confertim,
celeriter. *Excretiones.* Quæ per alvum , urinas , & insensibi-
lem transpirationem fiunt. *Holler.*

XIX. *Acutorum.* Acuti morbi sunt , in quibus continua
febri æger exæstuat , sititque , & vigilat, aut diuturno gravique
somnia premitur: tum & ii quoque, in quibus febris magna con-
tinuaque ex insigni aliqua viscerum , membrorumque inflam-
matione orta est. *Non omninò.* Sive cum *Galeno* intelligas: non
ex toto sunt certæ , non in omnibus morbis , neque in acutis om-
nibus certæ sunt , sive cum *Celso* dicas : in acutis morbis fallaces
magis esse notas & salutis , & mortis , semper scite dixeris : &
quo diutius acuti morbi exitum salutarem , letalemque reticue-
ris , eo scitius facies.

XX. *Exsiccat.* Adde : plerumque , annotante *Celso* his
verbis : quibus juvenibus fluxit alvus , plerumque in senectute
contrahitur , quibus in adolescentia fuit adstricta , sæpe in sene-
ctute solvitur ,, intelligenda hæc ,, inquit *Heurnius* ,, ut sem-
per servetur in utraque ætate eadem victus ratio.

XXI. Famem thorexis, id est vini *meracioris* potio, solvit.

XXII. Quicumque morbi ex repletionem fiunt, curat
eva-

XXI. *Solvit.* Ut aqua, quæ edax Hippoc. dicitur, famem acuit, sic hanc eandem vinum levat, minuitve. Habet enim & hanc significationem verbum * *lyei* * *solvit*. Perperam igitur de fame canina locutum plerique arbitrantur Hippocratem. Nec modo ad famem reprimendam vinum valet, sed interdum quoque ad vomitum, volvulumque sedandum. *Nob. mulieri septuagenariae cholera affecta protraheretur morbus ad dies 20. Febris, sitis, astus aderat cum extremorum perfrigeratione. Difficilis erat spiritus, pulsus imbecillus, vomitus frequens, quo iis, quæ descenderant, præter fatorem prorsus similia excludebantur. Morbus remediis exasperabatur. Vinum merum frequenter avideque, citra satietatem tamen, epotum intra paucos dies vomitum, febremque dispulit. Eodemque ipso ad satietatem, cum avidissimè appeteretur, dato, uxor sanabatur Fabri Ferrarii annum agens tertium supra trigessimum, tentata volvulo. Primis quidem vicibus vinum evomit una cum stercore, deinde retinuit, alvusque septem dies adstricta cum esset, solvebatur, vomitus desit, sensimque etiam tumor, dolorque ventris evanuit cum febre, sitique.*

XXII. *Repletionem.* Sive nimia sit ciborum potuumque repletio, sive sanguinis, aliorumque humorum redundantia in vasis.

Evacuatio. Quæ fit vomitibus, dejectionibus, sputis, sudoribus, urinis, halitu per cutis spiracula, sanguinis profusione è naribus, hæmorrhoidibus, utero, ejusdemque detractione per venas, perque cucurbitulas. *Repletio.* Si quis ob laborem dolet, aut ob jejuniū animo linquitur, vertigineque tentatur ac vigilia, si ob nimiam sanguinis eruptionem malè cibos coquit, iique crudi descendunt, aut pedes tument, & decolor est, aut capitis dolore cruciatur: quiete ei, alimentisque opus est, quibus reficiatur, recreeturque, sanguisque restituatur amissus. Corpus namque præter cetera, implet quies, somnus, „ animi securitas, frequentior cibus, & quantum plenissimè „ potest digerere „ *Celsus.* & *aliorum contrarietas.* His docemur, contrariis curanda contraria esse, v. g. calida refrigerari, frigida calefieri, distenta solvi, soluta distendi, aliaque hujus generis.

evacuatio ; & quicumque ex evacuatione , repletio ; & aliorum contrarietas.

XXIII. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

XXIV. Septenorum quartus est index. Alterius septimanæ octavus principium. Est autem & undecimus contemplabilis ; ipse enim quartus est alterius septimanæ. Rursus verò & decimus septimus contemplabilis ; ipse siquidem quartus est à quarto decimo, septimus verò ab undecimo.

XXV. Æstivæ quartanæ magna ex parte breves ; autumnales longæ , & maximè , quæ hiemem attingunt.

XXVI. Febrem convulsioni supervenire melius est, quam feбри convulsionem.

C

XXVII.

XXIII. *Acuti morbi.* Ii potissimum , qui à bile excitantur, regione calida , ætate , & anni tempora calidis ; & qui pleno cursu , nec intermisso , aut impedito à victu , vel medicamento , vel alia ratione ad judicium properant. *Liebauius. Judicantur.* Id est , crisim habent sic , ut aut ex toto desinant, aut occidant , aut ad melius , aut deterius procedant , aut in alium morbum transeant. Hæc enim in crisi fiunt.

XXIV. *Septenorum.* Dies septenarii sunt propriè critici , ut dies 7. 14. 20. 27. 34. 40. Dies quartanarii , ut 4. 11. 17. sunt indices , quippè qui indicant , quid futurum sit diebus septenariis. Dies verò intermediis , ut 3. 5. 9. 12. 18. 21. finiunt sæpè crisim inchoatam die critico. Hic sermo est de indicibus 4. 11. 17.

XXV. *Quartanæ.* Quartana febris est omnium longissima, securissima , & à morbis magnis liberat, *Hipp.* Quocirca sæpius à solstitio ad æquinoctium , vel ab uno solstitio durat ad alterum , interdum quoque ad plura extenditur. Vetus raro, nisi vere , solvitur. Vernalis , & æstiva ferè brevior autumnali , & hyberna. Hæc in morbos acutos facilè transit. Si cum labe viscerum incidat , si phthisi opportuna corpora occupet, metum incutit , itemque si quotidiana fiat. Quæ variat ordinem, citius decedit.

XXVI. *Convulsiōni.* Hæc est universi corporis , uniusque,
aut

XXVII. His , qui non ex ratione levius se habent , non oportet fidere , neque multum formidare mala , quæ præter rationem eveniunt , plurima enim talia stabilia non sunt , neque multum durare , & permanere consueverunt.

XXVIII.

aut plurium ejus partium modo contentio , modo contractio , modo concussio , morbo , non voluntate , orta. *Melius est.* Coac. legimus : *Convulsiones repentinas solvit febris.* Notandum tamen , non semper feбри convulsionem solvi. Certè convulsionem ex vulnere , fractura , combustione , ulcere , ex profusio sanguinis , ex immodica dejectione , ex nimio vomitu , febris non tollit. Quæ igitur feбри convulsio non solvitur , quæcumque ex causa eadem oriatur , periculum infert. Febris porro , ut convulsionem pellat , nec ita debilis esse debet , ut nihil aut parum efficiat , nec ita fortis , ut vires exsolvat , aut inflammationem creet. *De convuls. vid. Aph. 57. IV. & 39. VI. Feбри.* Quæ sit acuta cum siti , æstu , vigiliis , doloribus , similibusque aliis signis gravibus. Hac in febre orta convulsio , præsertim morbo prægresso , perquam periculosa est , siue corpus afficiat universum , siue tantum partem. Metum minuit ætas puerilis , *coac. 4. sect. 2. tex. 31.* & febris non acuta ; quamquam & cum hac ipsa timendæ sint convulsiones post partum , abortumque , maximeque si vocis interceptio , aut artuum accedat paralysis.

XXVII. *Non ex ratione.* Si quis in acuto morbo minus febricitat , aut minus doleat , minus jactetur , deliret , vigilet , difficulterque respiret minus ; idque sine ratione ei accidat , id est , nulla præcedente crisi sudoris , dejectionis , urinarum , vomitionum , fluxus sanguinis , humorisve ad externas partes decubitus ; aut si secuta crisis est , tamen signis coctionis in urinis , *præfag. II. n. 26. seq.* præmonstrata non fuit , fidendum non est : nam horum plurima incerta sunt , nec admodum perseverare consueverunt. Idcirco *coac. scribitur : qui levantur sine signis , & cum bonis non remittunt , morbi difficiles sunt.* Sine signis autem levare , idem est ac sine ratione , sine evacuatione levare ; cum bonis non remitti significat , morbum evacuatione orta non minui. Difficilem porro morbum esse , nihil aliud est , nisi aut periculosum esse morbum , aut longum , aut

XXVIII. Febricitantium non omninò leviter , permanere corpus, & nihil minui; vel etiam plus quam ratio postulat, contabescere, malum. *Illud* enim morbi longitudinem, hoc vero *agri* imbecillitatem significat.

XXIX. Quum morbi inchoant, si quid movendum videtur, move; quum verò consistunt, ac vigent, melius est quietem habere.

XXX.

sapè recidivantem, seu recrudescentem. Quod sanè indicat percelebre illud *Hipp.* monitum: *Decretoria non decernentia, partim lethalia, partim difficilis judicationis febres significant.* Decretoriorum enim non decernentium nomine evacuationes veniunt morbum non tollentes, nec minuentes, quippeque signis concoctionis prænuntiata non fuerint. *Neque multum.* Mala per morbos evenientia utique formidare oportet, non tamen admodum, si præter rationem eveniant: cum horum quoque plurima stabilia non sint, neque multum durare soleant. Sic nec vehementer formidabis vigiliam, quæ à longo somno diutius infideat, neque longum somnum, qui post nocturnas vigiliis irrepit plures; cum eo tamen ut scias, interdum accidere, notante *Heurnio* (quod ipse quoque novissimè vidi in perillustri muliere puellam enixa) *ut pertinaces vigilie per febres acutas in soporem calamitosum commigrent.* Sic neque multum verebere mala, quæ externa causa parit, aut plenior ci- bus potiusve facit, nec quæ crîsim præcedunt. II. *Aph.* 13. co- ctionis signis indicatam, nam inutili evacuato humore ferè so- lent mîtescere.

XXVIII. *Permanere.* Nihil ægrum à statu suo immutari in corporis mole. *Vel etiam plus.* Id est, si plus amittat crassi- ties, quam pro causa febris, evacuationum, & longitudinis morbi.

XXIX. *Inchoant.* Si quid tibi videtur expurgandum, sive ex humorum turgentia, *Aph.* 22. I. sive ex ingluvie, sive ex oris amaritie, fastidio, adstrictione alvi, pravis ructibus; id aut fortî, aut leni pharmaco, pro ut virium, morbi- que ratio postulat, per initia facito, sive per id temporis, quo nulla coctio in excrementis apparet, neque febris increvit sic, ut purgationem prohibeat. *Consistunt, ac vigent.* Id est, quum acuti morbi, nam de his est sermo, maximam adepti sunt ve- he-

XXX. Circa initia , & fines *morborum*, omnia imbecilliora ; quum vero consistunt , fortiora.

XXXI. Ejus , qui ex ægritudine bene cibatur, nihil proficere corpus, malum.

XXXII. Omnes ferè, qui malè se habent, circa initia bene cibati , nec quidquam proficientes , circa finem rursus cibum non appetunt : qui vero circa initia cibum prorsus non appetunt , postea benè appetentes, ii melius evadunt.

XXXIII. In quovis morbo mente constare, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum: contra vero se habere , malum.

XXXIV.

hementiam, medicum expedit quietem agere. Quamobrem, ni fallor , memini , me Fran. *Vallesium* legisse dicentem : malle se ab indocto curari Medico , qui sciat in morbis quiescere, quam à docto, qui nesciat. Ac profecto si per id temporis, quo maximè natura studet cõtionì , ægrotantem exhaustas iteratis sanguinis missionibus , remediisque alvum cientibus ; & potu ultra satietatem dato assiduè fatiges, clysteribusque singulo die, interdum etiam bis die urgeas , crìsim ne , aut qualem crìsim sperare licebit ?

XXX. *Initia*. Accidentia morbi mitiora sunt per initia, nisi morbus per initia vigorem acquirat , *Aph. 10. I. Consistunt*. Id est , cum morbi ad vigorem , statumque , seu ad maximam vehementiam pervenerint.

XXXI. *Nihil proficere*. Neque corporis crassitiem , neque vires , neque colorem acquirendo. *v. Aph. 8. II.*

XXXII. *Omnes ferè*. Id est , ferè qui per initia morbi , aut convalescentiæ appetentes abundè comedunt ; nec quicquam proficiunt , circa finem rursus cibum averfantur : qui verò per initia cibum vehementer fastidiunt , postea autem benè appetunt , ii melius evadunt ; quoniam citius à morbo liberantur, & minus recidivare solent.

XXXIII. *Mente constare*. Mente constat , qui nec absurda loquitur , nec motus habet incompósitos , nec mutatis est moribus & ingenio ; & si qua parte laborat , dolorem aut noxam sentit. *Bene se habere*. Cibum , potum , & remedia facilè & alacriter sumere.

XXXIV. In morbis minus periclitantur , quorum naturæ , aut ætati , aut habitui , aut tempori magis congruit morbus , quam quibus secundum nihil istorum congruit.

XXXV. In quovis morbo partes ad umbilicum , & imum ventrem attinentes crassitudinem habere melius est ; multum verò extenuari , ac contabescere , pravam. Sed & hoc quoque ad inferiores purgationes , periculosum.

XXXVI. Qui salubritatem corporis habent , per medicamenta evacuati cito exolvuntur , & qui pravo utuntur cibo.

XXXVII. Qui bene se habent corpore , difficulter ferunt purgationes.

XXXVIII.

XXXIV. *Magis congruit.* Sic familiares sunt juvenibus febres acutæ , viris melancholici morbi , pueris epilepsiæ , pleuritides hiemi , tertianæ febres ætati , quartanæ autumnus.

XXXV. *Crassitudinem.* Intellige moderatam crassitiem. *Inferiores purgationes.* Hujusmodi extenuatio infernas prohibet purgationes : quia inde alvi fluxus timetur , qui talibus perniciosus esse consuevit. *Martianus.*

XXXVI. *Salubritatem.* Rectius *nimiam crassitudinem* exposuerim auctoritate permotus *Hipp.* Ut enim *Aph. 3. I. * eve-xiai epi hacron ** non *salubritates* , neque *sanitates ad summum eve-cta* quis scite verterit , sed *plenitudines* , aut *crassitudines summae corporis* , sic hic loci ** hygieinoos echontes ta soomata ** tum etiam sequenti aphorismo ** eu ta soomata echontes ** minus rectè exponitur : *sana habentes corpora* , seu *qui bene se habent corpore* : sed , *qui sunt valde crassi* , quique alibi dicuntur ** oi pachees sphodra. ** Confirmatur hæc mea versio *lib. de dentit.* ubi corpulentiores pueros inter dentiendum convulsio-nibus facilius tentari legimus : & *lib. de loc. in hom.* ubi non ante purgandum esse scribitur plenum , tensusque corpus , quam laxatum , molliumque fuerit. *Exolvuntur.* Id est , animo deficiunt. *v. Aph. 41.*

XXXVII. *Purgationes.* Eas præsertim intellige , quæ fiunt purgantibus fortioribus , cujusmodi apud antiquos erat elleborus , peplium , scammonium , & id genus alia.

XXXVIII. Parum deterior potus, aut cibus, suavior autem, melioribus quidem, sed minus suavibus est præferendus.

XXXIX. Seniores juvenibus, ut plurimum ægrotant, minus; qui verò morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem.

XL. Raucedines, & gravedines in valde senibus coctionem non admittunt.

XLI. Qui frequenter, ac fortiter absque causa manifesta exsolvuntur, de repente moriuntur.

XLII. Solvere *apoplexiam* fortem, impossibile est; debilem verò non facile.

XLIII.

XXXVIII. *Præferendus.* Præsertim ubi est dejecta appetentia: quin imò si æger cibi genus omne refugiat, & evomat, deterrima quoque concedi semel, aut iterum debent ad vires servandas: sæpè enim evenit, ut ex malo illo cibo assumpto, at expetito, natura instauretur, & morbus omnino quasi conclamatus superetur. *Septal. caut.*

XXXIX. *Seniores.* Hic senes intellige, in quacumque senectutis parte sint constituti. *Longi.* Hujusmodi sunt articulorum dolores, urinæ difficultates, stillicidia, catarrhi, lipituidines, &c.

XL. *Gravedines.* Per quas in nares humor distillat; ex his pituita profluit, caput dolet, gravitas percipitur, & sternutamenta frequenter incidunt. *Coctionem non admittunt.* Id est, non sanantur, nisi perraro, maximè si contumax fuerit morbus, nec à sole, aere, laboreve genitus.

XLI. *Exsolvuntur.* Exsolutio est, in qua ægri languent, pulsus deficit, & procedente malo nec moventur, nec sentiunt. Ut hæc occidat repente, debet esse vehemens, frequens, sine causa manifesta, non orta vitio stomachi, aut uteri, sed cordi primitus inhærescens, crebraque cum cordis palpitatione accedens. *v. Lomnium in obs.*

XLII. *Fortem.* In qua æger amisso sensu, & motu stertit difficillimè respirans. A spirandi angustia sudor prorruptus mortem subesse ostendit. *v. 4. coac.* Sed etiam si sensus remaneat, & aliquis motus, dummodo stertor adsit, aut respi-

ra-

XLIII. Strangulati, & dissoluti, nondum *tamen* mortui, non referuntur, quibus spuma circa os fuerit.

XLIV. Qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quam qui graciles.

XLV.

ratio difficilis, inæqualis, aut intercepta, intermittensque; aut sine his sopor, & profundus somnus ingruat, cum saliva ex ore exstillante, & prohibita, aut admodum impedita deglutatione; fortis nihilominus erit apoplexia, nulla ferè medicabilis arte. Quorum alii eodem die pereunt, alii tertio, quartove, alii septimo cum lenta plerumque febris. *Debilem.* Quæ longè minus respirationem lædit, minus deglutationem prohibet, minus vocem depravat, nec similem sudorem, somnum, atque oscitationem movet, nec internos, externosque sensus similiter tollit; &, ut brevibus dicam, mitiora accidentia invehit. *Non facile.* Eorum sunt, qui spiritum difficulter trahentes, sæpius etiam vomentes, alimenta respuentes, oscitantes, sopore affecti, voce privati, sensibus carentes, secunda tamen die, nisi paullo post, sic videntur relevari, ut brevi evasuros putet; cum interim paucis post diebus, febris licet corripiantur, intereant, alii quidem sensim aucto morbo, alii affatim recrudescente. Sunt etiam, qui ex levissima apoplexia, scilicet ex sola oris distorsione, vocisque depravatione sensim in fortem apoplexiam delabuntur. Iccirco caute præfagiendum. Ceterum etsi sanetur morbus, reverti tamen solet in senibus intra triennium, sæpeque post annum. Eiusdemque reditum non raro præcedit oblivio, somnolentia, vertigo, auriumque tintitus. Interdum quoque non voluntaria mictio, membrorum stupor, tremorve, vocis læsio, dolores artuum, aut capitis anteire consueverunt.

XLIII. *Strangulati.* Quibus collum laqueo interceptum est. *Et dissoluti.* Qui per vim strangulationis neque moventur, neque sentiunt. *Hollerius.* *Celsus* vertit: qui ex suspendio detractus est. *Cornarius dolabell.* in *Æginet. lib. 3. cap. 27.* putat legendum **Cataduomenoon** aphorismumque sic vertit: qui strangulantur, & submerguntur, nondum autem mortui sunt, &c. *Non referuntur.* Id est, ad vitam non redeunt; aut, nisi rarissimè, testante *Galeno.*

XLIV. *Natura.* Qui primigenia conformatione, non autem

XLV. Quicumque juvenes morbo comitali laborant, mutatione maximè ætatis, & temporum, & locorum, & victuum quoque liberantur.

XLVI. Duobus doloribus simul, *non tamen* eundem locum, infestantibus, vehementior alterum obscurat.

XLVII. Dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quam jam confecto.

XLVIII. In omni corporis motu, ubi laborare cœperit, quies statim lassitudinem aufert.

IL. Qui consueti *sunt* solitos labores ferre, etsi fuerint imbecilles, & senes, non consuetis fortibus, atque juvenibus facilius ferunt.

L.

à victus ratione obesi sunt, vasis angustis, corpore crasso, sed parvo, ossibus parvis, cervice brevi, crassaque, habitu corporis vix perspirabili.

XLV. *Comitali.* Epilepsia; qua sæpè liberantur pueri, & puberes cum adolescunt, & asperiores vocem edere incipiunt, scilicet aut anno evadunt 14. aut 18. aut 20. aut 25. Fœminæ verò, ubi primum menses fluunt, nisi morbus ab organico cerebri vitio ortum traxerit. Solvitur etiam febre interdum acuta, interdum intermittente, ac potissimum quartana. Cutis quoque vitiis quandoque discutitur, sanguinis profluvio de naribus, hæmorrhoidum fluxu, conceptione, partu, nonnumquam etiam terrore. Sed morbus resistit hereditarius, essentialis, ac congenitus, quem non vitiosus humor parit, sed depravata structura fibrarum cerebri, nervorumque.

XLVI. *Simul.* Sensus est, si duo dolores simul, id est, eodem tempore diversas corporis partes, vel eandem, *ut Oribasius legit* (quæ tamen, *addit Hollerius*) latitudinem habeat, occupent, vehementior minus vehementem obscurat.

XLVII. *Dolores.* Cum in materia lenta & pituitosa particulæ sulphuræ, ipsaque effervescentia desideratur, vel levissima reperitur; nullo pariter modo, vel levissimè tantum dolor, & febris occupat; tum verò mediocriter vexat uterque, cum materia mediam naturam induerit inter substantias expostas. *v. Genga.*

L. Quæ ex longo tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, insuetis minus molestare solent. Oportet igitur quoque ad insueta permutari.

LI. Plurimum, atque repente evacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, sive quovis alio modo corpus movere, periculosum; quoniam omne *nimum* est naturæ inimicum. Sed quod paulatim fit, tutum est, tum alias, tum quum ab altero ad alterum transitus fit.

LII. Omnia secundum rationem facienti, si non *succedant* secundum rationem, non est transeundum ad aliud; stante eo, quod à principio visum est.

LIII. Quicumque alvos humidus habent, siquidem juvenes fuerint, melius *degunt* his, qui siccus habent. Ad senectam verò deterius *degunt*; nam senescentibus magna ex parte *exsiccantur*.

D

LIV.

L. *Ad insueta permutari*. Aliquando ad insueta transire oportet, ne, si quando ad insueta transire cogimur, vehementer lædamur. At *Heurnius* legit * *sinethea* * *consueta*, ex antiq. exempl. Rom. ideoque consuetorum usum laudat.


LI. *Evacuare*. Sive purgatione, sive missione sanguinis, sive elicitis sudoribus, sive abstinentia, sive secta parte, unde plurimum puris, ut in suppuratis, aut aquæ, ut in hydropicis, effluat.

LII. *Secundum rationem*. Explorata optimè natura morbi, & ejusdem causis. *Non est transeundum ad aliud*. Adde: statim, ex *Oribasio*, nam tunc magis læditur ægrotus. Ut si credis, remedia profutura adstringentia, aut incrassantia, nec tamen profint adhibita, non debes continuo ad relaxantia, aut attenuantia transire, si manet adhuc adstringendi, aut incrassandi necessitas. Quod si hæc permutetur, erunt quoque commutanda præsidia.

LIII. *Alvos humidus*. Id est, dejectiones alvi frequentes, & molles. *Melius degunt*. Quia minora congerendo excrementa plures morbos effugiunt. v. de aer. aqu. & loc. *Deterius degunt*. Quia cum fere senibus exsiccetur alvus, facile inde febres, capitis gravitas, renum, vesicæ, & artuum morbi nascuntur. vid. l. c. & *lacot. comm. I. lib. 7. coac.*

LIV. *Proceritas* corporis juventæ quidem , nec indecens , neque illiberalis: senectæ vero inutilis , & deterior brevitate.

LIV. *Inutilis*. Nam proceri senes , præsertim si tenues etiam fuerint , incurvantur : „ obliquatur enim spina , & præ senectute , & doloribus ; nam hæc colligandi vim habent“. *De articul.*



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO III.

I. **M**utationes temporum potissimum pariunt morbos , & in quibusdam temporibus magnæ mutationes aut frigoris , aut caloris ; & alia pro ratione eodem modo.

II. Naturarum , hæc quidem ad ætatem , hæc verò ad hiemem benè , malevè se habent.

III. Morbi quoque alii ad alia benè , malevè se habent ; & quædam ætates ad tempora , & loca , & victus genera.

IV. In temporibus , quando eadem diè modo calor , modo frigus fit , autumnales morbos expectare oportet.

V.

I. *Mutationes temporum*. Id est , successiones naturales partium anni. *Pariunt morbos*. Id aer efficit ; cui per omnes corporis poros continuus , facilisque patet ingressus , & egressus. *Keil. static.*

II. *He quidem*. Nam & natura à natura , & ætas ab ætate valde differt. *De frast.*

III. *Ad alia*. Videlicet ad anni tempora , regiones , &c. *Ætates*. Ob id , inquit *Celsus* , inimica senibus hiems , æstas adolescentibus est.

V. *Austri* auditum hebetantes, caliginosi, caput gravantes, pigri, dissolventes. Quando hujuscemodi tempestas prævaluerit, talia in morbis patiuntur. At si aquilonia fuerit, tusses, *faucium asperitates*, alvi duræ, difficultates, urinæ horrores, *laterum* dolores, & pectoris *fiunt*. Quando hæc tempestas prævaluerit, talia in morbis expectare oportet.

VI. Quando æstas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet.

VII. In siccitatibus febres acutæ fiunt: & si annus magna ex parte talis fuerit, qualem fecerit constitutionem, tales plurimum morbos oportet expectare.

VIII. In constantibus temporibus, quum tempestive tempestiva redduntur, morbi constantes, & boni iudicii fiunt: in inconstantibus autem inconstantes, & mali iudicii.

IX. Autumno morbi acutissimi, atque exitiales maxima ex parte. Ver vero saluberrimum, & minime exitiale.

X. Autumnus tabidis malus.

XI.

V. *Austri*. Si diutius spiraverint, & remissius, tum namque sunt calidi, & humidi, & hos morbos pariunt: minus vero; quod tamen rarum; si ineunte vere frigidi hi venti violentius perflent. *Difficultates. v. aph. 31.*

VI. *Sudores*. Intellige criticos, hoc est, qui fiunt diebus criticis, non modo in febribus, sed etiam in aliis morbis, qui sudore finiuntur.

VII. *Siccitatibus*. Rectius, *squalloribus*: nam * *auchmos* * proprie siccitatem ex ingenti æstu significat.

VIII. *Constantibus*. Id est, moderatis, bene constitutis, in quibus & pluvix, & venti, & serenitates vicissim fiunt. *Constantes*. Id est, malignitatis, & inæqualitatis expertes. *Boni iudicii*. Qui salubrem crism, & sine recidiva subeunt.

X. *Tabidis*. Tam iis, quibus pulmo exulceratus est, quam iis, qui quomodocunque extrema sunt macie confecti, aut diuturnis malis fatigati.

XI. De temporibus, liquidem hiems sicca, & aquilonia fuerit, ver vero pluviosum, & australe; necesse est æstate febres acutas, & *ophthalmias*, & *dysenterias fieri*; præcipue vero mulieribus, & viris, qui natura sunt humidiores.

XII. Si vero hiems australis, & pluviosa, & serena fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres, quibus partus ad ver inest, ex quacunque occasione abortiunt. Quæ vero pariunt, imbecilles, & morbidos infantes pariunt: quare, vel statim intereunt, vel tenues, & valetudinarii vivunt. Ceteris vero mortalibus *dysenteria*, & *ophthalmia* siccæ fiunt. Senibus autem destillationes, quæ cito interiment.

XIII. Si vero æstas sicca fuerit, & aquilonia, autumnus vero pluviosus, & australis, dolores capitis ad hiemem fiunt, & tusses, raucedines, atque gravedines; quibusdam autem & tabes.

XIV. Si vero aquilonius sit, & ficcus, his qui naturam habent humidiores, & mulieribus, conferet;
re-

XI. *Ophthalmios*. Inflammationes sunt albæ oculorum tuni-
cæ cum humiditate conjunctæ. *Dysenteria*. Exulcerationes intestinorum dejectiones ramentosas, cruentas, & dolorificas inferentes.

XII. *Dysenteria*. v. aph. 11. *Ophthalmia*. v. aph. præc. *Sicca*. Ita dictæ, vel quod nihil excernatur ex oculis, vel quod humor effluant, paucus, acer, nitrosus. *Ballon*. definit. *Senibus*. *Galenus*, & *Septalius* legunt, valde senibus, addita voce * *agan*, * *valde*. *Destillationes*. * *catarrois*, * *catarrhi*. Fortasse hac voce pro apoplexia est usus *Hippocrat*: nam de aer. aqu. & loc. legitur: „valde autem senibus catarrhi... ita ut „repente aliqui læsa mente pereant, alii vero resoluti“ id est *paralytici* „dextra, aut sinistra parte fiant“.

XIII. *Gravedines*. v. aph. 40. II. *Tabes*. Potissimum illæ, quæ pulmonum exulcerationem sequuntur.

XIV. *Ophthalmia sicca*. v. aph. 11. & 12. *Gravedines*. Mendum hic subest: male enim legitur * *coryzai*, * *gravedines*, pro * *chronici*, * hoc est, longæ febres, ut scriptum est lib. de aer. aqu. & loc. *Atra biles*. v. aphor. 20.

reliquis autem erunt *ophthalmia* sicca, & febres acutæ, & gravedines, nonnullis vero & atræ biles.

XV. Ex anni autem constitutionibus, quod in totum dixerim, siccitates imbribus sunt salubrioribus, & minus mortiferæ.

XVI. Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiunt, febres longæ, alvi profluvia, putredines, morbi comitiales, *apoplexia*, & angina. In *squaloribus* autem morbi *tabifici*, *ophthalmia*, articulorum dolores, stillicidia urinæ, & dysenteria.

XVII. Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem corpora densant, contendunt, & bene mobilia, coloratiora, melius audientia faciunt, alvos exsiccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis obfederit, dolorem augment. Austrinæ dissolvunt corpora, & humectant, auditum obtundunt, caput aggravant, vertigines faciunt, oculis, atque corporibus difficilem motum præstant, & alvos humectant.

XVIII. Per tempora anni, vere quidem, & primæ ætate pueri, & qui hos sequuntur ætate, optime degunt, & sani sunt maxime. Ætate vero, & autumnusque ad aliquid senes: *reliquo autumnus*, & hieme qui mediam ætatem habent.

XIX. Morbi omnes quidem in omnibus anni temporibus fiunt; quidam vero magis in quibusdam ipsorum, & fiunt, & exacerbantur.

XX.

XV. *Siccitates*, *Serenitates* vertit *Celsus*, quum inquit: „saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluvii, quam tantum „nebulosi, nubilive“.

XVI. *Putredines*. Ulcera putrida, malique moris pustulæ, & alii tumores. *Morbi tabifici*. *Tabes*, *phthises*: quæ proprie extenuationes sunt corporis ab ulcere pulmonum; improprie vero sine eo. *Ballonius lib. cit.* putat legendum * *phthinoodees ophthalmiai*, * ut non *morbi tabifici*, & *ophthalmia*, sed *tabida ophthalmia*, seu oculorum consumptiones in *squaloribus* oriuntur. De *ophthalmia* v. *aph. II.*

XVII. *Austrina*. v. *aph. 5.*

XX. Vere etenim furores, & *melancholia*, & morbi comitiales, & profluvia sanguinis, & anginae, & gravedines, & raucedines, & lepræ, & tusses, & impetigines, & vitilignes, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, & articularum dolores.

XXI. Ætate autem nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ, & quartanæ, & vomitus, & alvi profluvia, & *ophthalmia*, & aurium dolores, & oris ulcerationes, genitalium putredines, & *sudationes*.

XXII. Autumno vero, & plurimi vel æstivi morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes, *hydropes*, & tabes, & stillicidia urinæ, & *dysenteria*, & *lienteria*, & coxendicum dolores, & anginae, & *asthmata*, ilei, morbi comitiales, furores, *melancholia*.

XXIII. Hieme vero *pleuritides*, & *peripneumonia*, *lethargi*, gravedines, raucedines, tusses, dolores pectoris, & laterum, atque lumborum, capitis dolores, vertigines, & apoplexiæ.

XXIV.

XX. *Melancholia*. Desipientiæ sunt sine febre cum timore, & mæstitia. *Comitiales*. Quos epilepsiam quoque appollant, morbum caducum, lunaticum, sacrum. *Gravedines*. v. aph. 40. II. *Impetigines*. Summæ sunt cutis asperitates cum leni pruritu: increscens vero morbus sædo fursure, non squamis quasi piscium, ut lepra; totum fere corpus occupat. *Vitilignes*. Vitiosæ & sædæ cutis maculæ sine manifesta asperitate, coloris modo albidæ, modo fusci.

XXI. *Ophthalmia*. v. aph. 11. *Sudationes*. Pustulæ quædam sunt genitalium partium, summam cutem occupantes, & exulcerantes.

XXII. *Lienes*. Id est, lienis obstructions, tumores, inflammationes. *Tabes*, v. aph. 17. *Dysenteria*. v. aph. 11. *Lienteria*. Quum cibi crudi, nulloque modo immutati descendunt. *Asthmata*. Id est, frequens & difficilis sine febre respiratio. *Ilei*. Volvulus. v. aph. 44. VI. *Melancholia*. v. aph. 20.

XXIII. *Pleuritides*. Morbus est, quo membrana costas vestiens, pleura dicta, inflammatur. Ital. *punta* nominatur.

Pe-

XXIV. In ætatibus autem talia contingunt ; parvis, & nuper natis puerulis oris ulcera , quæ aphthæ vocantur , vomitus , tusses , vigilæ , pavores , umbilici inflammationes , aurium humiditates.

XXV. In progressu vero , quum jam dentire incipiunt , gingivarum prurigines , febres , convulsiones , alvi profluvia , & maxime quum caninos edunt dentes , & his præsertim pueris , qui crassissimi sunt , & alvos duras habent.

XXVI. Quum vero jam magis adoleverint , inflammationes tonsillarum , & vertebrarum , quæ in occipitio sunt , luxationes ad interiora , althmata , calculi , lumbrici rotundi , ascarides , verrucæ pensiles , satyriasmus , strumæ , & alia tubercula ; sed præcipue antedicta.

XXVII.

Peripneumoniæ. Pulmonum inflammationes. *Lethargi.* Inexplebilis dormiendi necessitas cum febre lenta , oblivione , ignavia , & stupiditate in lethargo est. *Gravedines.* v. aph. 13.

XXIV. *Pavores.* Concussiones totius corporis , aut partium , iis similes , quæ repentino timore excitantur.

XXV. *Canines.* Dentes , qui à basi lata ac rotunda in acutissimum mucronem desinunt. Inter incisorios , & molares siti sunt , utrinque duo sursum , deorsumque. *Crassissimi.* Quod facilius contrahantur horum fibræ nimio humore distentæ , maximeque si adstricta sit alvus.

XXVI. *Vertebrarum.* Rachitidem fortasse videtur innuere Hipp. quæ spinæ distorsionem , & spirandi difficultatem infert.

Ascarides. Tenuis quidam lumbrici , vermibus asimiles , qui in parte potissimum inferiore intestini recti consistunt , vehementem pruritum iis in locis excitantes. *Verrucæ.* Cutis sunt tumores coloris ejusdem , duriores , & paulo asperiores , infra tenues , ad cutem latiores , raro fabæ magnitudinem excedentes , qui quasi pendere videntur. *Satyriasmus.* Tumores sunt prolixi circum aures duarum concretionum carnis in se ipsam convolutæ. Fortasse , quos vernaculo sermone appellamus : *goltiere.* *Strumæ.* Glandulæ sunt induratæ , quibus collum , axillæ , & inguina potissimum obsidentur , scrophulæ quoque dictæ.

XXVII. Grandioribus autem, & jam accedentibus ad pubertatem, plurima ex his, & febres diuturnæ magis, & ex naribus profluvia sanguinis.

XXVIII. Plurimæ autem passiones puerulis judicantur, nonnullæ quidem in quadraginta diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ vero in annis septem, quædam vero jam ad *pubertatem* accedentibus: quæ vero permanferint, nec in pubertate finierint puerulis, aut feminis, quum menstrua erumpunt, consensescere consueverunt.

XXIX. Adolescentibus autem sanguinis spultiones, tabes, febres acutæ, morbus comitalis, & alii, sed præcipue antedicti.

XXX. Ultra hanc ætatem *asthmata*, *pleuritides*, pulmonum inflammationes, lethargi, phrenitides, *febres ardentes*, diuturna *alvi* profluvia, *cholera*, *dysenteria*, *lienteria*, hæmorrhoides.

XXXI. Senibus spirandi difficultates, destillationes cum tussē, urinæ stillicidia, & difficultates, articulo- rum dolores, renum passiones, vertigines, apoplexiæ, mali habitus, pruritus totius corporis, vigiliæ, alvi, oculorum, & narium humiditates, visus obtusus, glaucedines, auditus graves.

APHO-


XXVII. *Plurima ex his.* Id est, *ex his*, quæ fiebant in puerili proxima ætate.

XXVIII. *Judicantur.* Id est, desinunt.

XXIX. *Tabes v. aph. 16.*

XXX. *Asthmata v. aph. 22. Pleuritides. v. aph. 23. Phrenitides.* Inflammationes membranarum cerebri cum acuta febre, & delirio. *Cholera.* Immodicæ ventris perturbationes bilem per vomitum, & in dejectionibus excernentes. *Dysenteria. v. aph. 11. Lienteria. v. aph. 22. Hæmorrhoides.* Id est, venarum hæmorrhoidalium dolores, tumores, inflammationes, exitus, disruptiones.

XXXI. *Difficultates.* Id est, quum urina difficulter, & cum dolore ejicitur. *Mali habitus.* Corporis extenuatio cum pallore, aut ejusdem cum pallore intumescencia. *Glaucedines.* Quum naturalium humorum oculi color in cæsum mutatur.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO IV.

I. **U**Tero gerentes sunt *purganda*, si materia turget, quarto mense, & usque ad septimum, sed has minus. Juniora autem, & seniores veredi oportet.

II. In *purgantionibus* talia educere è corpore, qualia & sponte prodeuntia, utilia; quæ vero contrario modo prodeunt, cohibere oportet.

E

III.

I. *Purganda*. Intellige, purgantibus fortioribus, *aph.* 37.

II. nam levibus fere tuto purgantur quocumque graviditatis tempore. *Turget*. De humorum turgentia *vid. aph.* 22. I.

Sed has. Quæ propius ad septimum mensem accedunt. *Juniora*. Id est, reliqua graviditatis tempora.

II. In *purgantionibus*. Id est, in medicamentorum purgantium usu, sive eadem vomitum, sive alvum moveant, I. *aph.*

2. *Qualia sponte*. Multiplex esse potest interpretatio. Prima est, debere humores medicamentis educi eo modo, quo ipsa per se natura solet emittere in curatione morborum, servando nimirum evacuationis rationem, ordinem, morbi tempora, humoris copiam, viarumque consuetudinem. Ideoque in biliosis febribus dejectiones biliosas ciere studebis, prægressis costionis signis, & qua parte bilis repit. In hydrope humido remediis serum infra elicientibus purgabis morbo ineunte, & visceribus, viribusque integris. Ut si in febribus biliosis, loco bilis, serum evoces, aut in hydrope aquoso, pro sero, bilem ducas, aut vomitum, non alvum cieas, ad aliud medicamentum transeas, quo id præstes, quod natura alias utiliter facit. Altera est, imperfectos naturæ conatus, sed tamen salutares, sic esse adjuvandos, ut eundem humorem, ac eo, quo natura vergit, I. *aph.* 21. medicamentis evoces. Quod si hæc, loco

de-

III. Si qualia oportet purgari, purgentur,, confert,, & leviter ferunt, contraria vero graviter.

IV. Purgare ætate superiores magis ventres, hieme vero inferiores.

V.

dejectionis, vomitum moveant, aut serum, non bilem, educant, aut urinam, non alvum, solvant, iis utaris, quæ id, quod commodum est, efficiant. Tertia est, humores noxios una nobis cum natura esse expellendos, siquidem hæc eos salutariter moveat, sin minus, non eam modo non esse adjuvandam, sed etiam interdum comprimendam. Id quum sequitur, dicuntur humores non à notura, sed vi morbi ejici, eorumque evacuatio *symptomata* appellatur, quippe quæ nec tollat, nec minuat morbum, subindeque etiam sæpe vires frangat. Attamen si non juvat, dummodo vires consent, cohibenda statim non est, I. *aph.* 2. n. nam plenitudinem demit, progressuque temporis prodesse potest. Si vires etiam perdit, ut pulsus imbecilli celeresque fiant, motionesque corporis & sensus elanguent, animive deliquia incidant, occurrendum continuo ei est remediis ex opio paratis, adstringendique vi præditis.

III. Si qualia. Repetitio est *aph.* 25. I.

IV. Purgare. Præceptum hoc ad morbos fere pertinet curandos. Quippe ad eosdem cavendos ver aptum purgationi esse dicitur, VI. *aph.* 47. *Superiores*. Id est. Expedit ætate movere vomitum, alvum hieme. Perperam hic * *tas hanoo*, * *superiores*, cutis spiracula interpretatur *Hecquetus*. Huic sententiæ plane contrarius est *de salub. diætâ locus*, cujus liber vel ex hoc ipso spurius merito haberi potest. Ac ne ea quidem placent, quæ ad tollendam contradictionem affert *Vallesius*. Primum ad purgationem totius corporis referendum esse ratus, secundum ad eam, quæ solum ventriculum, intestinaque respicit. Nihil enim de his in textu. Neque magis arrident, quæ *Gorterus* adversus vomitum ætate ciendum tradit. Nam si vomitiones sæpius per ætatem incidentes morbis annumerantur, III. *aph.* 21. palam est, solere ventriculum per id temporis affici: neque huic ulio alio præsidio tutius citiusque fere succurritur, quam vomitum, natura, *Hippocrateque*, I. *aph.* 21. ducibus, si adest adjuvando, sin deest, excitando, IV. *aph.* 17. Illud scite monet *Vallesius* curandum, ut vomitiones mi-

V. Sub cane , & ante canem , difficiles sunt purgationes.

VI. Graciles , & facile vomentes , purgare superius , caventes hiemem.

VII. Vomentes vero difficulter , & mediocriter carnosos , per inferiora , caventes ætatem.

VIII.

non cum violentia , id est , blandis remediis , quibus his ipsis in casibus usum fuisse *Hypocratem* verisimile est , moveantur (horum enim plurima apud eundem inveniuntur) ne imbecillum per ætatem ventriculum , I. *aph.* 18. imbecillio rem medicamentis efficiamus. *Magis.* Et recte quidem , quoniam interdum accidit , ut morbus per hiemem vomitum postulet , per ætatem alvi ductionem. In universum enim succi quo vergunt , nisi quid prohibet , sunt evacuandi. Inspicienda iccirco ægotantis natura , ætas , habitus , vires , & consuetudo est.

V. *Sub cane.* A die 21. Junii usque ad 10. Septembris. Vitandus tamen semper æstus vehemens , quibuscumque diebus acciderit , in propinandis purgantibus fortioribus aut in mittendo liberalius sanguinæ.

VI. *Graciles.* Graciles natura , non tamen extenuatos intellige. His enim vomitus inutilis est , auctore *Celso*. Et sane , qui morbo , curis , vigiliis , laboribus , nimisque emarcuere evacuationibus , inimicum habent vomitum. Periculosus is quoque est iis , qui gibbi sunt , qui thoracem angustum habent , scapulasque alarum modo eminentes , qui difficulter respirant , qui diuturna tussi vexantur , qui sanguinem extussierunt , nedum qui extussiunt , aut evomunt , qui pulmonum tuberculo , vomica laborant , quique organicis cordis , pulmonumque vitiis tentantur. *Facile vomentes.* Scilicet assueti vomitibus , qui fere tuto , & sine ullo periculo aut metu hæmorrhagiæ , cephalagiæ , aut ruptionis venæ in pectore , unde phthisis , evomunt ; quibusque magna est cervix , & latus thorax. *Vid. Heurn.* *Caventes hiemem.* Quo tempore non movendus vomitus est , nisi signa adsint , quæ vomitum indicent esse necessarium , IV. *aph.* 17.

VII. *Difficulter.* Id est , qui non nisi maximo cum labore , , atque à magnis & violentis medicamentis ad vomendum coguntur , ita ut etiam vitæ discrimen , aut certe quam maxi-
mam

VIII. Tabidos vero, caventes ad superiores purgationes.

IX. Melancholicos plenius inferiores; eadem ratione contraria apponentes.

X.

„mam molestiam subeant,“ *Mercurial. Mediocriter.* Id est, qui mediocritatem illam tenent, quæ est inter graciles & * *eusarcous.* * Hi enim hoc loco videatur esse, qui sunt * *en too ichatoo*, * id est plenissimi atque crassissimi. Nam purgationem hi ipsi, II. *aph.* 37. difficulter ferunt. *Per inferiora.* Id est, medicamentis alvum ducentibus. *Caventes æstatem.* Si fieri potest: sin minus pariori purgatione, & mitioribus medicamentis utendum, *Mercurial.* Scribit *Hollerius* & suis temporibus, & in sua regione *tutius esse etiam æstate per inferiora purgare.*

VIII. *Tabidos.* * *phthinoodeas.* * Hoc nomine non tabidos modo comprehendit *Hippocrates*, sed eos etiam, qui proclives ad tabem sunt, & præsertim ad eam, quam pulmonum ulcus creat, *Mercurial.* quæque, pressius loquendo, phthisis dicitur. In hanc porro inclinati pronique sunt, qui pectus habent angustum, longum, depressum, scapulasque eminentes. Quibusque collum longum gracileque est, longæ itidem & pertenuæ manus, vox acuta aut rauca, frequens destillatio, id est, catarrhi excreatio, tussis sicca diuturna, difficilis respiratio, corporis extenuatio, genarum rubor, facilis excandescencia, calor manuum, labes hereditaria. *Caventes æstatem.* Monet *Hipp.* quammaxime cavendum esse, ne in phthificis, neve in propensis ad phthisim vomitum medicamentis moveas, neque irritamentis aliis quibuscumque, propterea quod „facile „est ex vomendi conatu vasa aliqua frangi, ipsumque ulcus „magis exacerbari,“ *Mercurial.*

IX. *Melancholicos.* Qui sine febre desipiunt. *v. aph.* 20. III. *Plenius inferiores.* Id est, teste *Gal.* sæpius, & vehementius purgandi sunt per inferiora, sed ii dumtaxat, qui purgatione egent, quique eam ferunt. Adustra enim melancholicorum corpora aut non purganda, aut sic, ut frequens, & mitior evacuatio suppleat vicem minus frequentis, sed validioris. *v. Ballon. consil.* *Eadem ratione.* Adhibita cautione, ut humorem peccantem evacues, qua parte reperit: idque remediis humori

ex-

X. *Purgandum* in valde acutis, si materia turget, eadem die; tardare enim in talibus malum est.

XI. Quibus tormina, & circa umbilicum *cruciatu*, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque aliter solvitur, in *siccum hydrops* firmatur.

XII. Quorum alvi *lienteria* laborant, hiberno tempore supra purgare, malum.

XIII.

expellendo aptis, tempore insuper opportuno, regione, aeris tempestate, corporis habitu, ætate, consuetudine non ad-
versantibus.

X. *Valde acutis*. Qui quarta, aut septima die finiuntur *vid. I. aph. 7. Si materia turget. v. aph. 22. I. & 29. II.*

XI. *Tormina*. * *Strophoi*, * *intestinorum torsiones*, ut Celsus legit, tormina quippe apud ipsum dysenteriam, *aph. 11. III.* significant. *Siccum hydrops*. Hydrops tympanitis, quo venter multo flatu distenditur, percussusque tympani modo sonat.

Tria eorum, qui tympanitide, id est, sicco tenebantur hydrope, cadavera pridem secabam. Per vulnus peritonei intestina magno cum impetu exiliebant prætumida, acque pertusa continuo flaccecebant, flatuque distendebantur emissio. Sic quæ sensim multumque increbuit moles ingens ventris, horæ momento in cadaveribus evanescit. An & in vivis, ubi nulla spes vitæ superest, idem tentandum? cum eo tamen, ut flatum non affatim, sed sensim, temporeque interposito sinamus erumpere.

Firmatur. Intellige, plerumque. Igitur si cui intestina torquentur, maximeque circa umbilicum, dolorque una lumbos occupat, qui nec tempore, nec remediis solvitur; hydrops siccus timeri debet. „Cujus metum incutiunt cibi prope omnes „in flatu conversi, frequens ventriculi inflatio cum dolore „colico simili“ *Jacotius in coac.* Metus augetur, si nulla febris est, si dolor longo tempore perseverat, & quamvis ructando, flatumque emittendo levetur, tamen continenter affligit.

XII. *Lienteria v. aph. 22. III. Supra.* Id est, vomitu. Veruntamen si sitis, oris amarities, cibi fastidium, frequens ructus, ventriculi inflatio, morsusque sine febre fuerit, *IV. aph. 17. 18.* qui bile ventriculum noxiore quopiam alio humore scatere significat; vel hieme vomitus cieri potest, sed remediis mitioribus, quæ pravos succos eliciant, nec enervent ventriculum.

XIII. Ad elleborum, qui non facile supra purgantur, eorum corpora ante potionem pluri cibo, atque quiete humectanda sunt.

XIV. Quum biberit quis elleborum, ad *motionem* quidem *corporis* ducere magis *expedit*; ad *somnum* vero, atque quietem, minus. Indicat autem navigatio turbari motione corpus.

XV. Quum volueris magis ducere elleborum, move corpus; quum vero filtere, somnum facito, & non moveto.

XVI. Carnes sanas habentibus elleborus periculosus; facit enim colvulsionem.

XVII. Si quis febrem non habens abstineat à cibo,

cor-

XIII. *Elleborum.* Quum elleborus simpliciter sine addito scribitur, albus elleborus est intelligendus, qui vomitum vehementissimum ciet. *Qui non facile.* Id est, ægerrime vomunt.

Pluri cibo. Humido tamen, cujusmodi erat ptisana ad laxandas, atque emolliendas fibras. *Quiete.* Ut humidum molleque minus exhalet.

XIV. *Biberit.* Poto elleboro, motus magis, quam quies corporis, aut somnus confert ad promovendum vomitum, navigationis exemplo, quæ fere nauseam, & vomitionem parit.

XV. *Magis ducere.* Id est, incitare, acuere.

XVI. *Carnes sanas habentibus.* Ipse * *sârcas hygieas he-choufi*, * exposuerim, non sanas, sed *crassas carnes habentibus.* Propius enim ad sanitatem accedunt fortes quam infirmi; at tamen *de loc. in hom.* fortia medicamenta fortibus, debilia debilibus convenire, legimus. *Hipp.* præterea *aph. 6.* * *tous ischnous*, * *graciles*, elleboro, qui vomitum movet, ait, esse purgandos & *aph. 7.* * *mesoos eusarcous*, * *mediocriter crassos*, medicamentis alvum ducentibus. Porro dixit * *mesoos*, * *mediocriter*; nam qui sunt admodum crassi, ne per inferiora quidem sine periculo expurgantur; non enim nisi pauca evacuatio sequitur, utpote corpore distento, sed postquam homo * *ichnos bee*, * *gracilis factus sit*, tuto medicamentum datur. *De loc. in hom.*

XVII. *Non habens.* Adde; aut *habens exiguum.* Verisimile

le

cordis morsum , atque tenebricosam vertiginem patiatur , & oris amaritudinem sentiat ; purgatione indigere per superiora significat.

XVIII. Supra præcordia dolores , purgatione indigere per superiora significant ; quicumque vero inferiora molestant , per inferiora.

XIX. Qui medicamentis purgati non sitiunt , non quiescunt , prius quam sistant.

XX. Non febricitantibus si tormina acciderit , & genuum gravitas , & lumborum dolor , purgari inferius oportere significatur.

XXI. Dejectiones nigræ , qualis est sanguis niger , sponte venientes , sive cum febre , sive sine febre pessimæ ; & quanto colores magis pravi fuerint plures , eo
pe-

le namque est , Hippocratem de magna continuaque febre fuisse locutum , quam sæpe ventriculi inflammatio facit , remediis vomitum moventibus exasperari solita. *Abstineat.* Cibum aversetur. *Cordis morsum.* Oris ventriculi morsum. *Per superiora.* Nimirum vomitu : nisi quid eundem prohibeat. Ut natura ægrotantis , corporis habitus , ætas , tabes , aut ejus metus. *Vid. IV. aph. 8.*

XVIII. *Præcordia.* Diaphragma. *Dolores.* Molestiæ , fastidia , anxietates , morsus , æstus , aliaque ejusmodi , quæ quamvis ventriculum infestent , ægris videntur sæpe supra diaphragma vim suam exerere. *Per superiora.* Id est , dolores , aliaque hujusmodi mala tollenda sunt vomitum medicamentis facientibus , nisi febris prohibeat , aliaque obstant. *Vid. aph. præced.* *Molestant.* Uti molestiæ , quæ affici intestina solent ob flatum eadem distendentem , pravosque humores eadem ipsa irritantes , itemque genuum gravitas , lumborumque dolor , qui hominem sine febre , aut non multa infestet. *Per inferiora.* Id est , remediis alvum solventibus.

XIX. *Non quiescunt.* Id est , non desinunt expurgari.

XX. *Tormina.* Intestinatorum torsiones. *v. aph. II.*

XXI. *Nigræ.* Quæ picem liquatam referunt , linteaue rubro colore inficiunt. *Pessimæ.* Mementote doctrinæ Hippocraticæ , quæ vult , dejectiones nigras , generatim acceptas , pessimas

pejus: cum medicamento vero, melius; & quanto colores plures, eo minus malum.

XXII. Morbis quibus libet incipientibus, si atra bilis vel supra, vel infra exierit, lethale.

XXIII.

simas esse, quin imo lethales incipientibus morbis, *aph. seq.* Sed salutare eas prædicat, si bene exeant, id est, consistente morbo, ampliusque eodem inclinante, prægressis signis concoctionis, validisque viribus, ac pulsibus. *Et quanto.* Non comparat Hipp. dejectiones nigras cum variegatis, sed inter simplices vult, pessimas esse nigras: inter variegatas vero, eas, quæ plures habent colores pravy: pravus enim est color intense flavus, viridis, ærugineus, niger. *Cum medicamento.* Sensus est, minus malum esse vi medicamenti nigra, & variegata dejici, quam vi morbi.

XXII. *Incipientibus.* In principio morborum lethalem esse atræ bilis exitum, sive supra, sive infra, nimirum sive vomitu, sive dejectione excludatur, uno fere ore affirmant Interpretes: non item in incremento, aut statu eorundem. *Oribasius* contra sic legit *Hippocratem*: „Quicumque in initio, vel „augmento morborum acutorum, aliorumve melancholiam „id est nigram bilem „evomuerint, eodem die moriuntur; si „vero in statu, vel declinatione quicquam tale emiserint, „postridie moriuntur.“ At vero non modo non moriuntur omnes eadem die, aut postridie, sed nonnulli etiam servantur. Quippe ex lib. de atra bile scimus, in quadam pestilentia excretam fuisse atram bilem tum iis, qui servabantur, tum iis, qui interibant. *Atra bilis.* Interpretes plures bilem distinguunt atram à succo melancholico, sanguini nigro simili sic, ut de hoc superiori *aph.* de ea vero hic loquatur *Hippocrates.* Censent porro, utrumque succum nigrum esse crassumque, utrumque minime grumosum, sed fusum, liquatumque atque à sanguine naturali diversum; atram vero bilem acerrimam agnoscunt, erodentem, acidam, quæ in terram effusa ebullit, eamque fermenti, & aceti modo attollit; quamque apud nos dari posse erodentem, exquisitamque negat *Hollerius.* At enim videtur *Hippocrates* bilem designare atram per id, quod est nigro simile sanguini ita, ut ejusdem dejectio, generatim loquendo, sit pessima, *aph. 21.* lethalis vero sive evomatur hu-

XXIII. Quibuscumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, sive quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, sive uti sanguis niger, desubter exierit, postmodum moriuntur.

F

XXIV.

humor, sive deiciatur, niger tam in principio morborum, quam in corporibus longis, acutisque morbis extenuatis, debilitatissime. Et hercule non tam humoris pravitate color ejusdem indicat plus minusve niger ac splendens, crassiorque ejusdem aut tenuior substantia, quam oris squallor pallorque, & frigidus sudor, & animi defectio, & virium, pulsumque defectio, & fastidia, & dolor viscerum ardorque, & anxietas, & corporis agitatio, & similia, quæ nigrum fuscumque succum sive supra, sive infra, sive ut fere evenit, utraque parte erumpentem solent comitari. Si enim sine his, aterrimus licet, acerbique, humor effluat, uti interdum accidit, non est quod de atra timeas bile. *Lethale.* Rarissime bilis atra effunditur in principiis morborum præsertim acutorum. *Ipsæ sexto pleuritidis die infra erupisse vidi morte celeriter, eademque die insequente. In statu febrium acutarum bis terque exiisse observavi cum tolerantia, subindeque etiam conferentia ægrotantium. Juvenem 20. annorum dysenteria cum acuta febre laborantem extinctum 18. morbi die fuisse memini post defectionem perquam abundantem bilis atræ. Erat porro bilis atra singulis bis in casibus similis nigro sanguini, vel potius liquatæ pici. Sæpe erumpit hæc eadem in hypochondriacis, melancholicis, hystericeisque morbis tum ineuntibus, tum progressis, caloreque linthea inficit sæpius rubro, nonnumquam flavo, interdum quoque simul utroque, invehitque accidentia quæ supra proposui. Cujus quidem eruptione humoris nonnullos periisse novi revertente intra paucos dies bis terque nigri humoris exitu, nonnullos etiam sic fuisse servatos, ut pristinae sanitati habituique fuerint restituti; plures vero recrudescuntibus post aliquod annos nigris evacuationibus occubuisse.*

XXIII. *Acutis.* In acutis febribus, acutisque morbis non est semper expectanda corporis extenuatio. Sufficit maxima virium debilitas ad aphorismi veritatem. *Diuturnis.* Per morbos longos emarcescit quidem extenuaturque homo, sed non semper similiter infirmatur. Debet igitur æger, *Celso auctore*, extenua-

nuatus esse & confectus, id est, perquam infirmatus. *Sive quovis alio modo.* Quemadmodum tabe, phthisi, asthma, ictero, tumore, scirrhus, internis aut externis abcessibus, sicco aut aquoso hydropo, articulorum morbis, aliisque similibus.

Nigra bilis, sive veluti sanguis niger. De hoc humore vide notam præcedentis aphorismi. Desuper exierit. Id est ex alvo. *Celsus, Hollerius, aliique*, accedente usu etiam de vomitu atræ bilis veram esse sententiam, pronunciant; *Mercurialis* multo magis vomitum, quam dejectionem formidat. *Postridie moriuntur.* Si ad extremam extenuationem venerint, *Galenus* aut ad modicam cum summa tamen imbecillitate, uti in acutis aliquando cernimus; & niger humor ubertim vomitu, aut alvo, aut utroque modo feratur, aut sæpius erumpat, aut continenter exiat. Nam unicam dejectionem, vomitumve, modicum tamen, mortem protraxisse plus semel vidi, maturasse eam quoque dejectionem perquam abundantem in nonnullis observavi sic, ut eadem raperentur die. In acutis porro morbis, qui præsagentem solent fallere, si imbecillitatem definire non audes, quæ nigra deicienti mortem inferre queat, ad pulsum attendito; qui quidem reperietur primum undosus, post vermicans, cui succedit fornicans, ac statim mors. *Holler. ex Orib.* Quippe pulsus, dum humor niger profunditur, exilis sit atque imbecillus, imo fere prorsus concidit cum animi defectione, & sudore frigido. Is subinde si non iterum erigitur, si non expanditur, si urget, ut sæpe renovatur evacuationis impetus, ex quo magis magisque decolor infirmetur æger cum facie tristi, pestiferisque aliis signis I. præfag. libro traditis, scito, mortem esse proximam: Sin pulsus post humoris exitum nigri iterum attollitur expanditurque, & in horas validior deprehenditur singulas, & redit color, & nonnihil alacrior est æger, & pulsus ei quietus est, meliusque se ad ea quæ offeruntur habet, spes erit, fore ut etiam convalescat.

XXIV. *Dysenteria.* Quid sit, vid. II. aph. III. Ab atra bile inceperit. Dubium est, utrum *Hippoc.* lethalem dixerit dysenteriam ab atra bile erumpente ortam, an ab eadem ipsa intus latente. Primum, rarissimus casus est, nec equidem unquam vidi. Secus alter, inciditque cum humores acerrimi, effrenes, atque erodentes, cujusmodi bilis est atra, dysenteriam

XXV. Sanguis quidem supra, qualiscunque fuerit, malus; infra autem, *niger si dejiciatur*, bonus est.

XXVI.

riam induxerint. Mos enim erat antiquis, contumaces plures lethalesque morbos ab atra bile, licet non exeunte, repetere; in quorum numero quartana interdum febris reponebatur, pulmonum varix, morbus epilepticus, apoplexia, nervorum distentiones, delirium, & uteri quidam, renum, lienis, & hepatis morbi. At si dysenteriam bilis atra subsequatur, mortem ne inferet, an non? *Oribasius* aliquando, respondet, non semper. Ipse id semel tantum, tumq. exitiosum vidi, *not. aph. 22.* Morientur, qui dysenteria emarcuere, infirmatique sunt maxime; ceteri poterunt sanari. *Vid. aph. præced.*

XXV. *Supra.* Qui ex ore redditur. Eo autem fluit è faucibus, è capite, è ventriculo, è summitate asperæ arteriæ, è pulmone, è thorace. E faucibus leni sreatu, lenique tussi fertur multus ac niger aut muco mistus cum palati titillatione, sæpeque simul è naribus exstillat sincerus, aut mistus. E ventriculo vomitu elicitur. E summitate asperæ arteriæ exiguus, raroque spumans tussicula pellitur. E pulmone valida tussi, fortive sreatu ejicitur vividus spumosusque. E thorace eodem modo excernitur, sed subniger, crassus, minus spumans, minusque abundans. *Malus.* Tum quia levare per ea loca natura non solet, nisi rarissime (ut quum dolor capitis rejecto ex ore sanguine tollitur, *10. aph. VI.* menstruorumque suppressorum damna vitantur) sæpe vero per hæmorrhoides, per uterum, per nares tum quia sanguis supra veniens sæpe è pulmonum vasis permanat erosio disrumpisque, interdum hominem brevi jugulans, si affatim erumpat, sin parce sensimque, ut solet, lenta sæpe tabe consumens. *Infra autem.* Hanc *aph.* partem alii aliter legunt. *Oribas.* & *Philoth.* lectio est. *Infra autem bonus.* Galenus habet. *Infra, bonum, nigra subeuntia.* Antiquissimus codex, quem *Vallesius* tuetur, talis est. *Infra bonum; & nigra subeuntia, malum.* Quam lectionem *Mercuriales*, & *Foesius* retinent in textu græco, dissident in latina versione *Galenus* addisti. *Lindenius* Galenicus est in utroque codice. *Bonus est.* *Orib.* & *Philoth.* ajunt, bonum esse sanguinem ex hæmorrhoidibus fluere. *Galenus* addit: *si niger fuerit.* Rursum *Galenus* scribit: melius esse nigra dejici, quam sanguinem ex ore reddi, dummodo
ni-

XXVI. A dysenteria habito si veluti carunculæ exeant, lethale est.

XXVII. Quibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacumque ex parte fluxerit, quum reficiuntur, alvi his humectantur.

XXVIII. Quibus biliosæ sunt dejectiones, iis superve-

nigra sensim ferantur, sanguisque sui exitus tarditate denigretur. Dicemus igitur primo, bonum esse si sanguis ex hæmorrhoidibus profluat; nam sic & nimix abundantix consulitur, & humorum corrigitur pravitas. Ad hæc plures morbi tali fluxu pelluntur, plures arcentur Hipp. auctore. Deinde non esse necesse sanguinem fluere nigrum. Est enim sanguis hæmorrhoidalis, quemadmodum mulierum menses, reliquo, qui in vasis est, sanguini similis. Demum melius, sive, ut pressius loquar, minus malum esse, sanguinem dejici ex intestinorum vasis elicited, quam ex ore profundi. Si dejectio sit sanguinis nigri, lucidi, fusi picis ad instar liquidæ, pessima est juxta aph. 21. Nec obstat repetitio quam Mercur. objicit: nam hæc in aphorismis frequenter occurrit; sin fuerit grumosi sanguinis, utilis esse potest viribus validis, signisque coctionis prægressis. Coac. quippe legimus, quibus dolores hypochondrii, oris ventriculi, hepatis, & partium circa umbilicum, excreto per alvum sanguine servantur, non excreto, pereunt.

XXVI. Dysenteria v. aph. 11. III. Habito. Id est, diu & tenaciter occupato. Caruncule. Sive corpuscula sphærica carnei coloris, seu globosa fuerint, sive etiam membranæ, & filamenta. Lethale. Ingens quippe vulnus intestinorum significant. Ad sententiæ veritatem necesse est, ut caruncularum excretio perseveret, & confertim fiat. Sæpe sine metu corpora carunculis & membranis similia redduntur, eaque suppeditat crustosa, seu gelatinosas pars sanguinis effusi, coactique in cavitate intestinorum dysenteria laborantium.

XXVII. Febribus. Sive ineunte morbo, sive in ipsa crisi, sive convalescentiæ tempore. Quacumque ex parte. Naribus sæpissime, alvo, utero. Reficiuntur. A cibo assumpto cruda, & indigesta alvo demittunt.

XXVIII. Quibus. Adde: assidue febrientibus, nimirum acute. Superveniente. Post evacuationem surditatem ortam

veniente surditate cessant ; & quibus *est* surditas , super-
venientibus biliosis dejectionibus , cessant.

XXIX. Quibus in febribus sexto die rigores fiunt,
difficile iudicium sequitur.

XXX. Quibuscumque accessiones fiunt , quacumque
hora febris dimiserit , si eadem cras occupaverit , iudi-
cium habent difficile.

XXXI. Lassitudinem habentibus in febribus in arti-
culos , & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

XXXII. Quibuscumque *convalescentibus* ex morbis
pars aliqua laboraverit , hic fiunt abscessus.

XXXIII.

in acuta febre , plerumque lethalem , modo non ex humorum
copia fiat , *Alpinus* notat. *Cessat*. Non significat integram so-
lutionem necessario , sed diminutionem , aut proclivitatem ad
perfectam solutionem. *Mercurialis. vid. aph. 60. IV.*

XXIX. *Rigores*. Rigor est vehemens frigus cum totius cor-
poris concussione. *Difficile*. Crisis scilicet difficilis , quæ vel
mortem , vel morbi recidivam , vel difficilem solutionem in-
ducit.

XXX. *Accessiones*. Paroxysmi febrium. *v. aph. 11. I.* Hi si
eadem semper hora repetant , quacumque licet hora dimittant:
aut si paribus semper horis , eademque proportionem anticipent,
aut tardent , difficilem solutionem significant. *Vallesius.*

XXXI. *Lassitudinem*. Id est , musculorum sensum quandam
tristem , præsertim in corundem motu. *Febribus*. Frequentius
tamen in iis , quæ ex acutis decidunt , nimirum quæ superant
vigessimum diem. In his enim si juncturæ , locaque circa maxil-
las doluerint , aut gravitate tensioneque laboraverint , in ipsis
juncturis locisque abscessus ut plurimum fient. In reliquis vero
febribus mitioribus , longioribusque , si dolor infernas magis
partes occupet , quam supernas , in illis potissimum fient abs-
cessus , præsertim , III. prænot. 66. si circa hypochondria ardor
aliquis sentiatur. *Abscessus*. Externarum partium tumores ex
humorum defluxu à partibus nobilibus ad ignobiliores , ut ab
hepate in inguina , aut crura qui sæpe suppurant.

XXXII. *Laboraverit*. Non quibus laboraverit pars aliqua
cum convalescant , sed cum convalescunt , fiunt in ea parte
abscessus , *aph. 31.* qua laboraverunt per morbos. *Vallesius.*

XXXIII. Sed & si ante morbum aliqua parte *doluerint*, hic morbus firmatur.

XXXIV. Si à febre habito, tumore non existente in faucibus strangulatio repente supervenerit, lethale.

XXXV. Si à febre detento collum pervertitur, & vix potest devorare, sine ullo tumore, lethale est.

XXXVI. Sudores febricitanti si incœperint, boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & quartodecimo, & septimodecimo, & vigesimo, & vigesimo septimo, & trigesimo quarto; hi enim sudores judicant morbos. Qui vero non ita fiunt, laborem significant, *aut morbi longitudinem, aut recidivam.*

XXXVII.

XXXIII. *Firmatur.* Id est, excitatur abscessus, nisi tamen multa crassa urina effluerit; aut sanguinis profluvium è naribus, vel quavis alia parte, aut multus sudor, aut dejectio sequatur. *Jacotius in coac.*

XXXIV. *A febre habito.* Acute febricitanti. *Faucibus.* Id est, in præjacente spatio inter œsophagum, & asperam arteriam, quod aperto ore, & depressa lingua apparet. *Strangulatio.* Sic, ut spiritus difficillime trahatur, idque potius ob muscutorum laringis convulsionem, quam ob eorundem inflammationem. In coac. legitur: *in præcipitibus morbis strangulatio sine faucium tumore perniciem minatur.*

XXXV. *Si à febre.* Multo rarior casus est, ubi collum per acutas febres convulsis musculis, aut inflammato œsophago, ante, aut retro, aut in latus distorquetur alterutrum. *Non semel ipse vidi acutis in febribus admodum impeditam difficilemque deglutationem, sine spirandi difficultate, sine faucium, collicæ tumore aut rubore, brevi mortem intulisse. Idque muscutorum œsophagi convulsioni adscribebam. In aliis enim horum vox clangosa præerat, in aliis maxillæ quodammodo confertæ, in aliis manuum, artuumve inferiorum saltus, tremoresque.*

XXXVI. *Tertio die.* Hic nominat dies intermedios, indices, & proprie criticos, aph. 24. II. Quartum silet diem, qui primus est indicum, sive contemplabilem, quia acuti, & perquam acuti per dies impares fere moventur, 3. 5. 7. 9. &c.

Judicant. Solvunt. Laborem. Hic loci *poonon, *expofue-
rim,

XXXVII. Frigidi sudores cum acuta quidem febre mortem; cum mitiori autem longitudinem morbi significat.

XXXVIII. Qua parte corporis sudor est, ibi significat morbum.

XXXIX. Et qua parte corporis calor, aut frigus, ibi morbus.

XL. Et ubi in toto corpore mutationes *accidunt*, ut si corpus refrigeretur, & rursus calefiat, vel color alter ex altero fiat, longitudinem morbi significat.

XLI.

rim, *vite discrimen*. Aut. Sic quoque disjunctive * *chai*, * non copulative &, mihi videtur hoc loco legendum, & sequenti.

XXXVII. *Frigidi sudores*. Sive toto corpore fiant, sive tantum parte, mali sunt. Pessimi, qui caput dumtaxat, aut faciem, aut collum, aut pectus occupant, tenues, modo ne sudorum frigiditas à loco, aut ab aere proficiscatur frigidis, *Cardan. Mortem*. Si acuta febris plurimum urgeat, si frigidi sudores perseverent, & si hos, aliquod ex perniciosis, lethaliusque signis consequatur “ *Alpinus, de præf. Cum mitiori autem*. Adde, & *validis viribus*. Nam si debiles sint, etiam mortem significare valent. *Valles*. Frigidi sudores febrium intermittentium, licet maximarum, vix hodie timentur post detectum corticem Peruvianum, una cum febribus sudores ipsos pellentem.

XXXVIII. *Qua parte corporis*. Ejus intellige, qui febre tenetur, ex *Gorter*. *Ibi significat morbum*. Id est, intus in corpore ut plurimum indicat vitium subesse: puta obstrictionem, tumorem, inflammationem, erysipelas, abscessum, syderationem, & similia. Erit ne igitur semper malus partis sudor? Minime, scribente *Ballon. in consil.* sed cave ne, te maior fallat, opinionem faciens veri sudoris.

XXXIX. *Calor*. Ut si dexterum hypochondrium sinistro fuerit calidius: atque stabilia hæc si fuerint, neque à causa aliqua manifesta producta.

XL. *Mutationes*. Hæ fere in singulas horas fiunt, & mortem in acutis febribus, infirmisque viribus portendunt. *Color*. Præcipue oris: hinc rubores fugaces genarum, qui neque propter

XLI. Sudor multus ex somno factus absque causa manifesta, corpus uti pluri cibo, significat: si vero cibum non accipienti hoc accadat, scire oportet quod evacuatione indiget.

XLII. Sudor multus calidus, vel frigidus, *semper* fluens, frigidus *majorem*, calidus *minorem* significat morbum.

XLIII. Febres quæcumque, non intermittentes, tertia die fortiores fiunt, magis periculosa. Quocumque autem modo intermiserint, periculum abesse significatur.

XLIV.

ter odores, ut in hystericis mulieribus, neque ob animi motus, fiant.

XLI. *Ex somno.* Capto somno sudor multus, & continenter ortus, sine externa causa. *Non accipienti.* Intelligi potest de non assumenti cibum, sed rectius de fastidienti.

XLII. *Semper fluens.* Toto corpore, vel parte, sine levamine, sine dierum delectu, seu morbi fluat initio, seu ejusdem incremento, aut vigore. *Frigidus majorem.* A multo sudore calido, brevior morbus esse solet, minusque periculosus: contra à multo sudore frigido morbus longior, & magis periculosus. *Holler.*

XLIII. *Febres quæcumque non intermittentes.* Per hæc verba febres intelligit continuas, ardentisque, *Philoth.* quæ tertio quoque febris die ingravescent. *Magis periculosa.* Periculosiores sunt iis, quæ continuæ, ardentisque cum sint, per tertium tamen quemque diem non exacerbantur. *Intermiserint.* Si hæ febres in intermittentes mutantur quoquo modo, id est, in eas, quæ aut singulis diebus, aut alternis, aut quarto quoque die desinunt ex toto, antequam revertantur, sive febris vacuitas sit plurium, vel pauciorum horarum, tum, nisi semper, plerumque tamen periculo vacant. Quamquam autem febres quæcumque, quæ intermittentes nominantur, fere periculo careant, senes tamen, & incurabilibus morbis implicitos juvenes, longisque extenuatos, interdum occidunt; quin & fortes rapiunt, si fuerint perniciose. Fere vero sub harum æstu tenues & imbecilli sunt pulsus, nec æger extrinsecus recalescit, sed decolor & facie tristis, sudoreque frigido peresus
præ-

XLIV. Quibus febres longæ, is tubercula, vel labores in articulis fiunt.

XLV. Quibus tubercula, vel in articulis labores fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

XLVI. Si rigor incidat, febre non deficiente, ægro jam debili, lethale est.

G

XLVII.

præcordiorum anxietate, doloreve torquetur membra continenter jactans, positumque mutans corporis. Sed & quæ soporem stuporemque inducunt febres sunt quam maxime pertimescendæ, quippequæ nisi extemplo china china occurratur, hominem tertio, quartove accessione impetu apoplexia tollere consueverunt. Mitto quæ in continuam, acutamque transeunt, potissimum autumnales, quæque compositæ facile desinunt in hecticam, phthisim, scirrhum, œdemata, hydropem, atque alia id genus. De intermittentium periculo, *vid. 1. aph. lib. I. cuac. & 4. lib. IV. comm. Holler.*

XLIV. *Longæ.* Febres præsertim acutæ, quæ ultra 20. aut 40. dies solent protrahi. * *Phymata.* * *Tubercula.* Hic loci tumores videntur indicari, orti ex decubitu in articulos humoris, qui morbum faciebat. *Labores.* Id est, dolores, gravitates, molestiæ, vel quælibet alia noxa. *Fiunt.* Nisi humoris ad articulos decubitus urinæ impediunt crassæ, multæ, albæ, aut sanguinis profluvium è naribus, *aph. 74. IV.* aut soluta alvus, aut sudor.

XLV. *Hi pluribus.* Si, febre perfecte soluta, aut extenuata jam optime, elapsoque tempore quo fieri solent abscessus, *aph. 31. IV.* multo plus, quam oportet, quis edat, huic abscessus, vel labores fiunt.

XLVI. *Rigor.* Est vehemens frigus cum quodam corporis concussu, à quo sæpe tertianæ, quartanæ febres solent incipere, ac reverti. Si igitur in febre continua sæpius rigor incidat, nec febrim solvat; & vires morbi diuturnitate, aut vehementia, aut utraque exhaustæ fractæquæ sint, brevi post æger moritur. An in ipso rigore, vel post morietur? Verendum est, me in rigore deficiat, scribit *Hollerius*. Quoties, ut occidat, debet rigor incidere? Id quoque incertum est. *Ægrorum ipse trimum memini, qui febre ultra quadragesimam diem protracta, aliisque una morbis extenuati & confecti è vita discesserunt, dum*
fe-

XLVII. Excreationes in febribus non intermittentibus lividæ, cruentæ, fœtidæ, & biliosæ, omnes malæ: & si bene exeunt, bonæ. *Sed eadem quoque est eorum, quæ per alvum, & urinas excernuntur, ratio. Si quid vero, quod non juvet, per hæc loca excernatur, malum.*

XLVIII. In febribus non intermittentibus, si exterioribus frigidis, interiores partes urantur, & sitim habeat, lethale est.

XLIX. In febre non intermittente, si labrum, vel oculus, vel nasus, vel supercilium pervertatur, vel non videat, vel non audiat, jam debili existente corpore, quidquid horum evenierit, mors proxima est.

L.

febris sine rigore remittebatur. Tribus quatuorve ante mortem diebus his eos occupabat rigor, dum febris incrudescerebat, sed tantummodo semel die. In declinatione vero nonnihil sudabant rigoris die.

XLVII. *Excretiones.* Sputa sunt, quæ tussi, aut quoquo alio nisu expectorantur acutis in febribus, maximeque in pleuritide, & peripneumonia. Hæc si livida fuerint, ulso *caffæ* similia, aut ex toto sanguinea, id est, nullo humore flavo aut pituitoso perfusa, itemque fœtida, aut intense flava, mala sunt. His adde viscida, spumosa, rotunda, alba seu cruda, viridia, nigra. *Si bene exereunt.* Id est, si facile, celeriter, & levi tussi exeant, doloremque, & febrim, & spirandi difficultatem minuant.

XLVIII. *Non intermittentibus.* Id est, continuis, ardentibusque. *Lethale.* Præsertim si eo in casu adsit linguæ siccitas, scabrities, jactatio corporis, hypochondrii tensio.

XLIX. *Non intermittente.* Intellige continuam, acutamque. *Pervertatur.* Id est, distorqueatur. Si partium distorsiones conjungantur cum surditate, aut cæcitate stabili, aut summa virium jactura, aut sudore, & respiratione frigidis, mors imminet. *Non videat.* In acutis morbis, integrisque sensibus sæpe prius visum prope mortem observavi, quam auditum periisse. *Jam debili.* Nam firmis viribus, signisque aliis salutaribus concurrentibus, & prægressis concoctionum indici in
uri-

L. Ubi in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium acciderit, lethale.

LI. In febribus abscessus, qui ad primas judicationes non *solvantur*, longitudinem morbi significant.

LII. Quicumque in febribus, vel in aliis morbis sponte illacrimant, nihil absurdum; qui vero non sponte, absurdus.

LIII. Quibus circa dentes in febribus quidam lentiores nascuntur, his fortes fiunt febres.

LIV.

urinæ alvique excrementis, possunt esse accidentia critica perturbationis, *aph. 13. I.* uti os distortum Metoni, *epid.* Sic labrum contractum alvi biliosæ eruptionem significat, *coac.* Sic oculorum distortio, aut cæcitas febrim ardentem solvit. *Judicat.*

L. *Non intermittente.* Scilicet acuta. Excipe tamen febrem ex pleuritide, aut peripneumonia ortam, in qua difficultas est respirandi ob pleuræ, pulmonumve inflammationem, cui tamen superveniens delirium, nisi malum non dicitur, *aph. 12. VII.* *Difficultas spirandi.* Sive frequens, & exigua, sive magna & rara, sive sublimis, ubi thorax attollitur multum & scapulæ, sive ex abdomine coacta, in qua venter admodum elevatur in hauriendo aere. *Lethale.* Dummodo delirium, & spirandi difficultas cum acuta febre perseveraverint.

LI. *Abscessus v.* *aph. 31.* Si abscessus non solvantur primis evacuationibus, quæ fiunt diebus primis criticis, ut 7. 14. vel rectius, si abscessus non solvunt febrim die 27. 34. 40. morbum fore longum prædicito.

LII. *Sponte.* Uti quum prædolore, tussi, risu, mæstitia, cogitatione, aliove animi motu fluunt lacrimæ. *Nihil absurdum.* Nihil est mali. *Absurdus.* Malum est, modo ne oculus ægrotet ipse. Sine voluntate lacrimare, mali morbi testimonium est. *Celsus.* Involuntariæ lacrimæ in acutis, ardentibusque febribus, si sine signis lethalibus apparuerint, profluvium sanguinis de naribus; cum lethalibus signis, mortem significant. *I. epid.*

LIII. *In febribus.* Potissimum continuis. *Lentores.* Id est, visceri, glutinosique humores, qui dentibus assidue inhæreant.

Fortes. Vehementioris, acerbioris, longiorisve febris indicia sunt lentores hujusmodi, si nullis concoctionis signis exist-

LIV. Quibus plurimum siccae tussis leviter irritantes in febribus ardentibus fiunt, non multum siti infestantur.

LV. Ex bubonibus febres omnes malae, praeter ephemerās.

LVI. Febricitanti sudor superveniens, febre non deficiente, malum: prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

LVII.

stentibus, nullaque spe intermissionis, dentes continenter obdident. „Periculosissimum quoque est, *Holler.* si dentium intervalla nigrescere videantur. Significatur enim magna adusio materiae, & plerumque mors.“

LIV. *Plurimum.* Ex longioribus intervallis exponit *Holler.* ut intelligantur siccae tussis raro, & leviter irritantes, in quibus nihil expuitur, aut quid tenue *vid. Martian. 6. epid.*

LV. *Bubonibus.* Tumores sunt inflammatorii glandularum inguinalium, tum etiam axillarium, & jugularium. Aliquando autem una bubones erumpunt cum febre, aliquando non nisi post 3. 4. aut 5. febris diem. „Ac ubi cum bubone, vel ex bubone febris nascitur putrida, maligna est, sive sit pestilens, sive non. Verum in febrium crisis plerumque nascitur bubo sine periculo. Sic & in virginibus instante tempore purificationis menstruae. Sed terreri non decet, quando cum huiusmodi bubonibus non sunt vomitiones, deliria, urinae pravae, languidus pulsus, carbunculus, & caetera symptomata febris pestilentis. Alias si haec adsint, pestilens est bubo, & periculosus“ *Holler.* *Ephemerās.* Febres 24. horarum: interdum ad duos tresve dies extenduntur, sine anfractibus tamen, *notante Cardano,* & reciprocationibus.

LVI. *Superveniens.* Non semel, aut iterum, sed si saepius erumpat, nec subinde febrem tollat, aut imminuat. *Malum.* Nam vel mortem, vel longitudinem morbi significant: illam quidem, si in acuta febre post vehementem sudorum crisis superveniant signa prava, qualia sunt delirium, convulsio, perfrigeratio totius corporis, & similia; hanc, quoties cum medicri naturae certamine, saepius sudor recurrit, manente febre, sine graviorum signorum accessione. *Jacot. in coac.*

LVII. Qui à *distentione*, aut *rigore nervorum* tenetur, febre superveniente liberatur.

LVIII. A febre ardente *detento*, rigore superveniente, solutio.

LIX.

LVII. *Distensione*. Qua modo totum corpus, modo pars sine voluntatis arbitrio trahitur aut contenditur, aut concutitur.

Rigore. In hoc affectu recta cervix, aut totum corpus riget, quoniam æqualiter partes ante & retro tenduntur. *Superveniente v. aph. 26. II. Liberatur*. „Convulsionis remedium est „acuta febris superveniens, quæ prius non fuit; aut, si qui- „dem prius extitit, jam invalescens“ *coac. lib. 4. n. 33*. Duo tamen notanda sunt: primum eam feбри convulsionem solutum iri, quam crudi humores viscidique gignunt; alterum, levio- rem febrim nihil conferre posse iisdem humoribus attenuandis discutiendisque; majorem vero, quam vires sustineant, esse periculofam, *Holler. coac.* Febrim laudat *Jacotius ibid.* quæ cum rigore accedit. Rigorem caloremque quartanæ *Alpinus* desiderat.

LVIII. *Ardente*. Hunc mihi casum rarissime contigit vidisse. Quod autem Hipp. soli causo, seu ardenti tribuit feбри, plures ad continuam acutamque etiam febrim extendunt. Ardentis porro febris signa sunt sitis clamosa, ingens æstus, anxietas, seu jactatio corporis, & spirandi difficultas. Alii addunt linguæ siccitatem atque scabritiem, calorem ad tactum urentem, durum frequentemque pulsum, capitis, cervicis, atque lumborum dolorem. *Rigore superveniente*. Si rigor, *aph. 29.* acutæ ardentive feбри superveniat die critico post concoctionis signa, & vigentibus viribus, rigoremque calor excipiat, huncque sequatur multus calidus & universalis sudor, aut copiosa dejectio, aut vomitus, aut sanguinis fluxus è naribus, febrim tollere, aut sic minuere consuevit, ut brevi post evanescat. *Solutio*. Nisi vires sint prælanguidæ, *aphor. 46.* nisi nulla, aut prava evacuatio consequatur, uti frigidus, aut superne tantum fluens sudor, aut stillæ sanguinis de naribus, aut sinceræ dejectiones, vomitusque, aut urinæ perspicuæ, nisi rigor cum signis malis appareat, cujusmodi sunt oculorum per- versio, supor, vigiliæ, convulsio, corporis perfrigeratio, ex- solutio cum dolore capitis, oblivio, delirium. Mali quoque
con-

LIX. Tertianæ exquisita septenis circuitibus, quod longissimum est, judicatur.

LX. Quibus in febribus aures obsurduerunt, sanguis ex naribus fluens, aut alvus turbata solvit morbum.

LXI. Febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidivare.

LXII.

continui ac frequentes sunt rigores febrem, febrisque accidentia non solventes, aut mitigantes; nec si periodici fuerint chinachinæ cedentes, quippe qui aut interni visceris inflammationem, aut solidorum dejectum statum arguunt.

LIX. *Exquisita*. Tertianarum aliæ sunt exquisitæ, aliæ nothæ, aliæ productæ: Exquisitæ febres sunt horarum 12. Nothæ 18. Productæ 24. aut 28. Exquisitæ porro æstate gignuntur in temperamentis regioneque calidis. Accedunt tertio quoque die cum rigore, mox fere vomitum vehementer movent aut alvum, inde sitim ingentemque æstum atque anxietatem; demum sudore finiuntur copioso, interdum etiam dejectione cum urinis plerumque crocei coloris. *Septenis circuitibus*. Id est, septem periodis, quorum singuli 12. horarum cum sint, tertio quoque die revertentes, horum septem dies comprehendunt quatuordecim. *Judicatur*. Id est, finitur ex tot. Desinit igitur febris hujusmodi quinque, *de carnibus*, septem, aut ad summum, *coac.* novem circuitibus, sibi si relinquatur febris, *Gorter.* nec ab ægro, *Mercurial.* nec à medico, nec ab adstantibus error committatur ullus: exquisitæque naturam febris fervet. *Idem.* „Nam tertiana anticipans prona est in continuum, postponens in quartanam, vel lentam. Brevis tertianæ signum sunt pustulæ, ulcuscula circa labia, nares, si mul lotium cum ardore redditum, post 3. 4. paroxysmum.“ *Apud Kleinium.*

LX. *Sanguis*. Dummodo multus profluat, & vires ferant, atque æger dormiat; secus vel delirium, vel convulsio sequitur.

Turbata. Fusa, soluta; in qua eadem observanda, quæ *aph.* 28. dicta sunt. Ceterum solvit etiam dysenteria accedens, aut genuum, *de judicat.* aliarumque ignobilium partium dolor ortus. *Alpin. de præfag.*

LXI. *Febricitantem*. Febre ardente, ac biliosa, quæ diebus imparibus moveri, & finiri solet; ut die 5. 7. 9. 11. & 14. quæ

LXII. Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum.

LXIII. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

LXIV.

14. dies, utut par sit, rationem tamen habet septenarii.

Recidivare. Adde: *ut plurimum.*

LXII. *In febribus.* Continuis, acutisque. *Morbus reg.* Icteria etiam dicitur, quæ bilis in corpus universum effunditur, cutis flavescit, cum dejectionibus cinereis, urinisque croceis. Hic agitur de ea, quam non hepatis obstructio movet, nec inflammatio, nec tumor, scirrhusve, sed bilis copia gignit atque impetus, inordinatique solidorum motus. *Malum.* Plurimumque *Holler.* Sæpius quoque, *Idem in coac.* lethale, aut unde vix ægri convalescunt. Et ratio est, quia perraro materia inutilis ante 7. coquitur diem. Quidquid autem sine coctionis signis apparet five evacuatio sit, five abscessus, five icterus, salutare esse nequit. Quia autem evadunt, orta ante 7. icteria, aut evadunt cocta materia quæ in morbis peracutis ante 7. coqui potest, aut non nisi ægerrime evadunt, ut ex *Epid. bist.* manifestum est; nec sine aliqua evacuatione, aut sanguinis de naribus cursu viribus integris subsequente. Neque semper est utilis icterus post 7. nisi si præcesserint coctionis signa in excrementis, nisi validus sit æger, & nisi crebrior vomitus aut dejectio sequatur, aut urinæ multæ fluant, aut sanguis prorumpat è naribus, aut ex hæmorrhoidibus, molli interim & sine dolore substante hypochondrio dextero; quibus subinde solvatur febris, aut admodum remittatur, leviusque æger habeat.

LXIII. *Quibus.* „ Quibuscumque in febribus intermitten-
 „ tibus, quotidianis, tertianis, quartanis rigores, *aph. 29.*
 „ aut horrores, aut frigora (rigoris enim nomine hæc tria hic
 „ intelliguntur) incidunt quotidie, febres quotidie discutunt,
 „ habentque sui paroxysmi vacuitatem “ *Liebaut. Solvuntur.*
 Excepta hæmitritea febre, quæ ex quotidiana continua, & tertiana intermittente componitur: „ quando quidem, *Holler.* ea
 „ habet quidem diebus alternis horrores, aut rigores, sed non
 „ solvitur, neque pervenit ad infebricitationem. “ *Novi præteritis annis febres quasdam, quæ licet singulis diebus statisque cum rigore horis accederent & remitterent, tamen non solve-*
 „ ban-

LXIV. Quibus in febribus morbus regius septimo, vel nono, vel undecimo, vel quartodecimo supervenerit, bonum, nisi dextrum *hypochondrium* obduruerit. Si vero non, non bonum.

LXV. In febribus circa ventriculum & fortis ætus, & cordis morfus, vel dolor, malum.

LXVI.

bantur. Urinæ fere tenues sanisque similes. Accidentia febrium non decredebant, sicut febres, quamquam & ipsa mitigarentur. Ægri paullo post rigorem insudabant, sudorque trahebatur usque ad rigorem novæ periodi. Hinc alacriores neque per id temporis deprehendebantur. China China non modo quidquam non prodesse, sed febres exasperasse videbatur. Donec aliæ biliosa alvo, erumpentibusque in cuti peticulis tollebantur. Aliæ in lethalem seu capitis, seu pectoris, seu viscerum imi ventris inflammationem definebant.

LXIV. *Morbus regius. Vid. aph. 62. Bonum.* Si viribus integris sequatur insignis evacuatio, quæ febrem minuat. *Nisi dexterum.* Id est, bonum plerumque est, dummodo dextrum *hypochondrium*, quæ hepatis regio est, molle, sine tensione, & sine dolore sit. *Si vero non.* Id est, si morbus regius non apparuerit ullo horum criticorum dierum, aut apparuerit cum duritie, tensione, doloreque dexteri *hypochondrii*, bonum non erit, seu ambigua res erit, ut in *coacis* scribitur. Nam, si inflammatio est in jecinore quamvis in decretoriis, „ seu *criticis* diebus superveniat morbus regius, malum est, „ quoniam jecur est affectum“ *Philotheus.*

LXV. *In febribus.* Acutis videlicet: de his enim fere semper Hipp. intelligit, *Holler. Cordis. Rectius, oris ventriculi.*

Vellicatio igitur & lancinatio quæ hoc in loco persistat, quæque nec vomitu, nec alvo cita tollatur, cum æstu, ardoreque incidens, periculosa res est. At longe periculosior, si anxium reddit ægrum; id tum accidit cum „ in varias figuras decubitus is transformatur, nec ullo consistit loco, sed varie se „ jactat, movet, rapit, modo se se attollens, modo se se de- „ turbans, modo in latus alterum, modo in ventrem & dor- „ sum se se provolvens, nec ullum locum, vel ullam figuram, „ ullam formam decubitus nanciscens, ubi acquiescat.“ *Idem in coac.* Quod si una quoque partes extremæ frigescant, cum exili celerique pulsu, & respiratione difficili, nihil amplius spei superest.

LXVI. In acutis febribus convulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.

LXVII. In febribus *per somnum* timores, vel convulsiones, malum.

LXVIII. In febribus spiritus offendens malum; convulsionem enim significat.

H

LXIX.

LXVI. *Convulsiones.* Vid. *aph.* 57. *hujus sect.* 26. II. Circa viscera *Holler.* intelligit omnia interanea, ut pulmonem, cor, ventriculum, intestina, lienem, hepar. *Malum.* Malum quidem est, acute febrientem convulsionibus corripere, præsertim protracto morbo (nam ineuntem interdum solvunt, *coac.* 5.) sed longe pessimum, si febre ardente, *aph.* 58. torreatur, *Galen.* Mortem vero haud hæsitante prædicito, si convulsiones in acutis febribus oriantur post sudores, vomitus, dejectiones, hæmorrhagiasque morbum non levantes; itemque si plures eis aliæ male notæ præcedant, aut comitentur, aut subsequantur, cujusmodi sunt viscerum dolores ingentes, assiduæ vigiliæ, deliria, anxietates, extremorum perfrigerationes, frigidi sudores, spirandi difficultates, pulsuum depravationes, vocisque, & similia. Quæ vero phrenitidi succedunt convulsiones, quæque tremorem in acuta febre subsequuntur, & quæ fractis dissipatisque viribus excitantur, mortem præ foribus esse prænunciant sic, ut æger tertium, quartum, aut quintum diem evadere nequeat. Sic de doloribus circa viscera immanibus est judicandum, si cum ardente febre summa virium debilitas aliæque prava signa conjungantur.

LXVII. *Timores.* Repentinæ cum timore expergiscentiæ, si sæpius in acutis accidunt, plerumque in delirium desinunt, aut phrenitidem. *Malum.* Quin imo lethale, quemadmodum *aph.* 1. III. est enim somnus laborem faciens, qui, si præter consuetudinem in acutis febribus perseveret, fere necat.

LXVIII. *Spiritus offendens.* Respiratio intereisa, interrupta, duplicata, qualis gementium puerorum. *Malum.* Perniciosa res est hujusmodi respiratio in acutis febribus, lethalis vero, si cum virium languore incidit, *Alpinus.* Si respiratio, inquit *Holler.* cespitat, ut ita dicam, & offensat: si item, pulsus, malum est, & admodum lethale, quia convulsionem, indicat: “ *qua de vid. aph.* 66.

LXIX. Quibus urinæ sunt crassæ, grumosæ, paucæ, non sine febre, si *ab his tenues, & copiosæ reddantur*, juvant; præcipue vero tales veniunt, quibus ab initio, vel brevi *sedimentum* inest.

LXX. Quibus urinæ perturbatæ, quales sunt jumentorum, his dolor capitis vel adest, vel aderit.

LXXI. Quibus septima die *futura crisis est*; his nubeculam habet quarta die *urina subrubram*, & alia ex ratione.

LXXII.

LXIX. *Non sine febre.* Id est, cum lenta febre. *Tenues.* Id est, mediocriter crassæ. *Ab initio, vel brevi.* Scilicet 4. die, aut non ita multo post, ut septima.

LXX. *Quibus.* Adde, per febres, ex *Holler. aliisque* urinæ redduntur, seu minguntur perturbatæ, id est, crassæ, confusæ, turbidæ, quales jumenta reddunt sic, ut repositæ non subsideant, neque clarescant. *His dolor capitis.* Non est intelligendus Auctor quod solum capitis dolorem præsentem futurumve significant; quandoquidem & delirium, & alia solent significare, sed quod hunc fere semper prænuncient: quamquam pro, * *cephalaria*, * possumus etiam intelligere quemlibet capitis laborem. *v. Mercurial.* Rursum ad veritatem *aph.* necesse est, ut turbidæ aliquot diebus perseverent, neque sint criticæ, minimeque ante ipsas coctionis signa in iis apparuerint, *Idem.* vitiumque renum absit, aut vesicæ. Nec illud ignorandum, hujusmodi urinas in vehementi febre infirmisque viribus perseverantes fere convulsionem & mortem accersere; viribus vero validis, mitiorique febre, morbum trahere vel usque ad diem quadragesimum. *Novissime vidi hujusmodi urinas à muliere redditas utero gerente & febre non magna laborante. Dolor capitis acerbissimus ei erat. Sanescens visum fere amisit. Diu morbo consistebatur, & foetum quoque elisit egrotans.*

LXXI. *Crisis.* Solutio morbi hoc loco intelligenda ex *coacis* est. *Nubeculam.* Contentum illud, quod in suprema parte urinæ conspicitur, nubeculæ simile, interdum in media, interdum quoque in infirma. *v. presag. lib. 2. Et alia.* Id est, solvetur 7. morbus, si coctionis signa in urina perspecta die quarta, salutaris sequatur evacuatio quinta die, aut septima iis in morbis, qui celeriter moventur.

LXXII. Quibus urinæ albæ, & perspicuæ; malæ, præsertim si in *phreniticis* appareant.

LXXIII. Quibus *hypocondria*, elevata murmurant, lumborum dolore superveniente, his alvi humectantur, nisi flatus erumpant, aut urinæ multitudo proveniat; hæc vero in febribus *accidunt*.

LXXIV. Quibus speratur abscessum futurum ad articulos, liberat ab abscessu urina multa, crassa & alba, facta, qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam incipit fieri. Si vero etiam ex naribus fluxerit sanguis, brevi admodum solutio fit.

LXXV.

LXXII. *Quibus*. Adde: acute febrientibus. *Urinæ albæ*. Id est, tenues, aquosæ, pellucidæ. *Malæ*. Ubi tales, morbo crescente, redduntur, cum antea rubræ crassioresque fluxerint, periculum est, ne capitis sequatur dolor, aut surditas, aut delirium, aut convulsio, nisi inde hæmorrhagia superveniat critica, vel alvi fluxus, vel dysenteria, vel abscessus. Neminem ex *phreniticis* servatum cum urinis hujusmodi observavit *Galenus*: neque exitiales minus sunt delirantibus per acutas febres, si cum virium prostratione excernantur; quemadmodum viribus firmis & robustis existentibus sola morbi longitudo significatur, *Mercurial*. Quin & in morbis longis, ubi est crudititas, & obstructio gravis, si eadem ipsæ perseverent, & vires dissolvantur, mors expectanda, *Holler*.

LXXIII. *Hypocondria*. v. *aph*. 40. VI. *Elevata*. Ob distenta intestina flatu, aut etiam fæcibus. *Humectantur*. Id est, alvi fluor sequitur.

LXXIV. *Quibus*. Si putas, materiam incumbere posse in articulos, ibique abscessum, *aph*. 31. creare, quod in quibusdam continuis febribus ex succis crudis crassisque ortis, corporis lassitudinem, articulorumque dolores inferentibus accidere solet; non expectabis abscessum, si repente æger reddit crassas multas albasque urinas, aut alvus ei fluat copiosius, aut profusio sanguinis de naribus fiat. *Quarto die*. Intellige & reliquos indices, criticosque, ut 7. 11. 14. 17. 20. Sed *Hipp*. tantummodo 4. nominat, quod laboriosis his in febribus, in quibus tanta lassitudo est corporis, ut moveri corpus sine dolore nequeat, sæpe solutio solet accelerari, *Hollerius*. *Apud*

LXXV. Si sanguinem, & pus mingat, renum, aut vesicæ exulcerationem significat.

LXXVI. Quibus in urina crassa existente, carunculæ parvæ, ac veluti capilli una exeunt, his à renibus excernitur.

LXXVII. Quibus in urina crassa, furfurea quædam simul exeunt, his vesica scabie laborat.

LXXVIII. Quicumque sponte sanguinem mingunt, his in renibus venulam ruptam significatur.

LXXIX.

nos perraro humores articulos cum dolore occupantes, eosque inflantes, suppurant; sæpe vero dolores, suppurationesque in spatiis articulos interjacentibus fiunt. Et si dolorem, v. g. lumborum, ossis sacri, coxarum, crurumque non levant sudores, toto corpore ubertim fluentes, suppurationis indicia esse, plus semel didici, iis in partibus, quæ dolore infestantur.

LXXV. Et. Scilicet copulative exponi *ê, * debet; secus falsa prorsus esset Hipp. sententia: nam plures sanguinem mējunt sine ulcere renum, aut vesicæ; quidam interdum & pus sine vitio harum partium.

LXXVI. *Quibus.* „ Si urina crassa “ inquit Celsus „ carunculas quasdam exiguas, aut quasi capillos habet, utique in „ renibus vitium est. “ Nimirum tales carunculæ, capillis similes è renibus excernuntur, nisi dolor pubem, inguina, aut interfeminium occupans, besicam laborare, suadeat. Quippe non urinæ qualitas sedem morbi, sed dolor indicat, nam ubi dolor, fere & morbus ibi est.

LXXVII. *Furfurea.* Instar furfuris tritici. *Scabie.* Excoriatione, ac veluti scabie, cui fere dolor, pruritus pudendi, ac fœtor accedit.

LXXVIII. *Sponte.* Id est, *sine causa manifesta*, ullove signo vesicæ ulcere affectæ; aut repente, & confertim sanguinem mingunt. *In renibus.* Insuper è renibus proveniens sanguis vel ex eo cognoscitur, præter quam quod sine dolore renum, vesicæve funditur, ubertim etiam fluit, intimiusque urinæ commistum mingitur, nec fere coit postquam subsederit: parciore vero puriorque, sæpe etiam grumofus mingitur, qui è cervicis fundique vesicæ vasis fertur, & difficulter emittitur, vesicæque dolores & partium, quæ cum ea consentiunt, movet. *Vid. aph. 80.*

LXXIX. Quibus in urinis renosa *subsident*, his vesica laborat calculo.

LXXX. Si sanguinem *mingat*, & grumos, & stillidium urinæ *habeat*, & dolor in anum incidat ventrem, & *interfeminium*, circa vesicam *morbus* est.

LXXXI. Si sanguinem, aut pus *mingat*, aut squamulas, & gravis odor adsit, vesicæ exulcerationem significat.

LXXXII. Quibus in urinaria fistula tubercula nascuntur, iis suppuratione facta, & eruptione, solutio.

LXXXIII. Mictio noctu plurima facta parvam significat dejectionem.

APHO-


LXXIX. *Quibus*. Vix unquam veram sententiam hanc deprehendes, nisi * *psammodea*, * *arenosa*, legas cum Zecchio *lutosum*, sive *argillosum* quid, veluti narium mucus, matulæ fundo tenaciter inhaerescens; aut cum Beverovicio * *hyphistatai*, * *subsident*, legas, *sistuntur*, ut sensus sit, eos vesicæ calculo laborare, quibus fabulosa, quæ excerni solent, in urina remanent, ac in vesica sistuntur.

LXXX. *In anum*. Ad pectinem, quin & in ipso pectine. *Circa*. Id est, vesicæ cervix, aut vesica ipsa graviter afficitur.

LXXXI. *Significat*. Adde ex Celso: *idque ipsum*, nimirum sanguis, pus, squamulæ, cum difficultate redditur, & *circa pubem interiores partes dolent*.

LXXXII. *Urinaria fistula*. Fistula, sive meatus urinarius, canal is dicitur, qui à vesicæ ortus cervice ad penis finem pertingit, urinæque reddendæ inservit. *Tubercula*. Tuberculum parvus tumor est, solitus meatum obsidere urinarium, & vesicæ cervicem; ideoque mejendi difficultatem & dolorem parit. Id ipsum si suppuret, emittaturque pus, sanitas redit; sin minus (non enim omnia suppurant) sæpe homo moritur ob interceptam urinam, graviorque accidentia cum tumefactione pubis. *Vid. Holler*.

LXXXIII. *Plurima facta*. Ab eo, qui solitum potum, & cibum assumpserit.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO V.

- I. **C**onvulsio ex elleboro lethalis est.
 II. Convulsio ex vulnere lethalis est.

III.

I. *Convulsio. v. 57. IV. Elleboro.* Scilicet albo, qui vomitum violentissimum ciet. *v. aph. 13. IV. Lethalis.* Præsertim si convulsio immoderatam purgationem sequatur: nam circa initia purgationis orta convulsio interdum conquiescit circa finem, *ex Holler.* Sententiam autem non de solo elleboro veram esse, sed de medicamentis quibuscunque cum prævalide purgantibus, tum venenosis, sætumque ejicientibus, plures affirmant.

II. *Vulnere.* Tum etiam luxatione, ulatione, contusione, fractura, punctura. *Lethalis.* Subaudiendum: *plerumque ex Gal. aliisque.* Ceterum convulsionum alias aliis esse periculosiores, usus atque observata testantur. Eisdemque evincitur, eas ipsas in aliis corporibus minus, in aliis plus esse metuendas. In hysteriis, inque hypochondriacis hominibus interdum vel leve vulnus, contusio, ulcusque dolens convulsiones movet, quas levatus brevi dolor solvit, aut exeunte pure intus concluso, aut tumore læsæ partis, inflammationeque discussis. Contractiones artuum, concussionesque, quæ in hisce morbis, gravioribus licet, per somnum fiunt, præsertim ineuntem, iis minus habent periculi, quæ in vigilantibus excitantur. Sed his quoque tentatus homo interdum convalescit; nullum vero servatum, quos viderim, eorum, fuisse memini, cui recta & immobilis cervix sive continenter, sive vicissim intenditur, aut caput scapulis, aut mentum pectori adnectitur; cui quidem pestifero convulsionis generi sæpe consertæ præcedunt maxillæ, interdum stridor dentium, interdum labiorum distorsio, interdum tarda aut depravata verborum pronunciatio, interdum læsa deglutitio; ortisque convulsionibus hujuscemodi omnis me-

di-

III. Ubi sanguis plurimus fluxerit, convulsio, aut singultus superveniens, malum.

IV. Ex immodica purgatione convulsio, aut singultus superveniens, malum.

V. Si ebrius quispiam repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit, qua solvuntur crapulae, vocem recuperet.

VI.

dicina fere est supervacua, vel si laesae partes ferramentis, aut oleis adurantur, aut nervi, tendinesve ex toto praecidantur, ut Galenus probat, scalpello. *Viro aetatis 45. annorum frangebatur tibiae os, qua tarfi ossibus jungitur. Vulnus fracturam sequebatur. Repositis ossibus contra Hipp. monitum crura utraque postridie contrahebantur saepe, vehementerque, totum corpus concutiebatur. Solutis me suadente vinculis, dimotisque è sede ossibus convulsio extemplo desit, sensimque etiam dolor, homoque claudus, lubens tamen superstes fuit.*

III. Ubi sanguis v. aph. 9. VII.

IV. Immodica purgatione. Id est, nimia evacuatione aut medicamentis facta, aut ope naturae concitata. Ex elleboro ortam cum subsequente convulsione lethalem scripsit esse I. aph. ceteras duntaxat malas hic appellat Hippocrates. Celsus vero tam convulsionem medicamentis partam, quam quae inanem invadit hominem, duntaxat periculosam vocat. Inanemque intelligere videtur, eum qui quamplurima sine medicamentis vomit ac dejicit, qualis is est, qui cholera corripitur. Ex profusore enim alvo, vomituque ingens saepe coxarum, crurumque dolor, torporqueprehendit, saepe quoque eorundem contractio, nec tamen inde omnes pereunt, sed plures etiam ad sanitatem perducuntur; quibus potissimum succurritur, demisso in aquam calidam corpore.

V. Si ebrius. „Rarus est apud nos is casus, nempe repente obmutescere ex ebrietate, & convulsos exanimari. Sed saepe accidit nostris ut per ebrietatem fiant phreniticis similes, & delirent, donec vinum edormierint.“ *Holler. Quos ipse vidi, duos vero tresve, non plures vidi, ex ebrietate obmutescentes resoluti jacebant corpore; amissisque sensibus apoplecticorum instar, sed sine oris alterotriusque paralyti lateris, quae in his plerumque observatur. Liberabantur autem ebrietate discussa*

VI. Quicumque *nervorum rigore* corripuntur, in quatuor diebus pereunt; si vero has effugerint, sani fiunt.

VII. Quibuscunque morbi comitiales fiunt ante pubertatem, in *pubertate*, mutationem accipiunt; quicumque autem vigesimo quinto, *plerumque* commoriuntur.

VIII.

modo vomitibus, modo sudoribus, modo siti, urinisque. Convulsus moritur. Non particulari, sed universali convulsione ob affectum cerebrum, *Liebaut.* Nisi febre corripatur. Quæ sit convulsioni analoga, id est, apta ad discutiendam ebrietatem, & nisi corripatur, ex *Martiano*, statim ac voce privatur: nam si postea febris supervenit, plerumque moritur. *Ad horam.* Incertum est tempus, quo crapula, sive ebrietas solvitur. *Oribasius* censet, id accidere 7. aut 9. hora. *Galen. ex Hipp.* 2. aut 3. die. Sed tempus variat pro diversitate naturarum, corporumque; & vinorum indole, quantitate, ac viribus, locorumque, in quibus homo degit.

VI. *Nervorum rigore.* In hoc maxillæ velut ligna configuntur, os aperire nequit, oculi illacrimantur, ac pervertuntur, dorsum rigidum est, crura, neque manus similiter adducere potest, facies rubescit, & vehementer dolet, & ante mortem potionem per nares rejicit; 3. aut 5. aut 7. aut 14. die perit; quos si effugerit, convalescit, 3. *de morb.* Sani fiunt. Siqua evacuatio, aut siqua febris superveniat, quæ convulsionem mitiget, bene sperare de salute possumus, protracto ultra quartum diem morbo, *Alpinus*; nihil tamen inde certi pronunciantes nam experientia constat, *Gorterus*, homines tales etiam post septimam diem periisse. Hoc affectum morbo sine causa externa senem solum vidi. Isque 9. miserrime periit. Conversa enim erat ei febris in hunc pessimum morbum. Vivens nutriebatur indito alimento per dentis dudum evulsi cavitatem. Nulla profuere remedia; nec vel in calidum oleum totum descendisse quicquam juvit. *Vid. aph. 57. IV.*

VII. Comitiales v. *aph. 45. II.* Post annum 25. morbus hic ortus ægre curatur: multoque ægrius is, qui post 40. annum cœpit; adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, vix quicquam in medicina sit. *Celsus.* Commoriuntur. Id est, ad mortem usque comitantur.

VIII. Quicunque *pleuritide* laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, hi ad suppurationem vertuntur.

IX. Tabes fiunt maxime ætatibus à decimo octavo usque ad trigessimum quintum annum.

X. Quicunque ab angina liberantur, his si morbus ad pulmones vertitur, in septem diebus pereunt; si vero has effugerint, suppurantur.

XI. Qui tabe molestantur, si sputum quod extus-

I

fi-

VIII. *Pleuritide v. aph. 23. III. Repurgantur.* Si pleuritis intra quatuordecim dies ex toto non tollitur seu sputis, seu sudore, seu urinis, seu qualibet alia evacuatione, sed dolor adhuc, & tussis, sitisque, & calor, & cibi fastidium, & spirandi difficultas, & febris persistit, quantumvis imminuta, expectanda fere est suppuratio, siue humoris morbum facientis in pus mutatio, quod plerumque in cavitatem pectoris effunditur, quam occupat dolor. Est etiam interdum ubi cessat dolor primis diebus, coloremque amittunt sputa, sed tussis, sitis, vigilæ, & febris permanet acuta: hanc delirium sequitur; demum 11. aut 14. pus excreari multum incipit. Porro inter pleuritides eæ potissimum suppurant, in quibus aut alba crudaque feruntur sputa, unaque spumosa, aut viscida, aut, *Riverio* observante, admodum sanguinolenta.

IX. *Tabes.* Quæ à pulmonum exulceratione excitantur; morbus phthisis dicitur.

X. *Angina.* Id est, latente, cum nec in faucibus, nec in collo tumor est, & dolor vexat, & vix spiritus trahitur. *v. lib. 3. præfag. Suppurantur.* Pus iis in pulmone colligitur, aut in spatium thoracis effunditur. Id quum accidit, funestum appellat *Heurnius*, additaque confirmat historia. Ipse nuper senem habui septuagenarium hujusmodi angina laborantem, sputaque paullo post initium morbi ejicientem putrida cum tussi e pulmonibus, qui die 14. angina perseverante ad plures migravit.

XI. *Qui tabe.* Id est, phthisi, *aph. 9.* Non tanquam morbis signum in phthisicis, sed proximæ, sputi fetorem & capillorum defluxum proponit *Hippocrates*. At plurium phthisicorum sputa nec male olent injecta carbonibus, nec iis capilli, nisi admodum extenuatis ante mortem defluunt. Interdum etiam

spu-

fiunt grave olet injectum carbonibus, & capilli è capite defluunt, lethale.

XII. Quibuscunque tabe laborantibus capilli à capite defluunt, hi alvi profluvio superveniente moriuntur.

XIII. Quicumque spumofum sanguinem exspuunt, his è pulmone eductio fit.

XIV.

sputa fœtent, capillique decidunt longe ante eandem. Mortis quoque proximæ signum dicitur sputum in aquam marinam projectum, aut cui salis subduplum liquefacti insit, si fundum petit. Sed quæ isthæc est tutior nota, nisi si conjungatur cum aliis vicinæ mortis indiciis. Cujusmodi sunt extenuato infirmatque corpore sputi suppressio, aut diminutio, aut ejusdem difficilis & cum metu suffocationis excretio, aut perseverans sputi in pectore strepitus, aut alvus soluta, aut difficilis respiratio, maximeque si sublimis fuerit, aut perquam frequens, exilisque, aut intercepta. Mortem quoque maturant sudores copiosi, ac potissimum frigidi. Nugæ, & deliria; itemque pulsus imbecilli exilesque facti, & narium constrictio propinquam mortem declarant.

XII. *Tabes*. Scilicet inveterata, confirmata, *aph. II*. In hac, ait *Celsus*, ubi capilli fluunt; ubi urina quædam araneis, similia supersidentia ostendit, atque in sputis odor fædus est, maximeque ubi post hæc orta dejectio est, protinus moritur: utique si tempus autumnus est, quo fere, qui cetera parte anni traxerunt, resolvuntur. Ex quo patet alvi profluvium in phthisi: solum inveterata pertenuique corpore certum esse proximi exitii signum, si permanat, maximeque si spuere æger desinat. Plures enim phthifici, nec tamen exhausti, alvi fluxu corripiuntur, qui brevi conquiescit; interdum etiam eo nonnihil levantur; quod minus tussiant, minus sitiant, minus cibum fastidiant.

XIII. *Exspuunt*. Rectius, *extussunt*, ut alii legunt, *Celsus*, *exscreant*. Utroque modo è pulmonibus educitur sanguis plerumque spumans vividus & sine dolore, sæpe etiam sanguinei sputi sonus percipitur in trachea ab ægro; sæpe etiam à medico; estque certissimum omnium sputi è pulmonibus educti signum, spuma licet desit, vividusque sputi color. *Vid. aph. 25. IV.*

XIV. A tabe detento profluvium alvi superveniens, lethale.

XV. Quicumque ex *pleuritide* suppurantur, si in quadraginta diebus purgantur à die, qua fit ruptio, liberantur: si vero non, ad tabem transeunt.

XVI. Calidum, ubi quis sæpius eo utatur, hæc mala

XIV. *Tabe v. aph. 9. & 11.* Si ingentem extenuationem alvi fluxus sequatur, mors in propinquo est. Fere enim tunc temporis evenit, ut supprimatur, aut imminuatur sputum, quodque redditur, multo difficilius excreatur difficultas respirandi aut oritur, aut increscit; vox fit rauca, exilisve, pulsus, viresque deficiunt, nec æger appetit, nec sustinet cibum. *Tabidam novi virginem, toto trimestri, quo alvus fluebat, nec tussientem, nec quicquam expectorantem, exsiccata vero ante mortem alvo, tussique, atque sputo redeunte putrido miserrime consumptam. Phthisi raptam fuisse, erant qui negarent, post longam tussis sputique vacuitatem. Secto andavere pulmo leva parte fœdissimo pure replebatur.*

XV. *Pleuritide v. aph. 23. III. Suppurantur v. aph. 10.*

Purgantur. Id est, si pus omne excreetur intra 40. dies, ducto calculo non à prima pleuritidis die, sed à die, qua puris eruptio facta est, quæ fere solet fieri die 20. 30. 40. rarissime 60. *Liberantur.* Valetudinis futuræ signa sunt, si febris, nisi prima die, qua puris eruptio facta est, conquiescit, certe imminuitur in dies, quo ad usque finitur ex toto; si tussis intra quadraginta dies cessat, si dolor depellitur, si difficultas respirandi tollitur, si somnus, & alacritas redit, cibique incipit cupiditas. *Si vero non.* Id est, si perstat febris; sitis, dolor, vigilia, cibi fastidium, per noctem sudor, & spirandi difficultas ad tabem æger transit, citiusque eo fere moritur, qui in eandem ipsam è sanguinis sputo incidit. *Transeunt.* Adde: plerumque. *Ipse evasisse famulum memini, multo pure intra quatuor menses ex ore rejecto, longoque interim alvi profluvio, nocturnisque una sudcribus, & lenta febre exhaustum & probe confectum. Initio lateris apertionem recusaverat.*

XVI. *Calidum.* Intelligendum hoc loco de balneis, perfusionibus, irrigationibus, injectionibus, fomentis calida factis.

*Effeminationem. Languorem. Incontinentiam. Infirmi-
tatem.*

Pro-

la affert; carniū effœminationem, nervorū incontinentiam, mentis torporem, profluvia sanguinis, animi defectiones ad quæ quidem mors sequitur.

XVII. Frigidum autem convulsiones, distensiones, livores, rigores febriles effluit.

XVIII. Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ; calidum vero utile.

XIX. Quæcumque refrigerata sunt excalescere oportet, exceptis iis, è quibus sanguis fluit; aut fluxurus est.

XX.

Profluvia sanguinis. Non tamen in omnibus, sed in iis dumtaxat, qui obnoxii sunt similibus evacuationibus sive è naribus, sive ex ore, sive ex utero, sive ex hæmorrhoidibus, sive ex vesica. *Animi defectionem.* Hanc movent interdum balnea nimium calida, nulla præcedente profusione sanguinis, neque necare eum solet, cui statim atque ea ceperit, frigida succurratur. *Adolescens ob insaniam in balneum calidi demissus, animique defectione correptus, ubi animam efflavit. Ante balneum large ei quater missus est sanguis. Mors sequitur.* Non semper, sed aliquando. *Ex Oribas.*

XVII. *Frigidum.* De frigido immoderato loquitur, aqua frigida, aere, ceterisque frigidis rebus. *Convulsiones.* Motus convulsivos, aph. 57. IV. *Distensiones.* Nervorum rigores, aph. cit. & 6. V. *Livores.* Nigrores partium frigore correptarum: unde pedes interdum nimio frigore emoriuntur, & abscedunt.

Rigores v. aph. 20. qui febrem excitant.

XVIII. *Frigidum.* Id est actu frigidum. *Nervis.* „Ob id „Galenus passim prohibet in vulneribus, si quis nervus sit læsus, ne exponatur frigori, eo quod periculum est, ne oriatur stupor, paralytis, vel convulsio.“ *Holler.*

XIX. *Refrigerata.* Adde: quæ refrigerationis damna, aph. 20. persentiunt. *Fluit.* Sic, ut sanguinis effluxus sit, aut metuatur ingens. Intelligere oportet; „Hippocratem hoc loco „agere de hæmorrhagia, quæ fit rupta vena à frigore. Unde „alibi dixit, frigidum rumpit venas“ *Holler.* His igitur in casibus „calefacere non oportet, ne calidum fusionem faciens, „& rarefaciens vehementius noceat“ *Philothæus.*

XX. Ulceribus frigidum quidem mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, *livores* obducit, rigores febriles, convulsiones, distensiones efficit.

XXI. Est autem ubi in distensione sine ulceratione, juvene bene carnosio, ætate media, frigida aquæ multa perfusio calorem revocat; calor autem hæc solvit.

XXII. Calidum *suppurationem movens*, non tamen in omni ulcere, magnum est ad securitatem indicium; cutem mollit, extenuat, dolorem sedat, rigores, convulsiones, & distensiones mitigat, & ex his, quæ ad caput attinent, ejus solvit gravitatem. Plurimum autem confert ossium fracturis, sed nudis præcipue, eorumque maxime, qui in capite ulcera habent; & quæcumque à frigore moriuntur, vel ulcerantur, *herpetibus denique excedentibus*, fedi, pudendis, utero, vesicæ; his calidum amicum & judicans, frigidum inimicum, & perimens.

XXIII.

XX. *Mordax*. Ideoque cavendum, ne ulcera primo tempore frigidis madefiant, *de fract. Insuppurabilem*. Id est, frigidum efficit, quo minus materia in pus vertatur. *Livores v. aph. 17.*

XXI. *Est autem*. Id est, interdum contingit, ut tetanus, sive nervorum rigor, *aph. 57. IV.* solvatur adhibitis perfusionibus ex frigida, servatisque iis, quæ in hoc aphorismo notantur. Meminit, inquit *Liebauus*, hujus curationis *Hipp. 3. de morb.* his verbis: *Aquam frigidam plurimam superfundito, & postea vestimenta tenuia, pura ac calida superintegito ignem autem tunc non abbibeto. Hoc auxilium & ad tetanos, & ad opisthotonos*, in quibus caput scapulis adnectitur “*adhibe*. Perraro tamen accidit, ut hi morbi solvantur perfusionibus ex frigida, ipseque *Celsus* has reticet, calida balnea, humidaque fomenta proponens.

XXII. *Suppurationem*. Id est, calidum, in quo ulcere pus movet, saluberrimum est. *Rigores*. Hic insignem frigiditatem intellige. *Convulsiones v. aph. 57. IV. Fracturis*. Adde ex *lib. de fracturis*: & in omnibus circa articulos læsionibus. *Herpetibus exod.* Ulcera sunt inæqualia cæno similia, quibus multus hu-

XXIII. In his frigido utendum, unde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa, sed circa ipsa unde influit: & quæcumque inflammationes, vel *ardores* ad rubrum, vel subcruentum sanguine recenti tendunt; nam veteribus nigredinem affert. Erysipelas etiam non ulceratum juvat; nam exulceratum lædit.

XXIV. Frigida, qualis nix, & glacies, pectori inimica, tussiles movent, & sanguinem, & destillationes.

XXV. Tumores articularum, atque dolores abique ulcere, & podagricos quoque, atque convulsa; horum plurima frigida aqua large affusa levat, & extenuat, solvitque dolorem, nam modicus torpor dolorem solvit.

XXVI.

humor glutinosus inest, odor intolerabilis, majorque, quam pro modo ulceris, inflammatio; & quæ celeriter serpendo, penetrandoque usque ad ossa corpus vorant.

XXIII. *Non ad ipsa.* Id est, non quidem fauciatæ parti admotum, sed circa ipsam. *Inflammationes.* Hic flammeam intellige alicujus partis caliditatem sine tumore, & renixu. *Ardores.* Quum pars aliqua vehementer rubet, velut à flamma usta. Vulgus ignem appellat. *Erysipelas.* Quo sæpe prehensus Macopius hoc solo præsidio, cetera averfatus, delectabatur. At ubi multa & tenax materia subest, ingenique obstructio morbum parit, cui dissolvendæ impar sit canalium contractio quam frigus excitat; frigidæ perfusio plus nocet, quam profit.

XXIV. *Sanguinem.* Frigidum, ut nix, & glacies, valde venas dirumpit. 6. *epidem.* Hac sententia perperam intellecta pleuriticis plerique pocula calidiora quoquo anni tempore ad sputum exhibent evocandum, spiritumque difficilem expediendum. Quibus tamen sæpe pulmonem resiccari, usuvenit, sputumque suppressi, & suppurationem inde excitari. Ideoque alibi Hippocrates potum ad hos morbos laudat hieme calidum, æstate frigidum; non qualem frigidi fontes, puteique suppeditant, sed qualem aer efficit æstivus cubiculi, nimirum tepidulum.

XXV. *Tumores.* Usus frigidæ in his morbis damnat Gorterus, laudant Martianus & Cocchius. Hollerius sic ea utitur adversus tumores sanguine tenui calidoque ortos, ut postea partes refoveat calefacientibus, ad compescendum stuporem, &

fri-

XXVI. Aqua quæ cito calet, & cito refrigeratur, levissima est.

XXVII. Qui noctu bibere appetunt, his admodum sitientibus, si superdormierint, bonum.

XXVIII. Suffitus aromatum muliebria educit; sæpius vero & ad alia utilis esset, nisi capitis faceret gravitatem.

XXIX. Gravidæ purgare turgente materia à quarto mense usque ad septimum; minus vero has. Recentiores autem, & seniores vereri oportet.

XXX. Mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale est.

XXXI.

frigus. *Convulsa*. Solutiones intellige unitatis in nervosis partibus sine vulnere, quas motus repentinus, inæqualis, & vehemens solet gignere; italicæ carne gravata nominatur.

XXVI. *Levissima est*. Optima qua celerius legumina, olea, radices percoquantur; quæ candidum linteum non commaculat, quæ fervefacta non dimittit facem; quamque bibentes incolæ sani degunt. Talis quidem levissima est non eo quia in lance minus ponderat, sed quod hypochondria minus gravet, sitque per eadem prompte meabilis. *Ex Liebaud*.

XXVII. *Superdormierint*. Quia fere sitis post somnum estinguitur.

XXVIII. *Suffitus*. Pudendis adhibitus, vel infundibulo in eadem immissus. *Muliebria*. Id est, purgamenta quælibet uteri naturalia.

XXIX. *Gravidæ*. Eadem sententia legitur *aph. 1. IV*.

XXX. *Acuto*. Acuti sunt, *de morb. 1. febris ardens, phrenitis, pleuritis, peripneumonia, uteri erysipelas, aph. 43*. Adde *ex lib. de morb. mul.* anginam, epilepsiam, apoplexiam, distentionem, & rigorem nervorum, *aph. 57. IV. Lethale*. Non tamen semper, quia magna pars nostratium evadunt: & contra moriuntur multæ, præsertim si vehemens fuerit morbus. Quod autem hic dicit in genere, particulatim explicat, *lib. 1. de morb. mul.* Hollerius. Periclitantur quammaxime varioris gravidæ, si confertæ, & depresso fuerint præsertim in facie.

XXXI. Mulier utero gerens, sanguine misso ex vena, abortit; & magis, si foetus sit major.

XXXII. Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

XXXIII. Menstruis deficientibus, sanguis è naribus fluens, bonum.

XXXIV. Mulieri utero gerenti si alvus plurimum profluat, periculum est, ne abortiat.

XXXV. Mulieri, quæ morbis uteris molestat, aut difficulter parit, superveniens stertutatio, bonum.

XXXVI.

XXXI. *Abortit.* Hoc non esse perpetuum usus ostendit. *Celsus.* Et nos hodie sæpe à morte vindicamus & matrem, & foetum missione sanguinis, etiam in morbo periculosissimo, ut pleuritide, febre ardente, &c. quanquam in his fere abortiunt. *Holler.* Sunt etiam mulieres, pergit idem, quæ quia sanguine redundant, sæpe copia sanguinis foetum suffocant; ob id illis cogimur sæpe 4. aut 5. mense venam secare, ne abortiant.

XXXII. *Mulieri.* Cui desint menstrua. *Evomenti.* Sive sanguis è ventriculo feratur, sive è thorace, pulmonibusve. Utramque enim significationem habet apud Hipp. * *emeousee*, * *evomenti.* Ad exeso, aut rupto vase sanguifero, præsertim in pulmonibus, sanguis non sistitur, quamvis menstrua erumpant, aut si sistitur, tussis tamen perseverat modo sicca, modo humida, sputaque cruda, viscida, ac subinde putrida feruntur, accedente lenta noctuque crescente febre, lateris dolore, difficili decubitu supra latus alterutrum, sæpe etiam respirandi difficultate, mulierque sic tabe consumitur.

XXXIII. *Deficientibus.* Adde: aut imminutis. *Bonum.* Id est, minus malum, quam si nulla sanguinis evacuatio fiat, aut si sanguis superne feratur sive vomitu, sive tussi, *aph. 32.* Præstat quippe menstrua ad consueta naturæque consentanea loca revocari.

XXXIV. *Profluat.* Adde: nec intra paucos dies conquiescat fluxus. Idem est, & fortasse majus à tenesmo, *aph. 27. VII.* periculum, si ingens persistet.

XXXV. *Uterinis.* *Gorterus* * *hyste riypocoon*, * mavult legere secundinis retentis, quam uterinis morbis, seu suffocatione ute-

XXXVI. Mulieri menses docolores, nec per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam.

XXXVII. Mulieri utero gerenti, si mammæ graciles repente fiant, abortit.

XXXVIII. Mulieri utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, geminos habenti, alterum abortit; & si quidem mamma dextera gracilis fiat, marem; si vero sinistra, feminam.

XXXIX. Si mulier, quæ neque gravis est, neque recens peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt.

XL. Quibuscunque mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat.

K

XLI.

rina; quod in hac sternutamentum nunquam viderit prodesse. At significationem hanc *Galenus* improbat. Apud nos sternutamentum in morbis uterinis ortum, signum est solutum iri brevi paroxysmum convulsivum, seu suffocationem uterinam. Id quoque præstat tussis, nec non oscitatio & pandiculatio. *Aut difficulter.* Sternutamentum tam spontaneum, quam arte excitatum prodest, quum difficultas pariendi ab inertia dolorum pendet, aut ab imbecillitate fœtus, atque uteri: nocet autem, ubi fœtus, aut uteri prava conformatio, aut positio est. *vid. Heurnius.*

XXXVI. *Decolores.* Nam „procedit sanguis velut à victima, & cito congelatur, si sana fuerit mulier.“ *De morb. mul.* Pallidi igitur, atque inordinati menses, id est, tempore & quantitate variantes purgationem quæ vitiosos succos evacuet, fere desiderant.

XXXVII. *Repente.* Id est, sine causa manifesta, vel nullo antecedente morbo. Abortit. Rectius *Celsus* *abortus periculum est.* Nam non esse semper veram sententiam & experientia, & *Galenus* docet. *Mercurial.*

XXXVIII. *Mulier.* Incerta sententia, atque ab hominis anatome abhorrens.

XXXIX. *Lac habet.* Rarum est, in virginibus suppressis mensibus, lac gigni in mammis, notante *Heurnio*, quin & sine partu prægresso, rarissimum, scribente *Gortero.*

XI. *Colligitur.* Ut inde, aut tubercula oriantur dura, aut inflammatio, aut tumor non suppurandus. Hæc sententia inter ea, quæ raro apparent, est reponenda.

XL I. Si velis noscere, an conceperit mulier, quum dormitura est, ei aquam mulsam potandam da; & si alvi tormina patietur, concepit, sin minus, non concepit.

XL II. Mulier, si marem concepit, bene colorata est; si vero feminam, male colorata.

XL III. Si mulieris gravidæ in utero sit erysipelas, lethale.

XLIV.

XL I. Si velis. Hunc, & sequentem aphorismum non sine suspitione legendum plurimi animadvertunt.

XL II. *Mulier.* Hoc non esse perpetuo verum, sed magna ex parte, scribit *Hollerius*, alique. *Gorterus* autem nullis experimentis innixam sententiam, incertamque ac futilem suo relinquit Auctori. Æque fallaces sunt, quas prædicant, notæ plures levitatis, agilitatis, & mundioris faciei. Itemque planioris ventris, pupillæ oculi dexteri majoris, splendorisque quam sinistri, mammæ dexteræ tumidioris, pulsus arteriarum dexteræ manus, elatioris, pedis dexteri, dum progredi mulier incipit, extensionis, & alia his similia.

XL III. *Erysipelas.* Quid sit non plane constat, nec equidem morbum hunc vidi unquam. Quæ de hoc morbo cognoscendo & curando legimus apud *Hippocratem*, lib. de nat. mul. n. LVIII. & 13. edit. *Linden.* non satis inter se conveniunt. Signa quoque hujus morbi proponit *Gorterus*, sed non omnia æque certa, ac manifesta. Inter reliqua putat, in ureri erysipelate, febrem remittentem magis, quam adesse continuam, in inflammatione vero ipsius uteri continuam, ardentemque. Attamen persæpe vidi lethales uteri inflammationes tam in prægnantibus, quam in cæteris mulieribus cum febribus, quæ remittebantur, conjunctas; interdum etiam cum iis, quæ cum rigore reverterentur, seque se subinde remitterent incerto sæpius ordine. Pluribus tamen erysipelas uteri inflammatio esse dicitur cum dolore non admodum acuto, sed fugaci, febreque perquam acuta, & siti maxima. *Lethale.* In allatis utrisque locis apud *Hipp.* lethale dicitur in prægnantibus. *Mercurialis* existimat, perire ex eo mulierem ratione potius abortus acutæque febris, quæ eidem fere morbo copulatur, quam læsionis ipsiusmet uteri. *Lethale* & matri, & fœtui *Hollerius*, & *Liebautius* prædicant.

XLIV. Quæcunque præter naturam tenues existentes utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

XLV. Quæcunque vero mediocriter corpulentæ abortiunt secundo, aut tertio mense sine occasione manifestâ, his acetabula uteri plena mucoris sunt; & non possunt ex pondere fœtum continere, sed disrumpuntur.

XLVI. Quæcunque præter naturam crassæ non concipiunt utero, his omentum os uteri comprimit; & prius quam extenuentur, non concipiunt.

XLVII. Si, *qua parte uterus coxæ adjacet*, suppuratur, necesse est linamentum fieri.

XLVIII.

XLIV. *Præter naturam.* Id est, aut præter consuetum corporis habitum, aut præter naturæ modum sunt extenuatæ; idque sive morbo, sive laboribus, sive fame, sive animi motibus. *Abortiunt.* Plerumque faciunt abortum, & potissimum secundo mense (nam quædam exemplaria habent * *dimeena*, * *bimestres*) si vehementer extenuatæ conceperint. *Priusquam crassescant.* Non intelligendum id est tantummodo ante abortum, sed & ante conceptionem, quasi voluerit dicere Hipp., mulieres admodum graciles, & secundo mense abortientes, debere ante conceptionem crassiorem habitum recuperare, si debent ab abortu vindicari & præservari. *Mercurial.*

XLV. *Manifesta.* Veluti alvi, aut sanguinis profluvio, terrore, ictu, casu, prolapsu, &c. *Acetabula.* Corpora sunt carnosa, spongiosa, atque excavata in quadrupedum utero solummodo occurrentia, quibus fœtus annectitur. In homine mucus ex uteri sinubus, cavernulisque depluens copiosior abortum inferre valet.

XLVI. *Præter naturam.* Si mulier supra modum crassa sit, neque ex propria natura & consuetudine, sed somno, otio, vitæque intemperantiore talis sit facta, ut plurimum non concipit, priusquam extenuetur. *Omentum.* Ægre concedit *Valliserius Hippocrati*, os uteri solere comprimi omento. At obstitos multa pinguedine testes muliebres, tubasque Falloppianas, sterilitatem putat gignere posse. *Philotheus* adipe osculum matricis obstrui censet, omentumque metaphorice ab *Hippocrate* appellari, omentum enim adiposum est.

XLVII. *Coxæ.* Si uterus prope ligamenta, aut ipsamet ligam-

XLVIII. Fœtus, mares quidem in dexteris, fœminæ vero in sinistris magis *gestantur*.

IL. Ut secunda procidat, sternutatorio appposito, & nares apprehendito, & os.

L. Mulieri si velis menstrua cohibere, cucurbitulam quammaximam ad mammas appone.

LI. Quæ utero gerunt, his uteri os comprimitur.

LII.

gamenta, quibus coxæ alligatur, inflammata in pus abeant, oportet penicillis uti, ex linteo decerptis, italice *taste*, ad evocandum pus quod ab exelo, profundo, sinuosoque ulcere destillat circa coxam aperto. Interdum loco *linamenti*, seu penicillorum descriptorum, spongiis, glandibus, fistulis plumbeis, specillis, & syphonibus ad id utimur, prout ulceris figura, atque obliquitas postulat.

XLVIII. *In dexteris*. Id est, in dextera uteri parte. Sententia hæc est raro vera; ab anatome autem hominis prorsus aliena. Hinc derivatæ plures nugæ ad sexum fœtus in utero adhuc latentis prædicendum. *Vid. aph. 42. not.*

IL. *Sternutatorio*. Hoc utitur & *Gorterus* in utero clauso: in aperto cingit & sustentat totum abdomen: & si sic non excidat secunda, seu placenta uterina; hanc indita in uterum manu separat, educitque secundum funiculi umbilicalis ductum.

L. *Cohibere*. Adversus nimiam menstruorum profusionem cucurbitulam proponit *Hippocrates* ad mammas apponendam, eamque quammaximam, ut totam comprehendat mammam. Idem sentit *Oribasius*. *Galenus* autem cum sequacibus pluribus non ad mammas, sed mammarum radicibus eam apponi desiderat, *ubi sunt venæ quæ ad ipsam desuper veniunt*. Atque ita auctoritatem præfert quorundam scribentium * *ypo tous titthous*, * *sum mammis*, Hippocratico textui huic luculento * *pros tous titthous*, * *ad mammas*, & alteri libri 2. *epid. sect. 6.* * *para ton titthon* * *ad mammam*, *supra mammam*. Præter quam quod maiorem mammarum cum utero consensum, quam locorum quæ sub mammis sunt, earundem probat tumefactio, *aph. 52.* & extenuatio, *aph. 37. & 53.*

LI. *Comprimitur*. Id est, contrahitur, clauditur. Sunt tamen id qui negant. Ideo huic non fidendum signo.

LII. Mulieri utero gerenti , si lac multum è mammis effluat , fœtum imbecillem significat : si vero mammæ solidæ fuerint , fœtum significant saniores.

LIII. Quæ corrupturæ sunt fœtus , his mammæ extenuantur : si vero *contra* duræ fiant , dolor aut mammas , aut coxas , aut oculos , aut genua infestabit , & non corrumpent.

LIV. Quibus os uteri durum est , his uteri os comprimere est necessarium.

LV. Quæcunque utero gerentes à febris corripiuntur , & fortiter calefiunt , sine occasione manifesta , difficulter pariunt , & cum periculo ; aut abortu facientes periclitantur.

LVI. Ex fluxu muliebri si convulsio , aut animi defectus advenerit , malum.

LVII.

LII. *Significant.* Observare tamen oportet , nonnullas esse , mulieres sanguineas , atque ita à natura constitutas , ut , etiam si bene valeat fœtus , quem in utero habent , multum , tamen lactis producant , & effundant præ copia , quas ab aphorismo excipi , non est dubitandum *Mercurial. Solidæ.* Id est , turgidiores & firmiores , quam fuerint ante graviditatem.

LIII. *Corrupturæ.* Id est , abortum facturæ. *Extenuantur.* Extenuatæ repente collapsæque mammæ inter abortus signa recensendæ sunt. Contra si lacte non effluente indurescant , abortus metum adimunt , sed fere eas dolor , aut coxas , aut genua affligit , aut oculus.

LIV. *Durum est.* Ex inflammatione , aut scirrho , aut tumore aut callo. Tum os uteri arctari debet non sine abortus metu , vel menstruorum suppressione.

LV. *Febris.* Philotheus febres intelligit vehementes ; Toxius leviores , Vallesius quasunque , ad quem accedere videtur Hollerius. *Sine occasione manifesta.* Vallesius legit : *plus quam ratio postulat.* Galenus , & Philotheus * hanc prophetiam phaneres * ad verbum pariunt referentes , vertunt ex necessitate , ut sensus sit , eas omnino parere debere difficulter , & cum periculo , aut cum periculo abortire.

LVI. *Fluxu muliebri.* Putat Gorterus locutum Hipp. de consue-

LVII. Si menstrua plura fiant, accidunt morbi; & si *subsistant*, ex utero morbi contingunt.

LVIII. Recto intestino, aut utero inflammationem patiente, urinæ stillicidium accidit, & renibus purulentis urinæ advenit stillicidium: *hepati autem inflammationem patienti, singultus advenit.*

LIX.

fuctis mulierum menstruis, in quibus, non ex quibus orta convulsio, animique deliquium, sit malum. At secus suadet * *roos gynaicheios* * *fluxus muliebris*, qui, teste *Gorraeo*, longe differt à mensibus. Neque ei favet textus græcus, in quo *Hipp.* utitur verbo * *epiginomai*, * *supervenio*, & præpositione * *epi*, * *ob propter*, non aliter, quam ubi agit de convulsione ex vulnere, atque ex immodica expurgatione. *v. aph. 2. & 4.* Intelligendum est igitur femininarum profluvium, in quo sanguis, aut albus humor, assidue pæne, & inordinate fluit ex utero. *Convulsio v. aph. 57. IV. Aut.* Ideo aut, non &, exponerem, quia in hoc morbo fere solent convulsioni præire deliquia. Interdum etiam graviora deliquia mulieres tollunt, nulla oborta convulsione. *Malum.* Longe tamen gravius & periculosius, si convulsio & deliquium simul, aut vicissim ingruant; aut si alterutrum frequenter incidat, nec faciei color redeat finito deliquio, nec calor carnibus, nec pulsus satis expandatur, nec fiat naturalis respiratio. Solent interdum fluentibus menstruis convulsiones oriri; sed cum à nimio fluxu non dependeant, inter eas reposuerim, quæ malæ non sunt, *Ballon. epid. 1.* aut periculo fere carent, & facile dissolvuntur, *4. coac.*

LVII. *Accidunt morbi.* Ut malus corporis habitus, hydrops, paralyfis, animi deliquia, convulsiones. *Subsistant.* Adde: aut parce admodum, & inordinate fluant; nec se se natura per alia loca exoneret, uti per nares, os, sedem, ulcera. *Morbi contingunt.* Cujusmodi sunt febres, uteri inflammatio, obstructio, tumor; interdum quoque pleuritides, anginae, furores.

LVIII. *Recto intestino.* Præsertim in viris inflammato. *Heurnius.* Utero. Anteriore potissimum ejusdem parte: posteriore namque inflammata, alvus cohibetur, & dolor lumbos fatigat. *Lomnius.* *Singultus advenit.* Non tamen semper; quod etiam de urinæ stillicidio notat *Valles.*

LIX. Si mulier non concepit, scire autem velis, *num* conceptura sit, pannis *undique* circumtectam desubter suffias, & si odor videatur per corpus ire ad nares, & os; scito, quod ipsa non ex se ipsa sterilis est.

LX. Si mulieri utero gerenti purgationes eant, impossibile est foetum esse sanum.

LXI. Si mulieri cessent purgationes, neque febris, neque rigor superveniat, & fastidia incidunt, judica ipsam in utero habere.

LXII. Quaecunque frigidos, & *spissos* uteros habent, non concipiunt: & quaecunque *præhumidos* uteros habent, non concipiunt; extinguitur enim in eis genitura: & quaecunque *siccis* magis, & adurentes, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen. Quaecunque vero ex utrisque *mediocrem* habent temperaturam, hæc fecunda sunt.

 LXIII.

LIX. Si Mulier. Inanem, & futilem sententiam jure vocat *Gorterus*.

LX. Purgationes eant. Id est, si menstrua crebro, & copiose fluant; sin autem parce, aut primis dumtaxat mensibus, foetus plerunque servatur incolumis.

LXI. Si menstrua mulieri repente, & sine causa manifesta deficient, cui fluere singulis solent mensibus. *Neque* horrore. Quippe ubi sine conceptione, menstrua retinentur, sæpe horror & febris sequitur. *Fastidia*. Stomachi fastidia, nausæque, & frequens sputum circa initia conceptionis accidunt, interdum etiam pravarum, horribiliumque rerum appetitus. *Mammæ* quoque sensim turgent, oculique cavantur plerisque. *Judica*. Caute tamen est judicandum. Etenim fastidia vel sine horrore febreque interdum fallunt. Non enim hæc solum, sed reliquas omnes graviditatis notas accersunt suppressa interdum menstrua.

LXII. *Frigidos*, & *spissos*. Id est, fibras uteri, ovarii, tubarumque inertes, densas, compactas, angustas, motibus obeundis minime aptas. *Præhumidos*. Id est, fibras ejusdem partis molles, laxas, resolutas, madidas, lubricas. *Siccis magis*, & *adur*. Id est, fibras rigidas, duras, aridas.

LXIII. Similiter autem & in maribus; aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ut semen non trasmittatur ad os; vel propter spissitudinem humor non exit foras; vel propter frigiditatem non concalescit, ita ut ad hunc colligatur locum; vel propter caliditatem hoc idem accidit.

LXIV. Lac dare caput dolentibus malum; malum vero & febricitantibus, & quibus *hypochondria* suspensa murmurant, & siticulosis, malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt dejectiones, & quibus sanguinis multi dejectio facta est. Convenit autem & tabidis dare, qui non valde multum febricitant, & in febribus longis, & parvis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem consumptis.

LXV. Quibus tumores in ulceribus apparent, non *admodum* convelluntur, neque insaniunt. Verum his evanescentibus derepente, quibus fuerant à tergo, convul-

LXIII. *Similiter.* Id est, si partium fibræ virilium generationi inservientium vitio laborent, quo fibræ uteri *aph.* 62. tum aut nullum conficitur semen, aut nequaquam prolificum.

LXIV. *Malum.* Non tamen semper *Gorterus* existimat. Fortasse juvat, quum acria cerebri membranas mordent. *Febricitantibus.* His quoque sæpe prodest dilutum: quin & integrum in febribus validis: tum quoque biliosis, cruentisque dejectionibus laudat *Costæus*, non ad nutriendum datum, sed ad detergendas ventris sordes. *Hypochondria.* Intellige hoc loco intestina, quæ sub costis sunt flatu elevata, & murmurantia. *Multi.* Sic, ut ventriculi actio vehementer debilitata, lac nequeat coquere. *Tabidis.* Id est, phthisim vergentibus. *Signis.* Quæ lac prohibeat. *Præter rationem.* Id est, seu *plus quam ratio* febris longæ, debilisque *postulat*, seu *ultra modum* extenuatis quocunque morbo, seu *sic* extenuatis, ut tamen ventriculus lac possit concoquere.

LXV. *Ulceribus.* Rectius, *vulneribus.* * *Elcos*, * enim apud *Hippocratem.* Vulnus etiam significat; vulneraque longe frequentius, quam ulcera convulsionem inferunt, & delirium. *Non admodum.* Id est, raro, non facile. *Derepente.* Id est, non

vulSIONES, & rigores nervorum fiunt; quibus vero ante, insania, vel dolor lateris acutus, vel suppuratio, vel dysenteria, si tumores sunt rubicundi.

LXVI. Si in vulneribus fortibus, & pravis, tumor non appareat, ingens malum.

LXVII. Molles tumores, boni: crudi vero, mali.

L

LXVIII.

sensim evanescant adhibitis remediis, aut ope naturæ. *A tergo.* Id est, parte postica corporis. *Convulsiones.* v. *aph.* 57. IV. 6. V. *Insania.* Proprie delirium vehemens est sine febre, improprie, delirium. *Suppuratio.* v. *aph.* 10. *Dysenteria* v. *aph.* 11. III. *Rubicundi.* Id est, sanguinei.

LXVI. *Fortibus.* Id est, longis, latis, & profundis, quæve partem nobilem, aut extrema musculorum occupent. Idem dicendum de contusionibus, fracturis, ulceribus. *Tumor.* „, Nis, mis intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, „, periculosissimum. Illud indicium magnæ inflammationis: hoc „, emortui corporis est. *Celsus.* Nam *quandiu vis vitæ valet inquit Gorterus, sensim magis increfcit tumore pars læsa, usque dum suppurare incipit, & si non generatur tumor, indicium est vitalem actionem in ea parte esse extinctam.* Igitur non reprimendus tumor, non arctius deliganda vulnera, ne fluidorum itus reductusque impediatur. *Ingens malum.* Ex quo sæpe fluunt deliria, convulsiones, acutæ febres, dolores, vigilie, anxietates, alvique fluxus pestiferi.

LXVII. *Tumores.* Tam circa vulnus, ulcusque, quam alibi apparentes boni quidem, si molles fuerint, dumvero, dolorifici, atque inæquales, mali. *Celsus* quoque cutem circa vulnus durum, crassam, dolentem periculum, ait, ostendere bonaque signa esse „, ubi hæc sine dolore, tenuis & mollis est. *Mag-nus, durusque circa vulnera, contusiones, fracturasque tumor, qui nec calidis fomentis resolvi, nec ad maturitatem perduciqueat, sæpius in gangrænam transit. Sed & magnæ sæpe plenæque periculo suppurationes excitantur, ubi adversus hos ipsos tumores calidioribus fomentis solida crispantibus inflamman-tibusque diutius pugnatur. Quæ sane fomenta sic temperanda esse Celsus præcipit, ut manu contingenti jucunda sint, & usque „, eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex tumore, calorem- „, que ulceri magis naturalem reddidisse „, videantur.*

LXVIII. Dolenti partem capitis posteriorem in fronte recta vena incisa prodest.

LXIX. Rigores incipiunt mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum perveniunt ad caput. Sed & viris parte corporis posteriore magis, quam anteriore, veluti ex femoribus, & cubitis. Indicio est cutis raritas, quam ipsam pilus ostendit.

LXX. A quartanis capti, non admodum à convulsionibus capiuntur. Si vero prius capiantur, & quartana supervenerit, liberantur.

LXXI.

LXVIII. *Prodest.* Ubi dolor non fit ob partium interiorum consensum. In essentiali capitis dolore, siquidem plenitudine vasa laboraverint, antequam frontis vena secetur, artuum venæ erunt aperiendæ.

LXIX. *Rigores v. aph. 26. IV. Lumbis.* Propter concursum nervorum uteri: capsula enim nervi ruditer tacta, rigorem concitat, testante Gortero. *Sed & viris.* Ob spinalem medullam.

Veluti. Id est, quemadmodum horremus externis corporis partibus magis, quam internis, ut cubitis, & femoribus; sic posteriore magis, quam anteriore parte corporis. *Cutis raritas.* Cutem in parte antica corporis, & interna artuum, cum fere pilis sit obrita, calidiorem statuit, minusque frigori obnoxiam.

LXX. *A quartanis.* Gorterus incertum hoc appellat præsagium Hippocratis, tum quia unicam simplicemque causam quartanæ esse putat, antidoto profligari solitam, convulsioneis vero multiplicem, variamque; tum quia observaverit „levissimas convulsiones hystericas frequentius fieri in iis, qui „quartana febre laborant, quam in perfecte sanis.“ Verum quum febribus vim concedit minuendi, solvendi que convulsionem, spasmodumque, & tetanum tollendi, *aph. 26. II. 5. V. & 51. VI.* non video, quamobrem id neget quartanis, incertumque præsagium hoc nominet. Notum præterea est, non solere curari, sicut quartanam febrim, antidoto, hypochondriacos morbos epilepsiam, paralysem, hemiplegiam, asthma convulsivum, podagram, maniam, calculum; à quibus tamen affirmante Kleinio, quartana interdum tum tutatur, tum liberat. Reciprocaturque etiam hæc aliquando, eodem auctore, cum ictero,

dyi-

LXXI. Quibus *cutis circumtenditur arida ; & sicca*, sine sudore moriuntur ; quibus vero *laxa , & rara*, cum sudore moriuntur.

LXXII. Qui regio morbo laborant , non multum ventosi sunt.



APHO.

dyspnœa , œdematibus , ascite , cachexia , tabe , quæ itidem curare non solet antidotus. Sed & posito quod convulsiones hystericae frequentius in quartanis occurrant , quemadmodum sæpius illa occurrit convulsio in eisdem , quam *granchio* Itali nominant , v. *Mercur.* cur quæso reliqua convulsionum genera raro in quartana apparere non queunt ? Sicque verum esse *Hipp.* effatum , tot tantorumque virorum ore confirmatum , per quartanam febrem raro convulsiones incidere , sive mitiores concitari , sive earum pauciora genera oriri , facileque decedere , eadem superveniente.

LXXI. *Quibus.* „ Inter pessima signa , quæ mortem indicant in febribus acutis , est ubi qui antea molli erat cute , jam est scabra & aspera. Quare , cum accedemus ad ægrotos , inducere oportet manum ad thoracem , & hypochondria , ut exploremus , quomodo se habeat cutis “ *Holler.* „ Et hi fere moriuntur cum tremore , & revulsione pulsus , & nervorum “ *Idem.* *Quibus vero laxa.* Notat idem ipse *Hollerius* , hos post commotum sudorem mori 7. horis 14. 16. sed non prætergredi 20. horas.

LXXII. *Non multum.* Videtur mendose interjecta particula 8. quæ apud Græcos vehementius negat. Quippe constat regio morbo , *aph.* 62. IV. laborantes non modo flatuosos esse , sed vehementer flatuosos.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO VI.

- I. **I**N longis *lienteriis*, si ructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum.
- II. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: quibus vero contraria, salubrius degunt.
- III. In longis *dysenteriis* inedia ex fastidio, malum; & cum febre, pejus.

IV.

I. *Lienteriis v. aph. 22. III. Bonum.* Nam signum est restituti ventriculo elateris, aut putrefactionis restitutæ, ut vult *Listerus*, de hum. adeoque principii concoctionis indicium est.

II. *Genitura.* Si iste aphor. petitus est ab *epid. lib. 6.* perperam *Gorterus* * gonee * legit, *partes genitales.* Nam eo loci, post * ee gonee ygrhoteree, * semen humidius. Additur * *chai pleioon*, * *et copiosus.* Ex quo videtur * gonee * legendum esse, *semen*, *genitura*, ut aliis pluribus locis *Hippocraticis* manifestum est.

III. *Dysenteriis v. aph. 11. III. Inedia ex fast.* Id est, Ingens alimenti cujusque fastidium, & averfatio, cui sæpe vomitus jungitur, quum æger alimenta capere cogitur. *Et cum febre pejus.* Pejus erit cibi fastidium, si dysenteria comitem habeat febrem, aut si eandem sequatur. Immo tum salutem omnino desperatam esse, scribit *Hollerius*, nam dissolventur, vires, succedet tandem sudor frigidus, & ita morientur. Sic extinguebatur nuperrime nob. *Helvetus.* Huic fluxit alvus dies amplius 20. cum vehementi cibi fastidio, sæpe quoque vomitu. Calor ei erat ad vespeream. Febris manifesta cum horrore subinde cœpit accedere, quæ elapsis horis aliquot remittebatur. China china febrim non depulit. Urinæ ex rubris, crassisque tenuiores fiebant. Febris, sitis, vigiliæ, cibi averfatio crescebant.

De-

IV. Ulcera circum glabra prava sunt.

V. Dolores, qui sunt in lateribus, in pectore, atque aliis partibus, num multum differant, perdiscendum.

VI. Renum, & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur.

VII. Dolores ventris sublimes, leviores; qui vero non sublimes, fortiores.

VIII. *Hydrope* laborantibus ulcera in corpore facta, difficulter sanantur.

IX.

Delirabat vicissim, & resipiscebāt. Alvus profusior. Pulsus imbecilli. Convulsiones in facie. Madores frigidi, calidique prope interitum. Scite idcirco averstationem ciborum maximam non in dysenteria solum, sed etiam in aliis morbis acutis & diuturnis, si perseveraverit, lethalem pronunciat *Hollerius*; quamquam in icteria sine febre, sineve hepatis duritie, minime exitialem bis observaverim.

IV. *Circum glabra.* Ulcera pilis, quia eraduntur, & defluunt, circum carentia.

V. *Perdiscendum.* Id est, accurate discendum, quantum inter hos dolores intersit discriminis, vel ratione loci, vel morbi, vel causæ, vel si dolor sit acutus, ingens, gravativus, pulsans, pungens, fugax, & potissimum diuturnus, ut interpretatur *Vallesius*: aut si repente evanescat, non sensim, nam sæpe sine ullo errore levior reditur, cum omnis dolor, tum præsertim qui latera, & pectus infestat. v. *Martian.*

VI. *Vitia.* Cujusmodi sunt urinæ ardores, stillicidia, suppressiones, calculi, obstructions, inflammationes, ulcera. *Senioribus.* Id est, annis 50. majoribus, 6. *epid.* Eoque difficilius curantur, quo major est ætas. *Valles.*

VII. *Sublimes.* Id est, dolores ventrem elevantes, perinde ac si flatibus distenderetur. Sic * *meteora*, * *sublimes*, scite interpretatur *Gorterius*. *Galenus.* aliiq. exponunt *exteriores*; nimirum dolores, qui ventris musculos exercent, ad interiora non penetrantes. *Codices Vaticani* habent * *cai oideemata*, * & *tumores*. Hi quoque si externi fuerint, aut elevati, erunt leviores, & securiores.

VIII. *Ulcera.* Tam sponte orta, quam arte excitata in ea præ-

IX. Latæ pustulæ non admodum pruriunt.

X. Caput dolenti, & circumdolenti, pus, vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum solvit.

XI.

præsertim partē, quam aquosus tumor obsidet. Fere oriuntur in cruribus, & femoribus post disruptas vesiculas, quæ aqua distendebantur. Hæc si pruritu primo, deinde dolore torqueant, vix sanantur, sed plerunque serpunt, & denigrantur. Quod quidem vitium frequentius contrahunt ulcera per se orta, quam quæ arte excitantur, Gortero teste. *Ex incisionibus, vel levisimis cutis pedum, crurumque postridie gangrena oriebatur in iis, subindeque moriebatur vir nobilis hydrope universali affectus. Patutius Venetus, nec non alter Bergomas evaserunt, cum hydrope similiter tentarentur, ulcusculis per se exortis in cruribus coxisque, multumque aquæ fundentibus.* In morbo inveterato, aut è viscerum labe profecto, ulcera, sive arte, sive sponte excitata; exitium sollicitant.

IX. *Non admodum.* Id est, minus pruriunt, quam quæ sunt fastigiata, & acuminata.

X. *Circumdolenti.* Plures legunt, *vehementer dolenti.* Non semper, sed plerumque. Dolor porro capitis, aut sine febre ulloque pravo symptomate affligit; tumque fluxu sanguinis largo de naribus, præsertim si tempora & frontem occupet in juvenibus, levare, brevique etiam solvi consuevit, in senioribus vero fere cessat, sive sputis multis, crassisque, sive mucco de naribus ubertim stillante, sive alvi fluxu, sive urinis copiosioribus, aut dolor capitis cum continua, acutaque febre infestat, signisque periculum ostendentibus, & tum salutaria erunt præsidia: *pus, vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures* 1. si evacuatio humoris copiosa fuerit, nam nihil paucum quod est, criticum est, 2. si protracto morbo, & prægressis signis coctionis, evacuatio isthæc fiat 3. si non dolorem modo capitis minuat, sed etiam febrem extenuet, pravaque accidentia removeat; cuiusmodi sunt surditates, vigilæ, deliria, stupores, obmutescentiæ, convulsiones, tremores, spirandi difficultates, similiaque; sin febris remanet, dolorque, ceteræque quæ periculosa sunt notæ, dejectæque sint ægri vires, aut postquam se paulo inclinarint, iterum ingravescant, spem omnem tollunt;

XI. Atra bile vexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

XII. A diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si una *quapiam* non servatur, periculum est *hydropem*, vel talem advenire.

XIII. A singultu *detentum*, sternutatio superveniens liberat.

XIV.

viribus autem constantibus, morbi longitudinem, & recrudescentiam plerumque significant.

XI. *Atra bile vexatis*. Id est, melancholicis. Hi sunt, qui sine febre desipiunt. v. aph. 20. III. quippe diu sine causa manifesta mæsti assidue sunt, ac timidi, aph. 23. VI. *Et renum passionibus*. *Martianus* locutum arbitratur *Hipp.* non de dolore à calculo renum, sed de quocunque dolore, qui renes, aut lumbos occupet, ut *Gorterus* existimat. Sunt etiam, qui legendum putant *ex lib. de judic.* * *phreniticoisi*, * *phreniticis*, id est, cum febre desipientibus, non vero * *nephriticoisi*, * *nephriticis*, seu renibus laborantibus. Sed cum videamus fluxum ex hæmorrhoidibus sanguinis cum nephriticis alternantem affectibus, eisdemque esse præsidio, *Klein.* non est, quamobrem lectionem hanc deferamus.

XII. *Diuturnis*. Eas intellige quæ diu solent sanguinem statim, aut incertis temporibus fundere. *Sanato*. Hæ si auferantur omnes, sectione, ustione, putrefactione, constrictione, sicut nullum amplius effundant sanguinem, periculum est non phthisis modo, hydropisque, sed capitis etiam, pectorisque morborum, aliorumque qui 6. *epid. libro* nominantur. Sinenda igitur est una, quæ inutilem sanguinem evacuet. Sed ne huic uni tractu temporis parcunt, qui fistulam timent, aut compensari posse credunt, sanguinis detractio per venas, evacuationis antiquæ, consuetæque defectum. Contra vero, qui existimant sanguinis detractio perraro morbis succurri, qui ex suppressis mensibus oriuntur, deletisque aliis sanguinis fluxibus, sive de naribus, sive de hæmorrhoidibus; rectius faciunt, si spreto metu fistulæ, unam nunquam destruunt, modo ne nimium profundat sanguinem, ex quo sequi marcor, tabesque queat, aut hydrops.

XIII. *A singultu*. Qui neque ab inflammatione ventriculi, aut aliarum partium, neque à malignis febribus, neque à nimia evacuatione dependeat.

XIV. Ab *hydrope detento*, si aqua à venis in ventrém de fluxerit, solvitur morbus.

XV. A longo alvi profluvio *detento*, spontaneus vomitus superveniens, morbum solvit.

XVI. A *pleuritide*, vel *peripneumonia detento* alvi profluvium *superveniens*, malum.

XVII.

XIV. Ab *hydrope*. Sive *ascite* dicto, quo abdomen aqua distenditur; sive *leucophlegmatia*, (non est verus hydrops) qua totum corpus ex æquo aqua tumet. Si aqua à venis. Si aqua intus contenta, forti alvi profluvio ejiciatur ineunte morbo, visceribus sanis, & viribus integris, solvitur morbus; sin confirmato morbo, & fractis viribus, alvi fluxus oriatur, celeriter occidit. Idem de medicamentis dicendum alvum cientibus. Si ineunte morbo, ea dentur, si viscera vitio careant, si vires sint validæ, ficcari per ea, sanarique æger poterit; sin morbus inveteraverit, & lapsæ sint vires, interim dum purgabitur aqua, morietur æger. *Holler.* sæpeque, repente, postquam inanis est venter, ægerque è morbo se putat evasisse. Apud nos leucophlegmatia sæpius vincitur purgantibus, quam ascites. Hydrops in locis planis ortus, aquis scatentibus, refertisque paludibus, eisdem purgantibus frequentius discutitur, quam qui in siccis, montanisque locis obrepit. Fere nocent purgantia ubi sitis vexat, ubi calor, & febris est, ubi præmunt vigiliæ. Pestifera sunt, si tussis diu occupet, aut spirandi difficultas, ægreve in alterutrum latus homo decumbit; aut si venter quammaxime intumescit, & cæteræ partes corporis emarcescunt, aut extrema livent.

XV. *Longo*. Fortasse rectius * *macrees*, * quod post *Celsum* fere exponitur, *longo*, legendum est, *vehementi*; eo quod vomitus longo alvi profluvio superveniens, sæpius occidat, quam liberet: contra *vehementi*, non tamen veteri superveniens, nimirum viribus, & visceribus integris, sanitatem promittit. Confirmatur versio I. de morb. ubi * *ischyree*, * id est, *vehementi* alvi profluvio superveniens vomitus, salutaris dicitur.

XVI. A *pleuritide* v. aph. 23. III. *Peripneumonia* v. aph. cit. *Malum*. Quia sæpius sputum suppressit, aut minuit, aut ejus exitum difficilem reddit, & dolorem intendit, & spirandi difficultatem auget, & sitim accendit, & vires infirmat. Quibus-

XVII. Lippientem alvi profluvio corripi, bonum.

M

XVIII.

busdam porro alvus profluit post rigorem febris, aut in ipso ejus rigore, aliis morbo incremente, aliis etiam in statu morbi. Si quarta die, coctionis signa in sputis, urinisque apparuerint, & 7. aut postea alvi fluxus incidat, eumque vires sustineant, & febris subinde levetur, & dolor, spirandi difficultas, solutum eo iri morbum, verisimile est. Securitatem etiam pollicetur, qui ante quartam diem accedit, dummodo similiter febrim minuatur, & dolorem, spirandi difficultatem, eoque perseverante minus tussiat, vigilet, minus sitiat, faciliusque æger se convertat, & erigat. *Sic dysenteria ante 4. diem orta, protinus adolescentem pleuriticum ex toto sanavit, inutili materia ad intestina conversa.* Si pleuritidis initio, atque etiam in ipso rigore, aut statim atque is evanuit, alvus crebro, vehementerque cieatur, quo tempore quibusdam etiam frequens, multusque vomitus movetur, si quidem brevi finiatur, periculosiorem fere morbum ostendit, sin diutius persistat, & morbus ingravescat in singulos dies, occidit. Secus enim, atque Riverius asserit sua in regione, apud nos sequitur, nimirum pleuritides eas esse salutaris, quibus ineuntibus copiosus movetur vomitus. Rigor enim eum movet qui vehemens est, & rigoris vehementia inflammationis magnitudinem fere significat. *Mirabatur, ac quodammodo irascebatur mihi parens meus, & ipse medicus, nec omnino infelix, affirmanti ipsum pleuritide prebentem, dum se cholera affectum esse ob crebros, copiososque vomitus existimaret; decessit autem, pro dolor, quinta pleuritidis sævissimæ die, annoque hujus ævi 43. quo etiam conjugem amisit carissimam, patruumque amantissimum.*

XVII. Lippientem. Id est, ophthalmia laborantem v. aph. II. III. Bonum. Quippe solet lippitudinem, capitique dolorem ex Holler. alvi profluvium, aut per se ortum, aut medicamenti accitum solvere materiam avertendo. In corporibus multo sanguine refertis, sanguinis detractionem sequatur purgatio. Hæc in siccioribus hominibus anni tempestate, regioneque calidis blande, cauteque instituenda. Nec diutius purgantibus in quibusvis corporibus, ubi non prosunt, pugnandum est, cum acriores per ea fiant succi, qui morbum faciunt, prolicito humore quo temperabantur. *Plures novi, qui cum diutissime oculis laborassent, sæpius licet misso sanguine, & adhibitis alvum du-*

cen

XVIII. Vesica discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo *transverso*, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut jecore, lethale est.

XIX. Quum discissum fuerit os, aut cartilago, vel nervus, aut genæ *pars* tenuis, vel præputium; neque augetur, neque coalescit.

XX. Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari.

XXI.

centibus remediis sanitatem consequiebantur, oculos proluendo bis, terque die posca, deinde etiam aceto, egelidis. Plures etiam, qui, irritis alvi ductionibus, vesicantibus sanabantur post aures, aut in postica colli parte admotis, setaceoque in hac ipsa parte excitato, servatisque diutius. Dudum quidam Empericus diturnos oculorum morbos persanabat innumeros. Ejus medicina erat tonsis capillis, ceratum capiti imponere universo, quo vesiculæ assurgerent, humorque inde evocaretur noxius.

XVIII. *Septo transverso.* Id est, diaphragmate. *Lethale est.* Si vesica vehementer laceratur, aut latius dividatur, si vulnus cordis ventriculos penetret, aut auriculas, aut majora vasa sanguinis, si diaphragma, ejusque præsertim pars tendinea, quæ media est, magno vulnere pertundatur; itemque ventriculus in fundo potissimum, atque orificiis, jecoris quoque, cerebri, intestinorumque tenuium vulnera lata, & profunda fere lethalia cum eo tamen, ut vix unus, notante *Bohno*, evadat lacerato cerebello; cerebro autem plures: intestinorum pariter tenuium dissectorum oræ: corrupta quoque ea, & ablata majori parte, non semel coaluerunt exteriori ventris vulnere, demissis per vulnus fæcibus. *v. Heisterus, & Platnerus, tum etiam v. aph. 24.*

XIX. *Nervus.* Intellige cum veteribus nervi nomine membranas etiam, ligamenta, tendines. *Pars tenuis.* Ut ad labrum, & palpebras. *Non augetur &c.* Augeri, & coalescere has partes, exceptis nervis, probat *Gorterus*.

XX. *In ventrem.* Id est, ex arteria, aut vena in aliquam corporis cavitatem effusus. *Suppurari.* Rectius, *corrumpi*, inque grumos, ichoremque verti fœtidum, *v. Ballon. de arthr.*

XXI. In insanientibus si varices, vel hæmorrhoides supervenerint, insanix solutio.

XXII. Quæcunque rupta ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio solvit.

XXIII. Si timor, atque mæstitia longo tempore habentes perseverent, ex eo *morbus melancholicus* significatur.

XXIV.

XXI. *Insanientibus.* Ii sunt, qui cum furore sine febre delirant: nusquam quippe aliter * *manian*, * *maniam*, Hipp. accipit.

Varices. Dilatationes sunt venarum in cruribus, interdum in temporibus, in scroto, in inguinibus, in ima parte ventris, alibique. *Solutio.* Non tamen insanientes restituuntur omnes, sed plerique. Insaniam quippe, hæreditariam quam dicimus, vel incipientem non varices, non hæmorrhoides tollunt: uti neque eam, quam solidorum vitia, organica scilicet, procreaverunt. Ii potissimum convalescunt, qui ob suppressas hæmorrhoides hoc morbo tentantur, si eæ rursus ut antea aperiantur, aut si varices, postquam diu occultatæ fuerint, rursus prodeant. Pluribus quoque aliis auxilio sunt, maximeque iis, qui ob nimiam crassi melancholicique, ut ajunt, sanguinis copiam insaniunt, si hæmorrhoides ipsæ per se aperiantur, aut hirudinibus dirumpantur admotis, tantumque fundant sanguinis, quantum ad insaniam auferendam requiritur. Hinc ii damnandi, iudicio *Mercurial.* „ qui variis ligaturis, fasciis, atque calceis „ ex corio canino comprimere, & cohibere nituntur, si qui- „ dem sanguis ille impurus retrocedens vel in caput, vel in „ pectus vel in aliud viscus impelli periclitantur.“

XXII. *Rupta.* Id est, ruptiones. Carnosæ partis solutiones sunt sine vulnere, quæadmodum *spasmata aph.* 25. V. nervosæ, ex violenti ictu, gravi casu, vel alio quopiam valente motu. *Vid. Van Suvieten*, §. 1185. 2.

XXIII. *Longo tempore.* Timor, & mæstitia præter consuetudinem, & sine causâ manifesta incidentes, diuque persistentes desipientiam, & furorem prænunciant. Multos quoque vidit *Galenus* furore correptos, qui ab excandescencia, aut ira, aut mæstitia propter causam manifestam principium sumpserat, corpore per id temporis ad tales affectiones disposito. Timor itidem, & mæror ex causâ manifesta ortus „ si diutius quam

„ pro

XXIV. Si quod intestinorum gracilium discindatur, non coalescit.

XXV. Erysipelas ab exterioribus verti ad interiora, non est bonum : ab interioribus vero ad exteriora, bonum.

XXVI.

„ pro ratione causæ perseverent, cerebri temperamentum immutant, indeque melancholicum inferunt, & significant.
„ Parat autem ad hæc non parum pusillanimitas, & cordis languor, qualis est in pueris, aut mulieribus“ *Liebaud. Nob. Virginem septuagenariam uteri scirrhus quadraginta annos laborantem, luxationeque coxæ amplius quatuor, proxima imminentisque mortis timor incefferat insanabilis. Edebat tamen, dormiebatque, nequaquam febriens, neque sitiens. Post dies 40. timore perseverante, præcedentibus levibus, brevibusque desipientiis in apoplexiam incidit, dieque morbi quarta decima vivere desit.*

XXIV. *Non coalescit.* Id est, nisi summa cum difficultate, præsertim si ingens, aut transversum fuerit vulnus. Penitus autem dissectum intestinum ori vulneris accrevisse, ex eoque alvi fæces emanasse post *Fernelium*, & *Blegnium*, alii plures annotarunt v. *aph.* 18.

XXV. *Erysipelas.* Tumor est cutis cum dolore quodam, quem si tetigeris, sanguis facile refluit, rursusque affluit valde tenuis, & rubens. Solvitur porro erysipelas modo discussione, modo metastasi, seu revocatione. Cum discutitur, sensim discutitur, sensimque, & febris decedit, donec 5. aut 7. integer homo sit; nisi erysipelus caput affixerit, quod fere serius una cum febre finitur. Cum metastasi solvitur, seu extra intro fertur, repente evanescit, febris manet, sæpius quoque intenditur, acceduntque propria periculosaque partium, quo versus humor est, signa. „ Tanto autem conversio intro periculosior „ est, quanto membrum, in quod refluxus ille fertur, nobilius.“ *Jacot. coac. Bonum.* Id accidit, ubi humor noxius è corde, ejusque vasis, ad corporis ambitum continenter, atque ex toto propellitur; quod indicat rubor, & calor, dolorque in cute permanens; quique etiam si, ut sæpe solet, sedem mutet, cutim tamen non deserit; & febris, & sitis, & æstus corporis mitior est, statim atque à primo impetu inclinari febris cœperit. Quod si permagna fuerit multitudo humoris sic, ut non exte-

XXVI. Qui in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio solvuntur.

XXVII. Quicumque suppurati, aut *hydropici* utuntur, aut secantur, si pus, aut aqua universim effluxerit, omnes moriuntur.

XXVIII.

rora modo corporis, sed etiam interiora obsideat, tum febris non minuitur iis, quibus minui solet, diebus, sed cum pravis signis increfcit, ægerque in periculo mortis est.

XXVI. *Solvuntur.* Solvuntur ne febres tremoribus, an tremores superveniente delirio? Solvi queunt febres, si tremor sit criticus, *vid. adolesc. peregrin. 4. epid.* prægressis signis coctionis in excrementis, evacuationeque tremorem secuta, *Holler. coac.* Possunt & tremores delirio tolli, sæpius tamen ad mortem, quam ad salutem notante *Facotio in coac.* Confer *aph. 8. VIII.* „ In acuta febris maligna, & acri, siccatis nervis, & in „ firma motrice facultate, valde periculosus est tremor, & sæpe „ lethalis: in minori morbo, & per initia ab humorum copia, „ non item“ *Facot. ibid.* In senibus minus periculosi sunt tremores, quippe faciles in iis sunt. *Coac.*

XXVII. *Suppurati.* Quibus ex vomice sive in pulmonibus, sive in pleura, sive in diaphragmate existente, pus erumpens, aut ex harum partium vulnere, contusione, sive quovis alio vitio manans in spatium, quod pleuram, pulmoneſque interiora, effunditur. *Hydropici.* Quibus multum aquæ potissimum inter peritoneum, & intestina contrahitur, ex quo venter ex æquo tumet „ motoque corpore, ita movetur & aqua, ut motus ejus conspici possit“ *Celsus. Universim.* Si totum pus, aut aqua una vice educatur, animi deliquium sequitur, & hinc mors sæpe intra duas horas. Quibusdam etiam, qui universi humoris detractioe relevari videbantur, paucis post diebus, pereunt *Verny obs. Ac. R. 25. Apr. ann. 1703.* Quamobrem semel die tantum aquæ detrahendum est, quantum sustinere vires queunt, usque ad dies 12. die vero 13. si quid humoris superest, ex toto educendum, utique si vires consent; sin minus ejus magna pars. Si quid sequenti renatum humoris est, paulatim quoque evocandum. Interim siccantibus roborantibusque tum cibis, tum remediis utendum, ex *Holler.* Caterum postquam nostris temporibus fascia coriacea, eaque lata hydropicorum ventri cir-

cum-

XXVIII. Eunuchi neque podagra laborant, neque calvi fiunt.

XXIX. Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint.

XXIX.

cum datur, qua is dum aqua profluit sensim, arctius perstringitur, fere sine periculo humor universus educitur. In suppuratis, inque hydropse pectoris multo minus aquæ, purisque, cum cinctu propter osseas parietes arctari pectus nequeat; singulis vicibus emittitur. Ante omnia tamen eniti medicus debet, ut hydrofici mature secentur, statimque tabescentes urantur, *Hipp. 6. epid.* Mature illi secantur non, mox atque hydropici esse incipiunt, ut *Vallesius* præcipit, sed statim, atque adhibita fuerint, ut *Celsus* aliique faciunt, cætera artis præsidia: nunquam autem post vitata viscera, post malum corporis habitum, post languidas, confectasque ægri vires, ne scilicet qui traheretur non sectus, sectione maturius rapiatur. De tempore secandi tabescent. v. VII. *aph. 44.* *Ex ascitica mulieris ventre mille, & triginta pondo aquæ unciæ unica vice extractæ sunt, quoad nempe venter inanis omnino fuit debita compressione adhibita, quin ægra animo linqueretur, aut morbus recrudesceret. Imo brevi sanato vulnere chalybis usu perfecte convaluit.* Huic mulieri in Xenodochio decumbenti curationem adhibebat Astorius medicus, philosophusque doctissimus. De hydropicorum aqua universim sectione educenda videndus est *Mead monit. med. cap. 8.* & *Monro filius essai sur l'hydrops. §. 129. pag. 275. seqq.*

XXVIII. Neque podagra. Raro podagrica, chiragricaque vitia, vel castratos, vel pueros ante feminæ coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentare, *Celsus* annotat: quod etiam nostris temporibus verum est.

XXIX. Mulier. Vid. not. *aph. præced.* Defecerint. Adde: aut pauciora fluxerint. *Seneca epist. 95.* loquens de pueris, & mulieribus, dicit, eos ætate *Hipp.* magni, fuisse liberos à podagra, tempore vero suo passim laborasse, non quod natura esset mutata, sed quod mutati erant mores, scilicet excreverat mirum in modum luxus, atque intemperantia omnis vitæ. *Ex Mercur.* Sed *Seneca* cum scripsit: *passim*, ad mores, qui philosophus erat, respexit. *Celsus*, cum raro, scitius, eos his morbis dixerit laborasse, ad naturam, ut medicus. *Vid. aph. præced.*

XXX.

XXX. Puer podagra non laborat ante usum venerorum.

XXXI. Dolores oculorum vini meri potio, aut balneum, aut venæ sectio, aut medicamentum epotum solvit.

XXXII. Balbi à longo alvi profluvio maxime capiuntur.

XXXIII. Qui acidum eructant, non valde pleuritide corripiuntur.

XXXIV.

XXX. *Non laborat.* Nisi raro. *Vid. aphor. 28. & 29.* & nisi morbus hæreditarius fuerit, *Hollerius*, nisi que parentes lue venerea contaminati fuerint, *Heurnius*.

XXXI. *Vini.* Vinum convenit, ubi crassi, viscidique humores dolorem pariunt, calefacit quippe vinum, & discutit. At ubi in oculis est siccitas & squallor, ab eo prorsus abstinendum consilio *Ballonii*. *Balneum.* Hic agit potissimum de fotu, qui fit molli spongia, aut lintheolis ex aqua, aut lacte calidis, aut per æstatem egelidis, aut ex quoque alio humore expressis, & super oculos impositis bis, terque die, sepiusque etiam, si dolor urget. Præter oculos, caput quoque perfundi, ait *Celsus*, debere prius calida, deinde egelidas. *Medicamentum.* *Vid. aph. 17.*

XXXII. *Balbi*, sive eos intelligat *Hipp.* qui *trayloi, *blæsi dicuntur certas quasdam literas pronunciare nequeunt, sive qui *psolloi, *balbi nominantur literam, syllabamve omittentem in pronuntiatione vocum, sive demum qui appellantur *chnophoonoi, * qui inter loquendum hærent, titubantque, nec syllabam syllabænectere rite queunt; constat horum plerisque humescere linguam, & quibus lingua humescit, eisdem plerumque & alvus. *Liebaud*, & *Heurn.* Hinc mirari subest, Gorterum postquam observasset duos balbos alvo adstricta, cæteros quibus os humesceret, laxa, hanc incertam *Hippocratis*, vixque rei medicæ utilem, appellasse sententiam.

XXXIII. *Non valde.* Nempe ob ventriculi bonam concoctionem, cujus acidus ructus fere perpetuum indicium est, pleuritidis autem ab insigni sanguinis lentore oritur, quod ex sanguine misso in illo morbo notissimum est. *Lisperus l. c.*

XXXIV. Quicumque calvi sunt, his magnæ varices non fiunt. Quibus vero calvis varices magnæ superveniunt, hi rursus capillati fiunt.

XXXV. Hydrope laborantibus, tussis superveniens, malum.

XXXVI. Difficultatem urinæ, vena secta juvat; secare vero interiores.

XXXVII.

XXXIV. *Varices. v. aph. 21. VI. Non fiunt.* De veritate aphorismi post *Galenum* fere omnes dubitant interpretes, si de iis sermo sit calvis, quibus caput ætate nudatur. Sed verisimile est *Hippocratem* de iis fuisse locutum, quibus capilli propter morbum, quo capitis cutis affligitur, fluunt. Qui igitur huiusmodi calvitie laborat, ei fere magnæ varices non fiunt: acer enim, crassusque humor, quo varices excitantur, ad caput convertitur. Quod si is ipse humor, capitis cutem deferens, varices in cruribus, scrotoque creet, renasci quoque capilli poterunt. Nam ut varices maniam, *aph. 20.* & liguæ hæsitacionem tollunt, 2. *epid.* sic & calvitii causam auferre queunt. Raro tamen id accidere scribit post *Aristotelem Mercurialis*: annotatque hic, in concive suo restitutum fuisse capillitium hæmorrhoidum fluxu.

XXXV. *Malum.* Quin in hydrope inveterato, cuiuscunque generis is fuerit, tussis perseverans spem fallit, mortemque appropinquare significat. Idcirco lethale scribitur *aph. 47. VII.* *Hollerius* huic tussi observat præcedere magnam spirandi difficultatem. *Liebauus* non tam tussiculam hanc ait esse debere, aut ad tussendum propensionem, sed veram vehementem & difficilem tussim à materia in pulmone contenta. *Tussis vehemens*, perseveransque impetu suo hydropicum sine febre, firmisque adhuc viribus sedentem, & nec opinantem sustulit, nullo ex ore rejecto sanguine, nec aqua, nec pure ullo. Mulier tussi diu vexabatur arida, continentique. Hydrops inde ortus portenti instar tussim dispulit. Meminique virginis, cujus recentem hydropem consequebatur tussis sicca anhelata, vehemens, exporrigebaturque hæc usque ad solutionem hydropis, non tam copiosis urinis partam, quam humore sensim, diuque ex utero exstillante albo, crassoque.

XXXVI. *Difficultatem.* * *dysourieen*, * *dysuriam*, id est, dif-

XXXVII. Ab angina detento ; si tumor fiat in collo, bonum ; foras enim morbus vertitur.

XXXVIII. Cancros occultos omnes , melius est non curare ; curati enim cito pereunt ; non curati vero longius tempus perdurant.

N

XXXIX.

difficilem , & dolorificam urinæ excretionem. *Vena secta juvat.* Quum morbus à sanguine oritur exuberante , aut ab inflammatione vesicæ , vicinarumve partium, *Holler. ex Gal.* Valet etiam sanguinis detractio ad urinæ stillicidium, *aph. 48. VII.* urinæque suppressionem ab eisdem causis profectam. *Mirabilis est casus theologi cujusdam apud Tulpium lib. 2. cap. 43.* Huic urina quolibet ferme supprimebatur plenilunio , neque fluebat iterum , nisi aut luna declinante , aut secta brachii vena. *Interiores.* Cujusmodi est basilica in brachio , & saphena in pede ad malleolum. *Interiores.* Interiores ne , an exteriores venæ secantur , parum refert. Id nosse expedit , in nimia sanguinis multitudine , inque vesicæ , vicinarumque partium inflammatione , tensione , ardore secundam primo venam esse brachii , deinde eam , quæ in pede est.

XXXVII. Ab angina. v. præfag. Hipp. lib. 3. n. 17. seqq. *Bonum.* Utique si laryngem occupans inflammatio foras vertatur ex toto. Secus , ut plurimum lethale ; eo quia externus tumor ortus , interni magnitudinem , augmentumque significat ; uti anginosæ accidit 3. epid. recensitæ. *Bis & ipse observavi labra , collum , malas duplo majora , linguam vero quadruplo evasisse , ob vim inflammationis fauces occupantis : Ægrorum alter nona extinctus die est , alter undecima.* Utrique erat summa deglutendi difficultas , neutri spirandi maxima. Servantur igitur , quibus tumor obortus extrinsecus internam tollit , aut saltem minuit inflammationem ; ut si facilius spiret , deglutiat , minus febriat , minus doleat , minusque sitiât , nec tumor intro recurat , donec morbus ex toto desinat.

XXXVIII. Cancros. Cancer tumor est durus , renitens , inæqualis , dolorificus , oris prætumidis , lividus , venas fere nigricantes emittens , corporaque potissimum glandulosa occupans. *Occultos.* Id est , non ulceratos. *Martianus* interpretatur submersos , & ad superficiem parum elevatos : aut fortasse rectius dixeris immobiles , & subjectis , vicinisque partibus ni-

mium

XXXIX. Convulsio fit vel ex repletionem, vel ex inanitione; ita vero & singultus.

XL. Quibus dolor circa *hypochondrium* fit absque inflammatione, his febris superveniens morbum solvit.

XLI. Quibuscunque suppuratio in corpore existens non innotescit, his ob crassitudinem puris, aut loci non innotescit.

XLII.

mium adhærentes, qui nec ferro excindi, neque igne consumi ex toto possunt. *Non curare.* Id est, igne, ferro, & medicamentis corrodendi vi præditis, aut humectantibus, emollientibus, putrefacientibus. Adhibenda exsiccantia, & indurantia, si cultri aciem cancer respuat, quippe qui sit immobilis, nervisque & vasis adhærens sanguiferis, aut nobili cuipiam parti, quæ sectionem prohibeat. Mobiles vero, quique cellulari tantummodo insistant membranae, & nondum apertos cancrios (aperti enim vetustiores, malignioresque sunt) sectione ex toto esse auferendos, tum observata, tum ipse usus docet.

XXXIX. *Convulsio v. aph. 57. IV. Vel ex repletionem.* Repletionem, & inanitionem *Pitcarnius* quoque agnoscit pro solis convulsionum causis. Quippe irritationem ad repletionem refert, quod fluida corporis ad partem irritatam propellantur.

XL. *Hypochondrium.* Id est, regionem eam quæ à mucronata cartilagine utrinque ad illa usque protenditur. *Absque inflammatione.* Quum scilicet dolor ab humoribus gignitur crassis, frigidis, inertibus, flatibusve. Huc *aph.* refer 52. VII.

XLI. *Suppuratio.* Intellige pus in aliqua cavitate collectum.

Ob crassitudinem. Si intus in capite, intusque in pectore sit suppuratio, non tactu explorare, sed solummodo conjectura persequi per ea potes quæ habentur præfag. lib. 2. n. 52. seqq. & lib. 3. n. 12. seqq. sin intus gignatur in ventre, ex signis præfag. lib. 1. n. 53. seqq. propositis, & tactu quoque potes deprehendere. Hoc vero ex maxime dignoscuntur, quæ extra excitantur in corpore, modo ne id puris crassities prohibeat, aut ejusdem profunditas. Tumor enim, quæ suppuratus est, mollescit, acuiturque, in eoque fluctus inclusi puris percipitur, si alternis digitis, manuve præmitur, ac contrectatur idem. Nichil horum sequitur, quum pus crassius remotumque est. Omne porro crudum, subcrudumque pus crassius est. Sed & frigidi tu-

XLII. Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum.

XLIII. Quicumque lienosi ad dysenteria corripuntur longa, eaque in hydropem, aut lienteriam convertitur, moriuntur.

XLIV.

mores fere sunt duriores, quod sæpius materia melli adipi, seboque simili, quam pure repleantur. Interdum etiam cartilagine, ossa, tophi, lapidesque in eisdem gignuntur. *Pus in juvene quodam non deprehendebatur, quod supra costas spurias dexteri lateris delitesceret. Pleuram perripit pus acrius factum. Tandem sectus tumor est, erupitque pus prima vice ad uncias 30. sequentibus paullo minus. Verisimile est tumorem externum puris non plus se libra continuisse. Æger intra dies 50. ex toto convaluit. Statim atque sectus est, febris desit. Mirum neque tussi unquam laborasse, neque spirandi difficultate.*

XLII. Morbo regio v. aph. 62. IV. *Malum.* At si hepar propter scirrhum, aut inflammationem induruerit, plerumque lethale. Fere namque scirrhus in malum corporis habitum, atque in lethalem hydropem definit, interdum etiam corporis macie terminatur, inflammatio autem plerumque cita morte finitur. In hac, febris acuta est, ardensque, sitis inexplibilis, linguæ siccitas, dexteri hypochondrii tumentis, durique dolor ingens, lumborumque, ad humerum jugulumque sæpe perveniens, spiritus difficultas, tussis, singultus, vomitus. In illo nullus, aut certe obtusus dolor est, nulla febris, nec sitis, aut nonnisi exigua; respiratio post cibum, aut ex motu corporis difficilior, graviorque in opposito latere decubitus. *Vestali hepar virgini icterica tribus ab hinc annis sensim induruit. Febris cum horrore accedebat semel die. Sitis, cibi fastidium, vigiliæ nocturnæ, frequens hypochondrii dextri dolor, virium imbecillitas, corporis extenuatio. Videbatur morti proxima. Attamen vivit adhuc, nec vivit modo, sed etiam melioris est habitus, quamquam pedes tumeant, ægriusque moveatur. Illud mirum, ictericum morbum fere solum, nec quicquam emollitum hepar.*

XLIII. *Lienosi.* Qui lienem quoquo modo affectum habent. Fere enim magnum, ac durum habent, Hipp. de affect. & mali coloris sunt, & extenuantur, & cibos male coquunt; interdum etiam maculis, aut ulceribus scatent, flatibus vero semper abun-

XLIV. Quibus ex stillicidio urinæ ileos supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente fatis urina fluxerit.

XLV. Ulcera quæcumque annua sunt, aut diuturniora, os abscedere est necessarium, & cicatrices cavas fieri.

XLVI.

abundant, quorum alii cibos fastidiunt, alii vero avidius appetunt; alii laxam, alii adstrictam alvum habent, hique frequentius expuunt, ac mingunt. *Dysenteria.* v. aph. 12. III. *Longa.* Quæ ventriculi, intestinorumque robur evertit, quæ fluidorum vividiores particulas dissipat, solidorumque contractiones enervat. Quæ vero brevis est, salutaris esse potest, aph. 48. & *coac. n.* 295. *Lind.* nisi ab atra bile fiat, aph. 24. IV. nisi intestina exulceret, inflammetque, sed hujusmodi, qua humor omnis inutilis in lienem incumbens evocetur. v. cit. aph. 48. *Lienteriam.* v. aph. 22. III.

XLIV. *Ileos.* Obstructio est tenuis intestini peracuta, & dolorifica, nihil sinens deorsum descendere cum frequenti vomitione, aut vomendi desiderio conjuncta. v. aph. 10. VII. Fortasse hic loci *ileos* pro vomitu tantum accipitur. *Vesica calculo laboranti* mictio sensim minuebatur. *Siris* & ciborum averratio incresebant. *Febris* vix percipiebatur. Urgebant dolorifici vesicæ conatus. *Vires* deficiebant. *Celer*, & perquam exiguus erat pulsus, extrema frigescebant. *Pridie ante mortem* sopor. *Frequens toto morbi tempore vomitus* aderat. Cui urina contrahabatur in vesica, licet subinde tantum ejus fluere, quantum fere sani solent homines reddere; continens, vehemensque ei erat ciborum vomitus. Prescribebatur mercurii vivi potus ad eum sistendum. Secus ipse, vomitum curandum esse, dixi, urinæ detractio. *Nec mea me fefellit opinio.* Etenim immissa in vesicam fistula, dimissaque urina, continuo vomitus quievit. Ex quibus apparet affecta vesica, *Celsus* VII. 27. „ sæpe affici stomachum, cui „ cum eadem vesica quoddam consortium est.“

XLV. *Annua.* Scilicet quæ annum attingunt, aut excedunt; quo tempore non sanescunt, vel, si ad cicatricem perducantur, iterum aperiuntur, & recrudescunt. *Abscedere.* Id est, corrumpi: cujus signa sunt pus copiosius, tenuius, foetentius, ac lividius; fungosa, ac nigricantia labra ulceris, coeuntia sæpius, sed non coalescentia, oris color niger, aut lividus. *Est necessarium.* Non tamen semper, annotante Gortero.

XLVI. Qui gibbi cx altmate , aut tussi fiunt , ante pubertatem moriuntur.

XLVII. Quibuscumque venæ sectio , vel purgatio cum medicamento convenit , hos vere purgare ; vel venam incidere oportet.

XLVIII.

XLVI. Gibbi. Quibus spina dorsi admodum incurvatur , pervertiturque tam ad posterius , & anterieus , quam ad latera : idque sive propter tussim , aut asthma fiat , sive ob frigidos tumores , succosve crassos , & acres vertebrarum vincula obsidentes , laxantes , contrahentes , atque adeo vertebrae ipsas è sede dimoventes , & sensim etiam tussim , & spirandi difficultatem inducentes. Nam & gibbi , qui scapulas , alarum modo eminentes habent , * *eisi physoodees* * “ id est , ut ipse legerim , *anbelantes sunt , suspiriosque.* Epid. 6. *Ante pubertatem.* Tussis , & asthma , fere pulmonem laborare , significat. Hoc in pubertate incrementum capit : secus thoracis capacitas vix augetur , quod ejus detorta , perversaque ossa quamminimè crescant. Pulmo igitur per ea tempora plus laborabit , utpote in angustiiori spatio , segniusque humores in ejusdem vasis moveri , æquum est , & facilius coire. *Moriuntur.* Partim tussi repente suffocati , aut sputo sanguinis , partim pleuritide , aliisque acutis morbis rapti , partim hydropè aut phthisi consumpti. Post pubertatem orta gibbositas finito nimirum corporis incremento , licet cum tussi , & spirandi difficultate incidat , serius occidit. Præsertimque si aut ex casu , aut ex ictu oriatur , aut si ab internis causis sit genita , tussi tamen vacat , & spirandi difficultate. Plures enim horum non 40. modo , sed 60. & 70. quoque annum attingunt.

XLVII. Vere. Id est , veris tempore. Ergo si ad cavendum morbum , aut sanguinem ex vena detrudere , aut alvum medicamento ducere , aut utroque præsidio uti expedit , id vere faciendum ; quod vires corporis per id temporis valeant , quod ab externis injuriis minus sit timendum , quod fluida sint ad fluendum aptiora , solidaque ad eundem ipsa propellenda paratiora. „ Illud præterea est observandum in morbis qui redeunt „ certis intervallis , & anni partibus , & maxime à crassa materia , ut melancholia , & pituita ; quod non solum vere „ purgare convenit , sed etiam autumnò ad majorem cautionem. “ *Holler.*

XLVIII. *Lienosis dysenteria* superveniens, bonum.

IL. Quicumque morbi podagrici fiunt, sedata inflammatione, intra dies quadraginta finiuntur.

L. Quibuscumque præciditur cerebrum, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

LI. Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

LII.

XLVIII. *Lienosis. v. aph. 43. Dysenteria.* Videtur locutus hoc loco Hippocrates de ea dysenteria, quæ sanguinea nominatur, per quam sanguis sine intestinorum exulceratione dejicitur, brevique placatur; nam splenem evacuat. *Heurnius.*

IL. *Intra dies quadraginta.* Nisi tamen topi sint jam concreti; nisi peccetur à medicis, aut ægris, nisi materia sit valde crassa, & viscida; densum & durum corpus; calor nativus imbecillus. *Hollerius.*

L. *Præciditur.* Id est, profundum vulnus cerebro infligitur.

Vomitum. Vomitus, seu biliosus, seu pituitosus, seu vomendi desiderium in cerebri vulneribus statim plerumque incidere solet; tam fracto solum cranio, quam pertusis cerebri membranis, aut pericranio. In gravioribus cerebri vulneribus, contusionibus, & fracturis cranii præter vomitum, & vertiginem, casus quoque, aut vocis privatio, aut paralytis artuum sæpe observatur: in quibus febris postridie, aut 3. aut 5. accenditur die; in levioribus aut harum partium læsionibus, 7. 9. 11. 14. aut etiam tardius febris supervenit, & gravioribus accedentibus signis, quæ ante non fuerunt, plures intereunt.

LI. *Muti. * aphonous, * mutos,* intelligat Hipp. non modo voce privatos, sed etiam sensu, motuque carentes. *v. Gorraeus.*

Nisi febris. Quæ tamen acuta esse convenit, & satis vehemens, *Holler. coac.* non sic tamen, ut vires exsolvat. *Idem. l. c.* Neque febris longe à morbi principio accedat, sed statim atque is incœperit: nam quæ ulterius progressu morbo apparet, quæque ut plurimum lenta est, in ægri perniciem invadere, notat *Martianus 2. de morb.* idque & de hoc morbo, & de vera apoplexia verum esse solet.

LII. Oportet vero, & considerare oculorum in dormientibus suspensiones; nam si quid album commissis palpebris subinspicitur, neque ex alvi profluvio, aut medicamenti potione istud contingat; malum est signum, & lethale valde.

LIII. Desipientiæ, quæ cum risu fiunt, securiores; quæ vero cum studio, periculosiores.

LIV. In acutis morbis, qui cum febre sunt, luctuosa suspiria; malum.

LV.

LII. *Malum est signum.* Nisi sic dormire consueverit æger. *vid. præfag. lib. 1.* aut nisi diutius vigilaverit, aut longo itinere defatigatus fuerit, aut vehemens tristitia præcesserit, aut longa alimenti indigentia, aut alvi profluvium, aut immodica alia quælibet evacuatio, quæ sit sponte, aut arte excitata, *ex Holler. Lethale valde.* Non tamen sic ut nemo prorsus effugiat, nisi quoque alia signa concurrant lethalia.

LIII. *Desipientiæ.* Intellige deliria per febres hic loci, *Cardanum* si audias; sin *Hollerium*, deliria assidua sive cum febre fuerint, sive non. *Securiores.* Nisi tamen risus ex læso, inflammatoque diaphragmate contigerit. *v. Martianus. Cum studio.* Id est, cum labore, sollicitudine, cura, animi angore: * *spoudee*, * *ingens labor*, *Erotiano* audit ex *Homeri iliad. 15.*

Periculosiora. Quæ cum temeritate fiunt, periculosissima ait esse *Hollerius*. Furibunda, & lachrymosa deteriora iis, quæ cum risu fiunt, *Cardanus* agnoscit, minus, vero mala iis, quæ cum studio incidunt: viditque ex furiosa desipientia, plurimos evasisse febrientes, ex studiosa, paucissimos.

LIV. *In acutis.* Id est, in continuis, acutisque febribus. *Luctuosa suspiria.* Spiritum offendentem nominat *aph. 68. IV.* Respiratio est plorantium puerorum, respirationi perquam similis. Fit enim spiritu interrupto, subsistente interim thorace, deinde rursus id quod deest adjiciente, quam etiam *epid. 2. & 6.* intro respirationem vocat *Hipp.* veluti in superspirantibus. *ex Mercur. Malum.* Quippe, est motus quidam convulsivus, musculorum, qui movent thoracem: talis vero motus est convulsionis initium. Quare in acutis febribus, maxime si delirare etiam ægotantes cœperint, metum facit, ne homo cum convulsione moriatur. *Vallesius.*

LV. Dolores podagrici vere, & autumnō magna ex parte moventur.

LVI. In morbis melancholicis, ad hæc periculosi decubitus, stuporem corporis, vel convulsionem, vel furorem, vel cæcitatem significant.

LVII. Apoplexiæ autem fiunt maxime à quadragesimo anno usque ad sexagesimum.

LVIII.

LV. Vere. Deinde hieme, postremo æstate. *Holler. ex Aurelian.* Magna ex parte. Id quidem verissimum est, licet multis etiam hieme moveantur. *Equidem cum annos amplius triginta ex pedibus laborem singulis primis quindecim anno declinante torquebar, posterioribus vero aliis, cum & vesicæ morbis, & vertiginibus vicissim implicari cæperim, & serius & mitius, fere tamen semper hieme affligi soleo: neque nunc humor pedes tantum infestat, sed modo manum petit, modo humerum, & scapulam vexat. Dii faxint, ut parcat naso. Eo namque repens podagra, utique si antiqua fuerit, ut quisque suæ disponat domui, fere suadet.*




LVI. Melancholicis. Melancholici ii appellantur morbi, in quibus æger, aut sine febre delirat, aut diu, multumque, & sine causa manifesta, tristis, mæstusque ita est, ut vel amicos fugiat, & aversetur, ac taciturnior inde fiat. Sæpe etiam cibos male coquit, flatibus abundat, ventriculi tensione, dolore, pondereque tentatur, interdum & vomitu, vertigine, aurium sonitu, capitis gravitate, doloreque corripitur. Ei quoque alvus fere aut adstricta nimium est, aut fusa. *Ad hæc.* Id est, ad sequentes morbos proclivis est homo melancholicus. *Stuporem.* Id est, abolitionem sensus, & motus universi corporis, aut partis dimidiæ. *Convulsionem.* Morbus est, in quo modo totum corpus, modo pars ejus sine voluntate trahitur, aut tenditur, aut concutitur. Addunt & epilepsiam plerique. *Furorem.* Delirium nempe sine febre, tamen cum audacia, & furore conjunctum.

LVII. *Fiunt maxime.* Senibus apoplexiam familiarem esse, scriptum jam est 31. *aph.* III. dicitur enim senilis potissimum morbus, quemadmodum epilepsia puerilis. Verisimileque est hic loci locutum fuisse Hippocratem de ea apoplexia, quam melancholicus humor concitat, qui à quadragesimo ad sexagesimum ætatis annum magis abundat, uti pituita sequentibus

LVIII. Si omentum excidat, necessario putrescit.

LIX. Quibuscumque à coxendicum dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit, his mucrescuntur.

LX. Quibuscumque à coxendicum dolore molestatis diuturno excidit coxa; his crus tabescit, & claudicant, nisi urantur.



O


APHO-

annis, in quibus apoplexiæ, quas creat pituita, familiæres admodum sunt; fereque per hiemem. „ Juvenes apoplexiæ à sanguine crasso, aut multo, aut concreto, & grumoso, aut à vini liberaliore usu quovis tempore “ obnoxii sunt, *Liebauus* vere tamen potissimum. Qui consistentem ætatem degunt, & qui senes sunt virides “ nimirum à 40. ad 60. etatis annum, apoplexiæ à melancholico humore, vere, & autumnò, opportuni sunt. “ *Idem*.

LVIII. *Excidat*. Ut in vulneribus ventris. Si enim protinus non tridatur intro, brevi livescit, & corrumpitur omentum.

LIX. *Coxendicum dolore*. Nimirum *ischiadico*. *Excidit coxa*. Id est, si caput ossis coxæ excidat ex acetabulo, seu cavitare qua conditur, & rursus incidat; id est, acetabulo restituatur, id accidit propter mucum implentem acetabulum, coxæque ligamenta relaxantem.

LX. *Tabescit*. Id est, extenuatur, gracilescit. *Urantur*. Ustionis modum, quo veteres utebantur in morbis, describit *le Clerc. hist. med.* Recentiores præferunt emplastra discutientia, & resolventia; inter quos experientissimus est *Gorterus*.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO VII.

- I. **I**N morbis acutis , frigus partium extremarum malum.
- II. In osse ægrotante caro livida malum est.
- III. A vomitu singultus , & oculorum rubor , malum.
- IV. A sudore horror , non bonum.

V.

I. *Acutis.* Quos febris continua comitatur, ac vehemens. *Vid. aph. 48. IV. Extremarum.* Ut nasi , aurium , manuum , pedum. *Malum.* Præsertim si frigus perseveraverit cum æstu præcordiorum.

II. *Ægrotante.* Id est , carie , seu corruptione affecto. Sæpe , osse integro , livescit caro in tophis podagricis , & luis venereæ ; aliquando tamen etiam eodem corrupto. Quare oportebit , auctore *Hollerio* , tum cutem diffecare , & cauterio carnem urere usque ad os ; deinde deradere quidquid est cariosum in osse.

III. *Malum.* „ At hæc duo simul , non seorsim , si vomitus superveniunt in morbis acutis , & ad aliquod tempus perseverent , lethalia habenda sunt , quia inflammationem cerebri , vel ventriculi denunciant.“ *Liebauus.*

IV. *A sudore.* Sive statim horror sudorem excipiat , sive post duos , tres , pluresve dies in acutis morbis ; difficilem morbi solutionem indicat , cumque lethalibus signis , mortem.

Non bonum. Immo malum admodum , ut quidam cum *Mercuriali* existimant. „ Et certe “ is inquit „ ex iis qui referuntur in lib. epidem. horruisse , vel riguisse statim post sudores , complures interierunt.“ Crebra quoque horrescendi , & sudandi vicissitudo mala est iudicio. *Heurnii.*

V. A furore *dysenteria*, vel *hydrops*, vel *extasis*, bonum.

VI. In morbo diuturno fastidium cibi, & dejectiones sinceræ malum.

VII. Ex multa potatione rigor, & desipientia malum.

VIII.

V. *Dysenteria* v. *aph.* 11. III. *Hydrops*. Ecquis hic, *hydrops*, legerit? Bonum ne dixerit *Hippocrates* furori supervenire hydropem, si furor longe frequentius sanatur, quam *hydrops*? Ut jure conjiciam corrupta exemplaria, legendumque * *innos*, * *somnus*; non autem * *hydrops*, * *hydrops*: *somnus* enim etiam arte inductus sæpe furorem tollit. *Extasis*. Hoc loco pro taciturnitate sumitur, proque mentis abstractione à corpore, ei perquam simili, qua quidam capiuntur contemplantes cœlestia. v. *Gorterus*.

VI. *Diuturno*. Cujus principium scribit esse *Hollerius* diem 40. ut in longo alvi profluvio, in febre quartana, si æger qui prius appetebat, jam cibum non appetit, malum est. „ Post „ cupiditatem cibi“ ait *Celsus* „ postve longas febres, cibum „ fastidire, mali morbi signum est.“ Et dejectiones sinceræ. Hæ quoque etiam sine cibi fastidio malæ sunt. *Celsus*: „ malum est etiam, quod post febres longas sincerum est.“ Si vero dejectiones sinceræ, & cibi fastidium simul fuerint, longe pejus est. *Sinceræ*. Id est, meræ, ut cum flava bilis, aut viridis, aut æruginosa, aut nigra, aut etiam sincerus sanguis, aut pituita dejicitur. *Ballonius* sinceras dejectiones vocat, quum non admixta est serosa humiditas, quæ cuique humori inest.

VII. *Potatione*. Ex largiore potu non vini modo, sed cujuslibet inebriantis liquoris. *Rigor*. Sive inflexilem corporis duritiem intelligas, quam *Tetanus* Græci vocant (quidam enim ebrii moriuntur convulsi, *aph.* 5. V.) sive vehemens frigus cum universi corporis concussu, malus est rigor, ac presertim si delirium subsequatur. Nam si hæc duo simul ingruunt ex multo vini potu, metus est, ne non resipiscat, sed convulsus moriatur ebrius. *Valles*. Sed & rigorem ex ebrietate lethalem esse, nisi recalescat æger, observat *Hollerius*, *coac.*

VIII. A tuberculi intus ruptione exsolutio, vomitio, & animi defectio fit.

IX.

VIII. *Tuberculi intus.* Tuberculi intus rupti nomine debet internus quisque tumor intelligi, qui in pus versus est, ac subinde per se apertus. Quod enim hic dicitur * *phyma*, * *tuberculum*, alibi dicitur & frequentius * *empyema*, * *suppuratio*, vomica, abscessusque in suppurationem versus. *Exsolutio.* Est levis animi defectio. *Vomitio.* Ut vomitum ciere potest ruptus in ventriculo tumor, sic hunc sæpe movent animi defectiones. Idque haud raro evenit tum in sanguinis detractione de vena, tum in vulnerum medicatione. *Animi defectio.* Hanc excitavit ruptus affatim tumor externus, prope claviculam situs in filiola mea; ,, hancque commune symptoma puris eruptionum abscessus, suum sive externorum, sive internorum“ vocat *Liebauus*. A rupto abscessu purulento, raro hanc eandem incidere scribit *Gorterus*. *Tulpius* pulmonum vomica nec opinanti rupta, aut dictum & factum occidi hominem putat, aut lenta tabe consumi. Quæ ipse observavi de pulmonis vomica, quæ admodum crebro ibi est, hæc sunt. Cum vomica rumpitur, pusque in thoracis cavitatem evomit, fere neque animi defectionem, neque vomitionem facit. Horumque neutrum inter signa effusi puris reponit *Hippocrates in libris prænotionum*. Quum verò intus eadem in pulmone aperitur, pusque non in thoracem, sed in asperam fertur arteriam, sæpe sub ipsum puris sputum animus deficit, interdum etiam simul æger vomit. Quorum utrisque, & frigido sudore, sensuumque defectu, nec opinantem affectum nuper vidi hominem in templo quodam, qui ad se rediens, pus extusiebat sanguine perfusum, intermistis frustis fistulosæ materiæ, quæ cum veteribus quis facile dixisset tracheæ segmenta fuisse. Si vomica quæ ingens est, affatim rumpitur, tracheamque multo repente pure obruit, obstruitque, valde metus est ne stranguletur homo: quo pacto plures, qui catarrho suffocativo extincti dicebantur, jugulati fuere, quorum trachea pure plena, sectis cadaveribus, conspiciebatur, *Swieten*. Idem in virginis cadavere ipse deprehendi, quam capitis apostemate repente sublata affirmabant; quod pus ex ore, naribusque cadaveris manaret, quamquam vivens non capitis vitio, sed pleuritide laborasset. Si vero vomica, ingens licet, sic rumpatur, ut pus non confertim, sed pedetentim in tracheam feratur, tum hominem

IX. A profluvio sanguinis *delirium*, aut etiam convulsio, malum.

X. Ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio, malum.

XI.

tutatur, id est, metum suffocationis tollit, sic enim vertendum puto apud *Areteum pag. 38.* * *atreceei*; * cum alii sic affecti sanescant, alii progressu temporis, quemadmodum phthistici extingui solent, moriantur, alii etiam citius, si febris vehemens, si sudor multus, si difficilior respiratio est, è vita emigrent.

IX. *Malum.* Sæpe sine periculo delirant, & convelluntur mulieres hysterice morbis obnoxie, fluente ex utero, aut vena sanguine. Periculosum est delirium, eoque magis convulsio, *aph. 57.* IV. si sanguinis profluvium immoderatum fuerit, quodque pulsum, viresque exhauserit, cum extremarum partium frigiditate, visus, auditusque hebetudine, vocis exilitate, & pallore vultus. *v. aph. 56.* V. Raro autem, delirium sine præcedentibus, aut subsequenter convulsionibus fuisse concitatum, observavi, quibus interdum tum virgines, tum mulieres extinguebantur, fluxus licet sanguinis admodum minuere-
tur. Exitium clare prænunciant virium dejectio, pulsus celeres, atque imbecilli, frequens, aut tarda respiratio, frigus extremorum.

X. *Ab ileo vomitus.* In hoc morbo alvus adstringitur, ut nihil descendat, nisi forte liquida quædam, pauca, & serosa. Vomitus non semper adest, nisi cum perniciose ægrotat æger, *Galenus.* Contra *Ballonius* vix fieri putat volvulum sine vomitu, aut vomendi desiderio: neque funestum esse vomitum, nisi si stercoreis sit. *Hipp.* igitur aut de incipiente volvulo loquitur, qui fere adstrictionem ventris, doloremque prius parit, quam vomitum; aut puto, subaudiendum vomitum stercoreis, aut graveolentem, qui exitiosus est valde. Plerisque, postquam alvus per volvulum, aliquot dies adstricta fuerit, solvi copiosius solet, relevarique ipse sibi videtur æger, dum viribus fractis, singultiens, frigidumque sudans postridie moritur. Sic fidelissima mea periit conjunx, fœmellam enixa, septimo post partum die. Huic enim alvus per morbum adstricta, pridie quam moreretur, biliosis multis ferebatur, ex quo dolores levare, difficultas respi-

ran-

XI. A pleuritide, inflammatio pulmonis, malum.

XII. A pulmonum inflammatione, phrenitis, malum.

XIII.

randi minui, stercorisque vomitiones retardari videbantur. Sed viribus in singulas horas magis ruentibus, madore mortifero, levique desipientia accedentibus, fluente adhuc alvo, vomituque sublato, animam deo reddidit. Morbus uteri inflammatio fuit, quam volvulus consequebatur. Singultus. Ubi, intestino in scrotum illapso, infirmisque viribus, singultus & febris oritur, desperata res est; tumque, si vi reponatur intestinum, intra 6. aut 7. horas æger moritur. v. Holler.

XI. *Malum.* Id est, malus est transitus inflammationis, membranæ costas succingentis, pleuræ dictæ, in inflammationem pulmonum. Signa in plerisque sunt, si pulsus, qui ante durus erat, mollior fiat, si obtusior dolor est, si difficultas respirandi major, & sputum in pectore strepit, & facies rubicundior, & urina crassior ac flammea. Sive tamen hæc adsint, sive desint, qui pleuritide intereunt, si secentur, sic pulmonem læsum ostendunt, ut credas non pulmonem à pleura, sed hanc à pulmone solere corrumpi.

XII. *Phrenitis.* Morbus est, quo æger febrit, & continenter delirat. v. Celsus. Fallitur vulgus solos appellans phreniticos, qui febrientes vociferantur, & in alios insiliunt. Cæterum interdum etiam in hoc morbo, mens cum furore percellitur, sæpeque pus excreatur, ægro resipiscente. Peripneumonia laborans mulier quarta die morbi cœperat cum audacia delirare. Septima ad se rediit. Nona decessit. Quamdiu mentis fuit imposita, tamdiu dolorem non sentiebat, vix tussis aderat, vix respiratio à statu naturali recedebat. Nullum sputum. Delirio cessante, protinus dolor, tussis, difficultas respirandi exasperabatur, usque ad interitum. Expectandum porro delirium est, si dolor, cum sputis biliosis sine ratione evanuerit. Hipp. id est, si dolore sublato, aut admodum imminuto sine coctionis signis, sine ulla subsequente evacuatione, quæ morbum minuat, febris incrementum, sitis vexat, tussis perseverat, turbulentæ nocturnæque vigilæ urgent, spiritus difficiliter trahitur, urina tenuior fluit, sputumque parcius fertur, atque ægrius. *Malum.* Non tamen semper lethale, ut putat Liebaudius; delirium licet, quod pleuritidi, at peripneumoniæ superveit, sit cum furore

XIII. Ab æstibus fortibus convulsio, aut *tetanus*,
malum.

XIV. In capitis ictu, obtupescentia, aut desipientia,
malum.

XV. A sanguinis sputo, puris sputum, *malum*.

XVI.

& audacia conjunctum, modo vires consent, nec lethalia accedant signa. Nonnullos enim servatos fuisse memini, sputis putridis prodeuntibus, urinisque multis, aut crassiss.

XIII. *Ab æstibus*. Sive fortes uestiones sint externæ à sole, pharmaco, aut igne: sive sint febres, aut inflammationes: sive vulnera; si rectius * *traymasin*, * aut * *troomasin*, * legamus; aut ulcera, contusiones, & nervosarum partium fracturæ; convulsio, *aph. 57*. IV. aut tetanus, seu nervorum rigor, *aph. cir.* superveniens, non malum modo, sed lethale plerumque est.

XIV. *Obstupescencia*. Qua sensus, & motus percellitur, æger veluti mutus, immotusque, apertis manet oculis. *Desipientia*. Delirium quod non in absurditate tantum verborum, sed etiam in absurdis, inconcinnisque motibus corporis, & manuum gestibus consistit. *Malum*. Si in gravi capitis vulnere, fractura, aut contusione stupor, & delirium perseveraverint, lethale est.

XV. *A sanguinis, &c.* Qui è pulmone tussi spumans, & vividus ejicitur, aut dilatatis vasorum extremitatibus, aut disruptis, erosive vasis propter crassitiem, molem, aut acrimoniam feri, sanguinisque. *Malum*. Eo quia sanguinem, sive è pulmonibus, sive è thorace prorupisse significat; eoque proveniens, sputumque puris post se trahens, phthisis metum incutit. Aliquando tamen evenit, ut post sanguinis sputum, puris formam sputum induat: verum autem pus non est. Quippe & sine febre excreatur, & dolor abest, brevique una cum tussi conquiescit. Aliquando etiam post sanguinis sputum, pus exspuitur, febris aliquandiu perseverat, noctu increscens, & tussis, & lateris dolor adest, attamen non procedit ad phthisim, sed elapsis 20. aut 30. circiter diebus, morbus ex toto finitur. Quod si hoc temporis spatium tussis, puris sputum, febrisque pertranseat, & latus doleat, & difficilis sit tum respiratio, tum decubitus in latere alterutro, & calor ad vespervas acrior fiat, noctuque insudet, & emarcescere homo incipiat, maximum phthisis periculum est; præsertim si morbus aut hæreditarius
fue-

XVI. A puris sputo phthisis, & fluxus; quum vero sputum retinetur, moriuntur.

XVII. In hepatis inflammatione singultus malum.

XVIII. In vigilia convulsio, vel delirium malum.

XIX.

fuerit, aut eum invaserit, qui tabificum corporis habitum nactus est, nimirum gracilem cum scapulis alarum modo eminentibus, depresso angustoque thorace, tenui, longoque collo, itemque manibus.

XVI. *Phthisis*. Si modo nulla arte, pus queat educi, sanarique ulcus. Interdum consolidatur ulcus; sed non inde detrahitur recidivæ metus. *Fluxus*. Sive sit alvi fluxus, sive sudoris, sive, quod fortasse rectius, sputi purgatio; hæc enim * *rifs*, * significare potest. *Retinetur*. Aut certe, quum imminuitur, aucta difficultate spirandi.

XVII. *Singultus*. Potest singultus cum hepatis inflammatione conjungi, nec tamen ab ea proficisci. Ex inflammatione esse, è singultus perseverantia cognosces, inquit *Valles*. aliæ enim causæ prætereunt facile. *Celsus* scribit, adesse oportere frequentem singultum, & præter consuetudinem continuum.

XVIII. *In vigilia*. Ex vigilia, quæ acutis in febribus nocte dieque urgeat, quamque non dolor, non animi motus, nec externa quæque causa concitat. *Convulsio*. Quid sit, *vid. aph. 57. IV. Malum*. Propterea quod cerebri phlogosim, sive ardorem, significat, aut inflammationem. Scire porro expedit, vigiliam per acutas febres assiduam solere delirium accersere, præsertim si, *prorrhæ*. I. accesserit surditas, capitis dolor, & vomitus. Sæpe quoque tremores, & convulsiones invehit. Interdum ferinas phrenitides excitat, in quibus æger calcitrat, pedibus ferit, mordicus impetit, excandescit, & hostes quosque accedentes habet. In coma etiam, in quo homo profundo, ac diuturno somno premitur, interdum transit. *Vestalis virgo pridie hujus diei è febre acuta convaluit, quæ quamvis dies undecim, quibus febris maxime intendebatur, insomnes prorsus duxerit, nullo tamen delirio, convulsioneque tentabatur nulla. Desit die vigesima morbus. Maxime omnium profuit bilis, quæ infusis per alvum evocabatur, dejectio: nec præter vigiliam, aliud malum signum apparuit.*

- XIX. In ossis *nudatione* erysipelas.
 XX. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, *malum*.
 XXI. A forti in ulceribus pulsu, profluvium sanguinis.
 XXII. A ventris dolore diuturno suppuratio.
 XXIII. A dejectione sincera *dysenteria*, *malum*.
 XXIV. In ossis præcisione desipientia, si in vacuum penetraverit.

P

XXV.

XIX. *Erysipelas*. v. aph. 25. VI. Quidam codices habent * *cacoon*, * *malum*; quod Galeno, pluribusque aliis placet: quia ab influxu acrioris sanguinis, serique ægre caro gignitur, quæ os tegatur.

XX. *Putredo*. Si erysipelas ulcus excitet malignum, depascens, ichorem graveolentem fundens, aut pus moveat, malum est: nam sæpe fiunt febres acutæ, deliria, convulsiones, & gangrænæ partis affectæ.

XXI. *Pulsus*. Si arteriæ in ulcere, aut vulnere vehementer pulsent, quarum pulsatio, ante non percipiebatur, aut non ita fortis; profluvium sanguinis timeri debet, quod sæpe ægre sistatur. Hinc aliqua exemplaria addunt: *malum*.

XXII. *Ventris*. Ventris nomine, cavitas hic illa innuitur, spatiumque, quod est à mucronata cartilagine, costisque spuriiis, seu à diaphragmate ad ossa usque pubis, & coccigis. *Dolore diuturno*. Id est, ultra sexaginta dies extenso, præfag. 38. I. Hic igitur dolor, si fixus permanensque fuerit in quapiam ventris parte, in primisque præcordiorum, deinde ea, quæ supra umbilicum est, regione, *ibid.* n. 40. febrisque accesserit lenta, inæqualis, ac varia, Cardanus; maximeque cum frigore, horrore ad instar intermittentium; tumorque, & renixus ejus loci adsit, quem dolor vexat; suppurationem fere indicat.

XXIII. *Sincera*. Id est, sive intense flava, sive viridi, sive æruginosa, sive nigra, sive sero spoliata, quod ejusdem acrimoniam temperet. *Dysenteria* v. aph. 11. III. *Malum*. Etenim & humoris malitiam, pravitatemque significat; & vires, utique si persisterit, doloribus, vigiliis, cibique fastidio destruit.

XXIV. *Præcisione*. * *Diacopee*, * cranii præcisionem, fracturamque significat ad interiorem capitis cavitatem pervenientem, I. de vuln. capit. Si in vacuum. Quia vel membranæ cerebri, aut cerebrum ipsum simul læsum est; aut sanguis supra membranas tolligitur, qui easdem inflammat, & delirium movet.

XXV. Ex medicamento potione, convulsio lethalis est.

XXVI. In forti dolore *partium ad ventrem attinentium*, *extremorum* frigiditas malum.

XXVII. Mulieri utero gerenti, si tensio supervenerit, facit abortum.

XXVIII. Quando os, aut cartilago, aut nervus abscinditur in corpore, non augetur.

XXIX. Qui alba pituita detinetur, si fortis ventris fluxus supervenerit, à morbo liberatur.

XXX.

XXV. *Ex medicamento. v. aph. 1. V.*

XXVI. *Ad ventrem attinentium.* Puta, ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, pancreatis, renum, vesicæ, uteri, quarum dolor partium vehemens longe sæpius, quam cæterarum, quæ sitæ extra ventrem sunt, frigus affert extremorum, nimirum manuum, pedum, aurium, nasi, cutis denique universæ. *Malum.* Ex ventriculi, intestinorumque doloribus, ut sæpissime extremorum oritur frigus, sic quoque facile, aut eruptione flatuum, aut bilis vomitu, dejectioneque discutitur. Si autem non solvitur, nec dolor levatur, quamcumque demum partem occupet, eique febris cum rigore, horroreque accedit acuta, sitis vexat, internæ uruntur partes, externis frigidis, æger cum irrequieto decubitu vigilat, tensæque partes sunt, quæ acri, perpetuoque dolore afficiuntur; inflammationem lethalem subesse, significat.

XXVII. *Tensio.* Id est, tenesmus, sic dictus ab ea tensione, ob quam, quum cacare vehementer appetant, continue exsurgunt. Ob talem igitur tensionem, atque molestiam, & totum reliquum corpus laborat, sed præ cæteris matrix, quæ cognata est, & affinis intestino recto. *v. Galenus.* Affectus est intestini recti, gigniturque modo ab ulcusculis in eodem ipso factis, modo à viscidis, & acribus succis eidem impactis. *Facit abortum.* Scite *Liebautius*: abortiendi periculum minatur.

XXVIII. *Quando v. aph. 19. VI.*

XXIX. *Alba pituita.* Leucophlegmatia appellatur, hydrophisque species est, qua totum corpus intumescit. *Fortis ventris fluxus.* De eo, qui in longum tempus potrahitur, locutum *Philotheus* putat *Hippocratem.* *Mercurialis* censet, recentem hydropem alvi profluvio tolli, vetustum non nisi eodem ipso

mag-

XXX. Quibus in alvi profluviiis, excrementa spumosa sunt, his è capite pituita defluit.

XXXI. Quibuscumque febricitantibus, in urinis fiunt sedimina, veluti farina crassior, longam ægritudinem fore significat.

XXXII. Quibus autem biliosa sedimina, *sed supra tenuia*, apparuerint, acutum morbum significant.

XXXIII. Quibuscumque urinæ distantes sunt, his turbatio fortis in corpore fit.

XXXIV.

magno, & aquoso vinci. *Liebauius* fortasse rectius interpretatur *ex coacis* de alvi fluxu aquoso, qui cruditate vacet; id est, in quo cruda, & incocta non descendant ingesta, quique hydropes ineunte fiat. *Liberatur*. Hanc sententiam, ut facit *Hippocrates lib. de morb.* distinguit *Hollerius* his verbis. „ Si jam „ affectis viribus ægri, & præcipue visceribus, sequatur alvi „ profluvium, non tollet morbum, sed ægrum. At si morbi „ initio, & integris viribus, ac visceribus, sponte naturæ per „ turbetur alvus, liberabitur æger, vacuata scilicet materia morbi. „ Præstat quoque, naturam imitari medicum, ut si alvi „ ductione uti volueris, non id facias, nisi per hydropis initia, „ constantibus viribus, sanisque visceribus. *Vid. aph. 14. VI.*

XXX. *His è capite*. A succo nervoso acriori in capitis doloribus ad intestina delato, eorumque motum perturbante, spumosas dejectiones fieri, putat *Gorterus*.

XXXI. *Sedimina*. Si sedimina hordei tosti, ut *Foesius* exponit, non exacte moliti crassioribus frustulis similia fuerint; in febricitantibus cum virium infirmitate mortem, cum earundem robore, longitudinem morbi denunciant.

XXXII. *Sed supra*. Id est, quibus ea, quæ in urina refrigerata separantur, biliosa sunt, nimirum aurei, aut spicei, aut crocei, aut subrubri, aut citrini coloris, atque insuper tenuia, neque in fundo matulæ, sed in suprema parte apparent, acutum morbum significant. *v. Vallesius*.

XXXIII. *Distantes*. Id est, inæquales, divulsæ, diversæ, disparatæ, quum pars quædam cruda, quædam cocta apparet; aut quum urina variat in singulas horas, diesve. *Heurnius*.

XXXIV. Quibus in urinis, bullæ innatant, morbum renalem, & longum significant.

XXXV. Quibus insidens pingue, ac simul totum, his renum vitium, & acutum morbum adesse significatur.

XXXVI.

XXXIV. *Bullæ.* Spuma urinis innatans, non renum modo morbum, sed alios quoque significare, *Fernelius* annotat, *patholog. lib. 3.* Etenim urinarum spuma commune pluribus aliis morbis signum est, quod tandiu durat, quandiu & ipsa permanet. Impura quoque corpora, licet non ægrotent, nec febriant, sæpe hujusmodi urinas reddere cernimus. Crassities enim efficit urinarum, quominus inclusus aër se facile expediat. Quamobrem *Celsus*, dum bullas urinam habentem, velut signum renum morbi proposuit, cætera non reticuit, quibus audentius fidentum. *Et longum.* Rectius disjunctive, & ex græco textu, & ex ipso Hippocratis usu sic est accipienda sententia, ut diu in urinis spuma permanens, aut renum morbum indicet, aut longam ægrotationem; quam vel in febribus deprehendit *Gorterus*, in quibus urinæ spumam servantes excernerentur.

XXXV. *Quibus insidens.* Rectius: *quibus in urinis adiposæ superficies est, & conferta.* Talis urina, aut acutum renum morbum, aut simpliciter renum affectionem, vel acutum morbum, non renalem, significat. Nam eadem ipsa in phreniticis, colliquativisque febribus solet conspici, non minus, quam in iis, qui longis morbis contabescunt sine renum vitio. *Mercurialis*, ut nodum hunc solvat difficilem, tres ex *Actuario* pinguedinis differentias adducit „ aliam; quæ instar aranearum telæ super- „ fusa est, aliam, quæ est veluti guttæ dispersæ instar olei; „ tertiam, quæ est crusta quædam, qualis solet apparere in „ juribus pinguibus ubi refrigerantur “ tertiamque hanc putat, renum morbos, eosque acutos indicare. Quam cum ipse nullo unquam in morbo viderim, quasque vidi urinarum superficies adiposas, sine renum vitio sapissime viderim; suspicari non desino, an quemadmodum in *libro de urinis* Galeno adscripto, ubi hæc eadem reperitur sententia, legendum sit * *hypostasis*, * *subsidens*, quod placet quoque *Philotheo*; non autem * *epistasis*, * innatans; ut ubi in urina subsidet (idque per sæpe accidit) mucus quidam abrasam pinguedinem quodammodo referens, nedum renes laborare, sed vehementer, indicet. Et renum
quip-

XXXVI. Quibus autem morbo renali laborantibus prædicta accidunt signa, doloresque circa spinæ musculos fiunt, siquidem circa loca exteriora fiunt, abscessus quoque exterius futuros expecta; si vero dolores magis circa loca interiora fiant, etiam abscessus expecta futuros interius.

XXXVII. Quicumque evomunt sanguinem, si sine febre, quidem, salutare, si vero cum febre, malum. Curare vero acerbis, & refrigerantibus.

XXXVIII.

quippe pelvi abraditur mucus sæpius quidem à calculo, sæpe quoque ab acribus urinæ, serique, quod in sanguine est, particulis.

XXXVI. Quibus. Id est, *ex Mercuriali*, longo tempore, (cum id sit proprium affectuum diuturnorum, ut in abscessum convertantur) circa renes passis non solum antedicta signa in urinis contingunt, verum etiam circa musculos spinalis medullæ exteriores, fiunt dolores. Sed hic auctor connexionis, quæ in aphorismis rarissime occurrit, est nimium sollicitus. Certe hunc cum antecedenti minus recte connectit; cum in hoc ipso de longo renum morbo, de acuto in illo locutum putat Hippocratem. Exteriora. Id est, musculos lumbares externos. Abscessus v. aph. 31. IV. Interius. Id est, vel in ipsis renibus, vel in musculis internis lumbaribus, vinisque partibus. Ex istis externis abscessibus calculos quandoque prodiisse, quibus exemptis ulcus consolidatum, & ægrum sanatum fuisse, exemplis comprobatum est, sed raris. Beverovicus.

XXXVII. Evomunt. Idem hoc loco significare videtur *emeousi, *evomunt, atque *anaptyousi, *excreant, extus fiunt, ac *ptyousi, *spuunt, utique si ad locum, unde sanguis venit, referatur; nam coac. legimus: qui spumantem sanguinem vomunt, de pulmone vomunt, & aphor. 75. VII. à sanguinis vomitu, phthisis, & puris purgatio supra; libroque de morb. I. sæpe hoc ipso vocabulo puris, sanguinisve rejectio è pulmonibus indicatur; sin autem ad modum, id fortasse discriminis interest, quod *emeousi, *evomunt, significet sanguinem è pulmone acervatim erumpentem; *ptyousi, *autem spuunt, eundem ex eo ipso pedetentim effluentem, quod Martiano quoque placuisse videtur; probabileque ex iis est, quæ

de

XXXVIII. Destillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies.

XXXIX.

de morb. I. habentur, verbis: * hee aima emeoufi, hee ptyoufi, * aut sanguinem vomunt, aut expuunt, & infra: * ptyoufi aima: cai eniote cai emeoufi, * sanguinem expuunt, interdum, & vomunt. Salutare. Id est, minus malum est. Etenim minus periclitantur, qui sanguinem extusiiunt, si febre vacent, quam si ea teneantur, quo nihil est verius. Ideoque *coac. lib.* legimus: confert sanguinem spuētibus, ut sint sine febre, & tussiant, ac doleant leviter, & ut sputum tenue fiat (ipse * pachynethai, * crassescat, seu pituitosos fiat, verterim) ad dies bis septem: febrile vero, & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spuere, malum est. Cæterum ne is quidem, qui è ventriculo vomitu sanguis ejicitur, quod perraro proficit, salutaris dici potest, nisi si sanguinis è pulmonibus comparetur exitui. *V. Gorterum.* Malum. Non tamen lethale, ut putat *Martianus*; sunt enim qui effugiunt, *aph. 15.* Malum quidem est, eo quia loca unde sanguis fluit, inflammari significat, ex quo puris sputum fere oritur, sæpeque ulcus hominem consumens excitatur. *Acerbis, & refrigerantibus.* Distinguendum ex *Hollerio* est. Si id fiat vena aperta, curabitur adstringentibus, & austeris, si rupta glutinantibus, si exesa carnem gignentibus. Adstringentia porro summa cum cautione, nec nisi in maxima sanguinis eruptione usurpanda, quippe quæ nunquam fere salutarem effectum præstent, ut ex *Boerhav. & Burgrav.* colligimus.

XXXVIII. Destillationes. Id est, catarrhi pulmonem occupantes fere intra viginti dies concoquantur, purisque formam adepti fallunt suppurationis specie. Sic *Hollerius*, alique. *Liebautius* vero cum *Heurnio* intelligit pleuræ, pulmonumque inflammationem crisi discussam nulla, in pus verti solere fere intra designatum tempus, interdum etiam citius, tardiusque pro qualitate ejusdem materiæ. At enim non est necesse, *Valles. de acut.*, ut qui suppuratione laborat, pleuriticus fuerit, aut peripneumonicus: fieri enim potest suppuratus ob redundantiam excrementorum, quam intemperantia victus pepererit. Cujus speciem proponit *Hipp. de morb. I. 10.* cum inquit: *Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet,*

XXXIX. Si quis sanguinem minxerit, & grumos, & stillicidio urinæ laboret, & dolor inciderit in *femen*, & imum ventrem, pectinemque, *quæ* circa vesicam sunt loca, male se habere significatur.

XL. Si lingua repente incontinens fiat, aut aliqua pars corporis stupore elanguet, tale est melancholicum.

XLI. Si senioribus supra modum purgatis, singultus supervenerit, non bonum.

XLII.

cujus signa sunt tussis, febris, gravitas in pectore, dolorve ante & retro, difficilis spiritus, puris exspuitio, cibi fastidium, aliaque hujusmodi.

XXXIX. Si quis v. aph. 80. IV.

XL. Repente. Extemplo, sine causa manifesta. *Incontinens*. Id est, infirma, incerta, titubans, balbutiens. *Stupore*. Id est, siquæ pars motum, aut sensum, aut utrumque amittat sine causa manifesta, ut compressione, stupore in crure à calculo, frigore suscepto, &c. v. Jacot. coac. *Melancholicum*. Signum est gigni morbum à succis crudis, crassis, tenacibus, atrabiliaris, unde apoplexiæ est metus, aut epilepsiæ, aut memoriæ lapsus, præsertim si dolor capitis, aurium sonitus sine febre, aut tenebricosa vertigo adsit, coac.

XLI. Singultus. Singultum nimia purgatione ortum, malum esse vidimus aph. 4. V. at in senibus lethalis singultus, ac plane funestus habendus est, notante Liebautio. Notat Gorterius, „ omnes species convulsionis, ut est singultus, periculosiores „ esse in senioribus, quam junioribus, & omnium minime periculosas in infantibus, & pueris.“ Dentientes tamen puerulos convulsionibus jugulari, utique si eos sine intermissione vexarint, sæpissime cernimus; quin mihi, nonnullos, vel uno die interemptos fuisse, constat: *inter quos filiolum meam undecimæbrem fuisse doleo, nomine Juliam*. In acutis quoque febribus, quæ quia variolas consequuntur, aut iis exsiccatis, decidentibusque permanent, *secundariæ* nuncupantur, convulsiones ortæ plerumque occidunt pueros; ii licet ipsi longe minus, quam grandiores, si per acutas alias febres in convulsiones incidant, periclitentur. Eadem est delirii, & stridoris dentium ratio. Cæterum convulsiones, quæ erumpentes præcedunt variolas, sæpe his erumpentibus solvuntur; desinuntque sæpe etiam quæ excitantur à variolis, quasque gignit terror in pueris.

XLII. Si febris non ex bile *dependeat*, multa aqua calida capiti superinfusa, solutio fit febris.

XLIII. Mulier ambidextera non fit.

XLIV. Quicumque suppurati uruntur, vel secantur, si pus purum fluxerit, & album, evadunt; si vero subcruentum, fœculentum, ac fœtidum, pereunt.

XLV.

XLII. *Non ex bile.* Quales sunt diariæ febres, atque hecticae simplices, non autem putridis conjunctæ febribus; synochæque non putridæ. Putridas vero non juvat calida, nisi vacuata, vel concocta putredine. *v. Hollerius.*

XLIII. *Ambidextera.* Id est, quæ utraque manu, tamquam dextera, utitur, quasi utrinque sit dextera. *Non fit.* Plato tam mares, quam feminas genitos asserit ambidexteros; sed nutrices sinistræ manus usum infantibus denegasse solitas. Inveniuntur tamen quotidie mulieres, quæ sinistris manibus melius valent, quam dexteris. *v. Mercurial.*

XLIV. *Quicumque suppurati.* Empyi, id est, suppurati proprie sunt, qui inter pulmonem, & thoracem pus habent. *Philoth. aph. 27. VI. Uruntur, vel secantur.* Nimirum ad pus educendum, quod quidem, ut facilius evocetur, fieri sectionem oportet inter secundam, & tertiam, vel inter tertiam, & quartam costam earum, quæ spuria appellantur, spinamque propius, qua thorax protenditur. *Purum.* Quod nulli diverso humori, aut excremento permixtum, sed merum, sincerumque sit. *Album.* Adde ex Hipp. læve, æquale, & sine fœtore, aut certe quam minimo. Fœtorem quippe damnat vehementer *Hippocrates* in pure, vomitione, sputis, aliisque excrementis. *Evadunt.* Intellige plerumque *ex II. de morb.* Si quis autem servandus est, is hercle est, cui mature sectione succurritur. *Vallesius* secandum ait esse, statim atque pus in thoracis cavitatem eruperit. *Heurnio* sufficit, ut ante 40. diem secetur empyus, ob idque fortasse, quia *post illud tempus*, ut ait *Hollerius*, *pus mora longiore, pulmones erodit, & tabem facit.* Jacotius ex Hipp. quam citissime sectionem vult fieri, sed non ante 14. diem. *Épidem. VI.* legitur, tabescentes statim uri debere, sed nescimus, an tabescentium nomine intelligantur empyi, aut ex his ii, qui elapsis 40. diebus tabescere incipiunt. *Boerhaavius* pus statim educendum esse præcipit per os, per urinam, perque

XLV. Quorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit, & album, evadunt; in tunica enim his pus continetur; si vero qualis amurca fluat, pereunt.

Q.

XLVI.

lateris apertionem. *Swieten.* denique post 4. aut 5. diem, puris evacuationem non moliente natura, cogitandum esse scribit de sectione thoracis, quo salutariter ea succedat. Veruntamen perdifficile est secandi tempora definire, cum & puris inclusi qualitas, quantitasque ignoretur, & nesciatur, an natura ipsa per se citius, aut tardius, perfecte, an imperfecte per excreationem, aut per urinam, aliamve demum viam pus queat emittere; suffecturæque sint ægri vires, nec ne, donec pus de latere repurgetur. Illud affirmari potest, sic lente festinandum in hac ipsa re, ut neque per initia ruptionis, ut *Vallesius* existimat, secemus (nisi si ex multa puris collectione, nulloque puris, aut exiguo, difficilique screatu sic difficulter spiritus trahatur, ut suffocari æger queat) neque sectionem, si hæc eadem pericula immineant, ad 40. diem usque protrahamus. *Pereunt.* Limosum, & olens pus si effluerit, ut plurimum mori ægrum in coac. scribitur; quod ustione quosdam evadere, compertum haberet Hipp. in diuturnis etiam thoracis ulceribus, ut alibi ostendit. *Jacotius.*

XLV. *Suppuratum.* Tumore, inflammationeque affectum hepar periculum proximæ mortis affert. Si vero post 20. diem tumor febrisque permaneat, *prænot.* I. eaque cum horroribus occupet, *Areteus*, modoque finiatur, modo intendatur dolor, *Celsus*: suppurationem movere solet. *Uruntur.* Ubi exortus in hepate abscessus est, siquidem is extra vertatur, tumor dextera parte sub costis est, mollescens, fluctuantque, *aph.* 41. VI. in eoque ab abscessu musculorum ventris differt, quod in hoc dolor ad jugulum, humerumque summum pervenit, & tussis sicca non admodum crebra sæpe est, difficilisque post cibum respiratio, inque eo ipso tumore jecoris circumscriptio, & fines patent. v. *Celsum*, & *Areteum.* *Purum.* Tumore igitur suppurato, apertoque, sive scalpello, *Celsus*, sive candenti feramento, *Areteus*, si ex eo feratur pus purum, & album, salus ei facilis, inquit *Celsus.* *Areteus* addit: concoctum læve, & * mee cacoothes * minime olens, uti emendavit post *Mercur.* *Petitus.* Signum quippe est, suppurationem non consistere nisi

in

XLVI. Dolores oculorum, post meri potionem, & aquæ calidæ balneum, venæ sectione curato.

XLVII. *Hydrope* laborans, si à tussi habeatur, desperatus est.

XLVIII. Urinæ stitilicidium, & mingendi difficultatem, vini potio, & venæ sectio solvit; incidere autem interiores *venas*.

IL. Ab angina *detento* tumor, & rubor in pectore superveniens, bonum; *foras* enim vertitur morbus.

L. Quibus cerebrum sphacelatum, id est corruptum est, in tribus diebus pereunt; si vero hos evaserint, sani fiunt.

LI.

in hepatis membrana, aut, quod summum est, in superficie ejusdem. *Amurca*. Fex est olei. Si vero pus exeat, qualis amurca, id est, cœnosum, fœculentum, aut viride, fœtidumque, fere pereunt. Cruentum quoque reddi, mortiferum est, *Arctæus*. Pus enim hujusmodi, interiora hepatis corrupta fuisse, significat. Servatam vidit matronam *Gorterus*. *Heurnius* refert, vidisse se jecur in pus versum, membrana ejusdem intacta, ac integra. Notat agrum non ardentem febricitasse, neque multum doluisse, interdum in animi deliquium incidisse. Ipse duos periisse inemini, quibus ex prægrandi abscessu secto, pus flueret cœnosum, viride, fœtidum. Situs tumoris erat in altero quidem in musculis jecinori superpositis, in altero lienis.

XLVI. Dolores. Indignum Hipp. aphorismum sunt, qui censent: at Hipp. solebat venæ sectioni fomentum præmittere. *v. lib. de rat. vict. acut. v. quoque aph. 31. VI.*

XLVII. *Hydrope*. *v. aph. 35. VI.*

XLVIII. *Mingendi difficultatem*, *v. aph. 36. VI.* *Vini potio*. Vinum convenit cum hæc passiones proveniunt à vesicæ algore, vel à viscida, vel flatulenta materia. *Heurnius*.

IL. *Bonum*. Dummodo febrim, spirandi, deglutiendique difficultatem, & dolorem imminuant: contra malum. *Vid. aph. 37. VI.*

L. *Sphacelatum*. Rectius: quibus cerebrum dolore vehementi, aut convulsione, aut inflammatione affectum est. Legatur *Galen. de varia * tou sphacelou, * sphaceli* significatione, 2. de loc. aph. & *Ballon. defn. med.*

LI. Sternutamentum fit ex capite, calefacto cerebro, aut humefacto eo, quod in capite est, inani spatio. Aer enim intus contentus, foras erumpit. Sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus.

LII. Quicumque hepar circumdolent, his febris superveniens solvit dolorem.

LIII. Quibus à venis sanguinem mittere confert, his vere venam oportet secare.

LIV. Quibus inter ventriculum, & diaphragma pituita reposita est, & dolorem affert, non habens exitum per alterutrum ventrem; his, per venam ad vesicam pituita versa, solvitur morbus.

LV. Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, his venter aqua repletur, & moriuntur.

LVI.

LI. Sternutamentum. Perperam veteres arbitrabantur inane, quod est in capite, spatium, nimirum cerebri ventriculos, expurgari per nares.

LII. Quicumque. v. aph. 40. VI. Interdum etiam ingens dexteri hypochondrii dolor solvitur, ictero superveniente. Idque quinquies observabam. Dexterum hypochondrium vehementer dolet, tumetque. Venter inflatur cum murmure. Alvus adstringitur. Clysteres, aut retinentur, aut nihil educunt. Cibi adest fastidium. Rari insunt vomitus. Homo jaetatur, sititque. Urina coloratior est. Febris tamen est perquam exigua. Tertio demum, quartove morbi die, urina croceo colore imbuitur, cutisque universa flavescit, alvi excrementa flava descendunt, continuoque dolor, ac reliqua signa ex toto finiuntur, flavusque etiam cum urina, tum cutis color intra 14. dies evanescit.

LIII. Vere. v. aph. 47. VI.

LIV. Inter ventriculum. Id est, posita inter peritonæum, & omentum post diaphragma. Holler. Omentum pituita impletum intelligit Gorterus, quæ ex vena epiploica in venam portam, indeque in cavam, tandemque in renes per arterias derivatur, morbumque solvit.

LV. Hepar. Fortasse vesicæ aqua plenæ, hydatides dictæ, in hepatis superficie, aquam in ventris cavitatem disruptæ effundunt, unde hoc impletur. Moriuntur. Etiam si secetur venter,

LVI. *Anxietudo*, oscitatio, horror, vinum *pari aquæ portione* potum, solvit ægritudinem.

LVII. Quibus in urinario meatu tubercula fiunt, his suppuratione facta, & eruptione, solvitur dolor.

LVIII. Quibus cerebrum *externa* aliqua causa *vehementer* concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri.

LIX. Corporibus carnes habentibus humidas, famem adhibere convenit: fames enim corpora ficcet.

LX.

ter, aquæque educantur, tamen moriuntur, utique si hydrops ex hepatis, viscerumque cæterorum vitio oriatur insigni; cuiusmodi obstructio est inveterata, tumor, scirrhus, calculus, & similia, quæ his sunt. Quippe rursus iis venter aqua impletur, & pereunt. *Vid. aph. 27. VI.*

LVI. *Anxietudo*. * *Alycee*. * Anxius is dicitur, qui nescit stare loco, seque ipse continenter jactat. Sed etiam anxius appellatur, qui iners, sibi ipse gravis est, quemque pandiculatio crebro corripit. Hunc igitur, quemadmodum etiam oscitantem, ac horrescentem juvare epotum vinum potest, corporis firmando solida, crassos humores attenuando, hærentesque solvendo, ac discutiendo. *Horror*. Est, quum corpus totum leviter intremat cum frigoris sensu. *Pari aquæ*. De vino meracioris, non autem de diluto pari aquæ portione, ut in *aph.* legitur, putat *Holler*. locutum *Hippocratem*.

LVII. *Quibus. v. aph. 82. IV.*

LVIII. *Concussum*. Ut si quis ab alto in caput ceciderit, aut id parieti, aut pavimento alliserit; aut percussum fuerit caput obtuso telo, lapide, ligno, quod contundat. *Mutos fieri*. Id est, sine sensu, voce, & motu: donec præcedenti levi quodam delirio quidam ad se redeunt, quidam attoniti, & soporati moriuntur. *v. Liebaud*.

LIX. *Famem*. Fames multo tutius, ac securius corpora ficcet humida, quam quodvis aliud auxilii genus. *v. idem*. *Convenit*. Modo ne fuerint picrocholi. Hi autem sunt, quorum ventriculus acribus, rodentibusque scatet humoribus, qui nisi cibo frenentur, plerumque ventriculi, intestinorumque dolores, ac morsus, vomitumque, atque animi defectionem movent. Sic pueri, quia multum coquant, *I. aph. 13. seq.* sic qui hypochondriacis morbis tentantur, mulieresque hysteri-
im-

LX. Ubi in toto corpore mutationes *fiunt*, & si corpus refrigeratur, & rursus calefiat, aut colorem alium ex alio commutat, longitudo morbi significatur.

LXI. Sudor multus calidus, vel frigidus semper fluens, humorem *exuberantem purgari*, in robulto quidem *supra*, in debili vero *infra*, significat.

LXII. Si quis cibum febricitanti dederit, ut sano robur, sic *febricitanti* morbus.

LXIII. Quæ per vesicam excernuntur, inspicere oportet, si talia sunt, qualia sanis excernuntur. Quæ igitur minime similia sunt his, hæc morbosiora: quæ vero sunt sanis similia, hæc minime morbosa.

LXIV. Et quibus dejectiones, si *residere* permiseris, & non moveris, veluti strigmenta *subsident* (& si pauca, paucus est morbus, & si multa, multus) his confert

implicitæ, sive ob pravorum succorum, acriumque redundantiam, sive ob nervorum infirmitatem, famem fere vix sustinent.

LX. *Ubi v. apb. 40. IV.*

LXI. *Semper fluens.* A succorum copia, non ubertate ciborum existimat *Heurnius*; forasque erumpit in morborum initio, augmento, progressu non modo acutorum, sed & diuturnorum, *Liebaux*. Contra *Gorterius* locutum putat Hippocratem de sudore sine febre, vel prægressa, vel conjuncta. *Supra*. Id est, vomitu: dummodo tamen humoris qualitas, ægri temperamentum, ætas, regio, annique tempus id patiantur. *Infra*. „Si „ corpus simul extenuetur colliquatis humoribus, hoc corpus “ inquit *Gorterius* „ neque ferret purgans *infra*, neque vomitorium, sed per stomachica amara, & *putredini adversa*, „ tota curatio esset absolvenda.“

LXII. *Febricitanti.* Intellige, in accessionibus, aut incrementis febrium. Nam si cibum intelligas copiosorem, aut solidiorem, qualem assumere sani solent; talis cibus nullo tempore febrienti prodest, immo semper lædit.

LXIII. *Quæ per vesicam.* Nimirum consideranda urina est, si talis sit, qualis in sanorum corporibus excerni solet.

LXIV. *Veluti strigmenta.* Dejectiones crassæ, & ramenti, seu strigmentis, refertæ, difficilem morbi solutionem indicant,

fert alvi purgatio : quod si , alvo non purgata , dederis sorbitiones , quanto plures dederis , tanto magis nocebis.

LXV. Quibuscumque inferius cruda dejiciuntur , ab atra bile sunt ; si plura , *major* ; si pauciora , *minor est morbus*.

LXVI. Excreationes in febribus non intermittentibus lividæ , *cruentæ* , biliosæ , & fœtidæ , omnes malæ. Quum vero bene excernuntur , bonum est ; & per *alvum* , & per vesicam. Et ubi aliquid secedens iteterit non purgatum , malum.

LXVII. Corpora oportet , ubi quis purgare voluerit , fluida facere ; & si supra , filtere alvum ; si vero infra , humectare.

LXVIII. Somnus , & vigilia , utraque modum excedentia , morbus.

LXIX. In febribus non intermittentibus , si exteriora frigent , interiora uruntur , & *sitis detineat* , lethale.

LXX. In febre non intermittente si labrum , aut nasus , aut oculus , aut supercilium pervertatur ; si non videat , si non audiat , & jam debilis sit , quidquid horum fuerit , mors prope est.

LXXI.

& corporis purgationem desiderant. *Sorbitiones*. Id est , victus , qui nullus , aut certe tenuis , & parvus esse debet ante corporis expurgationem.

LXV. *Quibuscumque*. Fortasse hic *aph.* descriptus est , sed mendose , *ex lib. de judicat.* unde *antecedens* quoque videtur desumptus. Ibi autem habetur hujusmodi : „ quibus in inferma „ per alvum defectione bilis atræ quid subest , si copiosius , *ma-* „ *jor est morbus* , si parcius , *minor*.“

LXVI. *Excreationes. v. aph. 47. IV. Et per alvum*. Id est , similiter etiam dicendum de defectionibus , & urinis. *Et ubi*. Id est , quod si aliquid , quod vacuandum est , non excludatur , malum est ; nam recidivam solet facere.

LXVII. *Corpora. v. aph. 9. II.*

LXVIII. *Somnus. v. aph. 3. II.*

LXIX. *In febribus. v. aph. 48. IV.*

LXX. *In febre. v. aph. 49. IV.*

- LXXI. A pituita alba, *hydrops* supervenit.
 LXXII. Ab alvi profluvio, *dysenteria*.
 LXXIII. A *dysenteria*, *lienteria* supervenit.
 LXXIV. A corruptione, abscessus ossis.
 LXXV. A sanguinis vomitu phthisis, & puris purgatio supra.

LXXVI.

LXXI. *A pituita alba*. Id est, à tumore aquoso universali corporis, fere quoque venter intus aqua intumescit, nisi humor iterum absorbeatur noxius, aut natura eum, vel medicus dissipet per halitum, aut sudore discutiat, urinisque multis, & aquosis dejectionibus. *Vid. aph. 29. VII.*

LXXII. *Dysenteria. v. aph. 11. III.* Notat *Hollerius*, non ab omni alvi profluvio dysenteriam fieri, sed à diuturno, & bilioso. Diuturni *Celsus* meminit his verbis: *post alvi longam resolutionem, tormina concitantur*. Dysenteriam porro tormina, appellat, quoniam vere sub illa ægritudine homines ab acerrimis cruciatibus torquentur “*Mercurialis*.”

LXXIII. *Lienteria. v. aph. 22. III.* Tum solummodo lienteria, dysenteriae supervenit, quum in longa dysenteria fractum fuerit robur ventriculi, & intestinorum, sic, ut hæc cibum perliquidum, incoctum, albicantem elabi sinant.

LXXIV. *A corruptione*. Id est, sphacelismo, sideratione. Lividus est in gangræna color, & sensus hebes: in sphacelo nullus est sensus, & color carnis niger est. Os sphacelatum lividum, nigrum fit, & molle. Dubium est, an *Hipp.* dixerit, os abscedere, seu separari, cum sphacelatum fuerit; an vero cum sphacelata solummodo caro fuerit, quæ os ambit. De profundo carnis sphacelo *Gorterus* exponit: quod quum accidit, totam partem esse amputandam monet, etiam si os satis stabile videatur. *Galenus* verum esse *aph.* & de corrupto osse, & de corrupta solum carne, quæ os circumstat.


LXXV. *Vomitu*. Id est, rejectione sanguinis multi è pulmonibus. „Perpetuum autem non est“ inquit *Liebauus*, „ut ex multa sanguinis rejectione è pulmonibus, tabes sequatur, & puris sputio. Novi enim quibus jam à multis annis sanguis, multus interdum tussi rejicitur, nec inde emaciantur, statim adhibitis auxiliis, quæ sanguinem retineant, venam adstringant, febrem, atque inflammationem prohibeant.“ Id quoque

LXXVI. Qualia fuerint vesicæ, aut alvi excrementa, & ex carnibus; & sic, ubi *alias corpus à natura recesserit, spectare oportet; nam si parum, parvus est morbus, si multum, magnus, si valde multum, lethale est.*

APHO-

que ipsum à me observatum est haud semel. *Vid. n. aph. 15.* Expui quoque potest spumans ab hepate sanguis, si dexterum doleat hypochondrium, *coac.* idque fere sine tabis periculo accidit: mors vero inde hepate admodum vitiato evenire solet (exempla *Martianus*, & *Duretus* habent) interdum etiam critice per os sursum effertur, tum ex hepate, tum ex liene, atque etiam ex utero. *Vid. Jacotius, coac.* Rarus tamen adeo hic casus est, ut de eo dubitet *Hollerius*, ratus, posse eodem tempore, & dolere hepar, & irritari pulmonem. Constat præterea ex *Rhodii*, *Vedeliique* observatis, interdum sine ulla tussi rejici è pulmone sanguinem; interdum etiam, scribente *Villifio*, tali impetu copiaque ferri, ut is evomi potius, quam extulsiri videatur. Facileque hujusmodi vitia solere reverti, malignoque ingenio esse prædita, *Areteus* tradidit. Nam ne phthisim quidem, auctore *Tulpio*, æque celeriter inferunt; quippe eandem interdum non ante decimum, vigesimum, & trigesimum annum acciverint. Aliquando etiam nimia sanguinis profusio hominem extemplo rapit, quod jam à *Paulo* notatum, recentiorum observationibus confirmatum esse scimus. Ipseque, *quamvis qui animam cum sanguine vomuerit nullum viderim, vidi tamen, qui postridie quam sanguinem effudisset, suffocatus interiit: ut crediderim hominis mortem non tam rejecti quantitati sanguinis, quam ejusdem in bronchiis coitui esse adscribendam.* Pridie ante mortem sublimis fiebat respiratio, exiguus, imbecillusque pulsus, & sudor frigidus. Secto cadavere, subniger pulmo deprehendebatur, durus, ac admodum tumens. In aquam demersus fundum petebat. Serum rubellum haud modicum in dextera thoracis cavitate delitescbat.

LXXVI. Ex carnibus. Id est, sudores. *Alias.* Id est, aut alia in examen vocanda, ut actiones læsæ, qualitas mutata corporis in colore, caractere, & mole, *Heurnius*; aut sputa quoque perpendenda, & quæ ex naribus, auribus, oculis feruntur excrementa, si qualitate, quantitate, exeundi modo, & tempore, sanorum excrementis respondeant.



APHORISMORUM HIPPOCRATIS

SECTIO VIII.

I. **Q**ui supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non fere sanescunt, minus enim periclitantur, quibus morbus, & naturæ, & ætati conveniens accedit.

II. Quibuscumque in morbis, oculi ex causa illacrimant, bonum; *quibuscumque* autem sine causa, malum.

III. Quibuscumque in quartanis febribus, sanguis è naribus defluxerit, malum.

R IV.

I. *Phrenitici.* Phrenitis, quæ proprie consistit in inflammatione membranarum cerebri cum acuta febre, & delirio, magis familiaris est juvenibus, quam viris; ideoque in his difficillime solvitur. *Minus enim. v. aph. 34. II.*

II. *Quibuscumque v. aph. 52. IV.*

III. *Malum.* Intellige: *plerumque*; sanatum quippe sciimus *Alpinum* ingenti de naribus, ut credere convenit, profluvio sanguinis. *v. Ejusdem lib. de præfag.* Solvi quoque quartanam febrem hæmorrhoidibus, largaque hæmorrhagia, apud *Cleinium* legimus. Contra *Gorterus* affirmat, se nunquam his sublatam observasse quartanam; sed qui multum sanguinis effuderunt, in hydropem incidisse. Paroxysmos quoque vidisse subinde mitiores, sed diutius durantes, & periculosiores, ut quartana vehemens videretur commutata in mitiorem, sed malignam. Hæmorrhagiam quoque quartanæ febre inutilem *Liebauz* prædicat. Quam quidem ei solummodo quartanæ adversam esse arbitraret, quæ diuturna est, quæque solidorum robur enervat, tenuiores fluidorum particulas dissipat, malumque corporis habitum inducit.

IV. Sudores in diebus judicatoriis vehementes , & celeres si fiant , periculosi , præsertim , qui ex fronte , tamquam guttæ , & fistulæ salientes pelluntur ; frigidique valde , atque multi. Necesse est enim talem sudorem multa vi , & labore , & longa expressione exire.

V. *Ex longo morbo alvi defluxus* , malum.

VI. Quoscumque morbos medicamenta non sanant , ferrum sanat ; quos ferrum non sanat , ignis sanat ; quos vero ignis non sanat , hos sanari non posse putato.

VII. Tabes à decimo octavo , usque ad trigessimum quintum potissimum gignuntur.

VIII. In lethargo tremor , malum.

IX.

IV. *Judicatoriis*. Id est , in quibus crises fieri solent. *v. aph. 24. II. & 36. IV. Vehementes*. Sic sudores , qui confertim , & cum impetu erumpunt , damnantur *in coacis* ; laudantur , qui paulatim fluunt. *v. præfag. lib. 1. n. 29.*

V. *Ex longo morbo*. Sive longus natura fuerit , ut quartana febris , paralytis , aliique morbi à succis crudis , viscidisque geniti ; sive longus propter errorem commissum à medico , aut absidentibus. *Defluxus*. Id est , alvi profluvium , quod longo morbo fractas vires adhuc amplius exhauriat. * *Cataphoree* , * *defluxus* ; quidam legunt *concidentia*. In morbo enim diuturno si venter plus , quam ratio postulat , tabescat , deprimatur , & concidat , malum est : summam quippe debilitatem , & colli- quationem significat.

VI. *Ignis sanat*. Ignem magni fecisse veteres , non adversus externos tantum morbos , sed adversus etiam internos , constat pluribus locis Hipp.

VII. *Tabes v. aph. 9. V.*

VIII. *In lethargo*. De hoc *vid. aph. 23. III. Tremor*. Præsertim in manibus , quia cum projectis manibus supini jaceant lethargici , motus , saltus , tremor , convulsio ea parte magis se prodit. Aliquando dentibus strident , labrum inferius intremiscit , & aliæ partes modo convelluntur , modo resolvuntur. *v. Hollerius , coac. Malum*. Immo lethale est , si persisterit diutius , eique signa alia perniciofa accesserint acutis in febribus.

IX. Lingua nigra, atque cruenta, quum quid horum signorum abest, malum validum non est, & imbecillio^rem morbum significat.

X. Hæc quidem in acutis febribus observentur, ut, si quis moriturus, vel evasurus sit, dignoscamus.

XI. Tectis dexter frigidus, contractuque, mortiferum est.

XII. Ungues nigri, digiti pedum frigidi, nigri, demissi, vel proclinati, mortem proximam esse portentunt.

XIII. Quod etiam digitorum extrema frigida præferunt.

XIV. Et labra livida, resoluta, inversa, frigida si sint, mortiferum est.

XV.

IX. *Nigra.* Quæ simul sicca perseveret: nam quæ nigra simul est, & humida, minus periculosa est. *Holler. coac. Cruenta.* Id est, prærubra, nec non sicca, quæ sanguinem exæstuaré, aut viscera inflammari significat. *Abest.* Iis tamen in morbis, quibus signa à lingua petita adesse debent, ut acutis in febribus, & inflammationibus capitis, viscerumque, quæ in ventre continentur, fere evenit. In pleuritide vero, ac peripneumonia, inque reliquis thoracis morbis, in quibus cum acuta febre, simul tussis, atque excreatio est, nec cruentam, nec nigram linguam plerumque conspiciamus, licet pereundum sit ægro; sed subalbam, subflavamque, atque una mollem.

XI. *Dexter.* De utrisque sic in *præfag.* legitur: „ testes, & „ pudenda revulsa dolores, fortes, & periculum lethale significant, utique si per acutas febres inciderint, nec brevi desinant.

XII. *Ungens.* Plurima signorum, quæ hoc, & sequenti aphorismo traduntur, descripta sunt ex *præfagiis*, quo lectorem remittimus:

XIII. *Frigida.* Modo ne pedes sint œdemate affecti, id est, non intumescant sero. Quippe tum fere sine mortis periculo frigescent. Sed neque in cæteris morbis, iisque acutis huic soli signo fidendum est, sed cum reliquis conjungendum, quæ lethalia esse solent.

XIV. *Livida.* Siquidem in ardentibus febribus, acutisque mor-

XV. Si oculi caligant, vel lucem averfantur, solitudine si quis gaudeat, qui somno multo, & æstu detinetur, extra spem est.

XVI. Si quis sensim rabie quadam efferatur, si quis non cognoscit, non audit, non intelligit, mortiferum est.

XVII. Morituris signa hæc sunt clara magis; & ventriculi tolluntur, tumescunt, inflantur.

XVIII.

morbis appareant. Nam sæpe in hydropo, asthmateque livere labra cernimus, nec inde semper, nedum brevi, 2. *coac.* homo moritur. *Resoluta.* Labra, resoluta, aut perversa non, æque lethale etiam in morbis acutis, quod labra resolvi, ac, perverti possunt valida existente virtute in vomitione, in crisi instante, in vermium affectu citra ullum mortis periculum. Verum in summa virium imbecillitate cum febre assidua, in inflammatione cerebri, & nervorum, in siccitate, aut refrigeratione nimia ejusdem cerebri, & nervorum, plane perniciosæ sunt laborum perversiones, aut resolutiones, maxime vero si accedat auditus, visus, loquendique impotentia. *Liebauius.*

XV. Si oculi caligant. Nec eos morbus infestat. *Extra spem est.* Si alia quoque lethalia signa accesserint, maximeque virium dejectio per acutas febres, extremorum frigiditas cum æstu, ardoreque internarum partium, somnus ore hianti profundus, assiduusque, tremores, convulsiones, rigores, & alia hujus generis.

XVI. Si quis. Cui vires acuto morbo fractæ prorsus fuerint.

Rabie quadam. Phrenitidis perniciosissimum est genus, signumque fere certum imminentis exitii in acutis morbis, si vehementer infirmatus homo fuerit. *Mortiferum est.* Si quis quoque repente, aut non videt, aut non audit, aut non cognoscit, utique si acute febricitet, perdebilisque sit, fere proximus morti est.

XVII. *Ventriculi.* Id est, hypochondria, regio umbilicalis, & hypogastrica, nimirum ea, quæ ab umbilico ad pilosas genitalium partes pertingit, regio.

XVIII. Terminus vero mortis hic est , quum animæ calor supra umbilicum , & diaphragma ascendit ; ac omne humidum exurit , & siccat ; quum autem cor , & pulmo humiditatem caloris collecti mortiferis in locis sentiunt , totum caloris spiritum efflant , unde totum in toto consilit. Præterea quidem partim per carnem , partim per spiracula capitis spirant , quod vivere dicimus ; corporisque capsulam , & alveum anima frigidum , mortuumque una simulacrum relinquit , sanguinique , bili , & pituitæ , & carni concedit.


XVIII. *Terminus.* His , quæ secundum veterum pathologiam sunt , nec medendi præcepta continent , supersedens ad prænotationum libros transeo.



MAGNI HIPPOCRATIS COI PRÆSAGIA,

Latine reddita , notisque , & observationibus Medicis explanata.

Præfagiorum Hippocratis , cujusque virtutem signi sigillatim tradentis doctrina , nulla melior est. *Galen. de morb. vulg. Comm. I.*



PRÆSAGIORUM HIPPOCRATIS

LIBER I.

- I. **N**ihil perinde medico conducibile cenſeo, quam ut prudentem ſe præſtare labore.
- II. Si enim apud ægros, præterita, præſentia, & futura, atque ea, quæ ipſi inter narrandum omiſerunt, noverit, prædixeritque, nihil quod ægris uſui ſit, ignorare putabitur.
- III. Quo ſit, ut audentius homines medico ſe ſe committant.
- IV. Etenim perquam ſalutarem adhibebit curationem, ſi futuras affectiones præviderit. Nam fieri non poteſt, ut omnes ægros ſanitati reſtituat; quamquam hoc multo præſtantius foret, quam futura prænoſcere.
- V. *Quandoquidem* homines *pereunt*, alii quidem ob morbi vehementiam, antequam vocetur medicus; nonnulli vero, vocato licet medico, repente moriuntur; ac alii unico dumtaxat die; alii paulo longiori ſpatio vitam extendunt, priuſquam medicus arte ſua ſingulis morbis accurrendo reſiſtat.
- VI. Proinde harum affectionum naturas noſcere oportet; quantum videlicet corporis viribus ſint ſuperiores.

VII.

IV. *Præviderit.* Id eſt, ſi ex ſignis, ſeu accidentibus morbi, quæ ſymptomata Græci nominant, & ex ſignis coctionum in urinis, alvi excrementis, aut ſputis, colliget medicus, quam criſim, & quando habiturus ſit morbus; ſciat etiam, quo victu ſuſtinendus ſit æger uſque ad tempus criſis, & quid potiſſimum agendum ſit, ne eadem impediatur.

VII. Quin etiam, ſi divinum quidpiam morbis ineſt, hujus quoque providentiam perdiſcere. Sic enim optimo jure, & admirabilem, & bonum ſe præſtabit medicum. Quos enim ſuperſtites fore cognoverit, eos rectius quoque ſervabit, utpote ex multo tempore ſingula conſulte perpendens. Itaque morituros, victurolque præſentiens, atque denunciâns, omnem prorſus calumniam vitabit.

Nota ex facie.

VIII. **I**N acutis morbis ſic conſiderare oportet. In primis quidem ægri facies, num ſanorum faciebus, maxime vero ſuæ ipſius ſimilis ſit; ea enim optima cenſenda eſt. Quæ vero maximo diſcrimine ab hac ſimilitudine recedit, graviſſimum periculum portendit, cujus hæ ſunt notæ.

IX. Nares acutæ, oculi concavi, collapſa tempora, frigida, contractæque aures, & imis partibus leniter verſæ.

X. Cutis circa frontem dura, intenta, & arida: to-

VII. *Divinum.* * *Theion*, * *quod à Deo eſt*, qui præcipua rerum humanarum cauſſa dicitur, *lib. de nat. mul.* Negat quidem *Hipp. lib. de morb. ſacr.* epilepſiam eſſe divinam: at adverſus inſomnia quædam. Idem ſcripſerat, ſuplicandum eſſe, *lib. de inſomn.* Quidam * *to theion*, * exponunt *aerem*; quidam *hujus qualitates occultas*; alii *obſcuras quorundam morborum cauſſas*; alii *naturam criticorum dierum*; alii *inſomnia*, quæ non parum putant conferre ad prænotionem morborum.

VIII. *Ægri faciem.* Hinc *ex Hipp.* In magnis morbis, facies optima, optimum eſt ſignum, in parvis, non bona, malum.

IX. *Acutæ.* Id eſt, compreſſæ, adſtriçtæ. *Collapſa.* Id eſt, cava, ſinuata. *Imis.* Id eſt, extremitatibus ſuis leniter retro verſæ.

X. *Pallidus.* Rectius, *ex viridi pallescens*, ut *Foeſius* vertit. Id quoque medicinæ alumnos ſcire neceſſe eſt, frequentiſſimum omnium, quæ à facie petuntur, futuræ ſignum mortis, eſſe

totius faciei color , aut niger , aut pallidus , aut livens , aut plumbeus.

XI. Quod si inter morbi initia, hujusmodi facies appareat , neque ex aliis indiciis conjectura sumi possit; inquirendum est , an vigilia , aut ventris vehemens resolutio , aut inedia præcesserit , quorum si quidpiamprehenderis , nihil periculi timendum est. Atqui si ob hujusmodi causas hæc faciei species orta est , una die,
no-

esse narium constrictionem , sive acutiem , cum eoque sæpe conjunctam genarum demissionem , quæ interdum , *Cardano* observante , sic coarctantur , ut concavitas è regione dentium appareat in utroque faciei latere. Tum & illud nosse oportet , faciei colorem modo pluribus diebus ante mortem mutari solitum , modo prope eandem , modo etiam post ipsam. Itemque nec in omni morbo , nec in singulis eodem morbo laborantibus , morituris tamen , nares acui , genasve concidere ; neque eodem tempore. Idem esto de cutis circa frontem duritie , & ariditate judicium , deque cæteris , quæ infra describentur , signis.

XI. *Morbi initia.* Id est , primis diebus , aut ante tertium diem. *Valles.* Neque ex aliis indiciis. Id est , ex iis , quæ procedente morbo apparent , signis. *An vigilia.* Non hæc modo , atque inedia , alvique profluvium hanc faciem queunt gignere , sed etiam ingens terror , vehemens mæror , venusque nimis.

Nihil periculi. Quasi diceret : „ si ex aliqua harum causarum „ fiat , non est adeo grave.“ *Valles.* Nam mala , quæ ex causis procatarcticis , sive evidentibus fiunt , intra 24. horas solent conquirere , nisi causæ procatarctica eum in corpore apparatus invenerint , ut internæ causæ cum illis conspiraverint.

Una die. Id est , toto eo tempore , quo hujusmodi facies apparere incæpit , usque ad occasum solis : in dierum enim enumeratione vulgarem morem *Hippocrates* sequitur sic , ut primam morbi diem appellet totum illud tempus , ex quo agrotare cæpit homo , usque ad solis occasum : secundam vero , & reliquas omnes à solis ortu inchoare , statuatur , usque ad sequentem noctem. A qua computandi methodo discedentem *Galenum* improbat *Martianus* , *comm. sect. 4. de rat. vict. acut. t. 162.* *Finitur.* Raro namque , scribente *Cardano* , ultra unum diem perseverat. *Diutiusque.* Id est , si hujusmodi facies porrigatur in

noctæque finitur. Si vero eas præceſſiſſe æger negaverit, diutiusque jam dicto tempore hæc forma duraverit, ſcire licet, eum morti proximum eſſe.

XII. Quod ſi in vetere morbo jam triduo, quatri-duoque talis eſt, inquirenda ſunt ea ſigna, quæ ſupra propoſui; ad hæc reliqua quoque indicia, non ſolum ex facie, verum etiam ex reliquis corporis partibus perpendenda ſunt, præcipue ex oculis.

S

No-

alterum diem, tertiumve, aut quartum, ægrotantem præcipitat. Sed tum lethali huic faciei plura alia peſſima ſigna junguntur; cujuſmodi ſunt celeres, imbecillique pulſus, difficilis reſpiratio, extremorum frigiditas, deſipientia, frigidi ſudores, laborum, palpebrarumve diſtorſiones, ſopores, tremores, atque id genus alia.

XII. *Quod ſi in vetere.* Id eſt, quod ſi poſt morbi principium, nimirum tertio, quartove morbi die, aut ſerius talis fit, non modo an vigilia, inedia, alvique fluxus præceſſerit, inquirendum, ſed etiam ad præſagii certitudinem ſigna, quæ ex cæteris faciei, corporisque partibus, præſertimque ex oculis petuntur, conſulenda, ſed omnium maxime reſpiratio, pulſusque, ut dictum ſupra eſt. Alias igitur acuto ineunte morbo, alias increſcente, conſiſtenteque, *Hippocratica* iſthæc facies apparet. In cholera morbo, in febre ſyncopali, in dejectione, vomituque nigri ſolutique ſanguinis, qui atrabiliaris dicitur, in viſcerum morſu, doloribuſque, ac potiſſimum ventriculi, ingentibus, in profuſione ſanguinis magna ex vulnere, naribus, hæmorrhoidibus, utero, in latente intus, affatimque rupta vomica; in venenis, in angina periculoſiſſima, inque aliis morbis, qui quia *peracuti*, id eſt, admodum acuti ſunt, extremos initio labores habent, I. *aph.* 7. initio quoque hanc sæpe faciem intuemur. Occurritque ea quoque in incremento, ſtatuque morborum, qui 7. 9. 11. 14. & 20. ſolvi ſolent: ac interdum poſt 24. horas reſtituitur, interdum permanens, ægrotantem rapit. Sed ſi etiam uno die evaneſcat, ac nocte, ut quum ex vehementi oris ventriculi dolore, morſuque orta eſt, aut alvo cita, aut febris rigore, qui ſubinde conquieverit, non ideo in tuto eſſe hominem arbitrari oportet, priuſquam morbus ex toto ſolvatur. Nam ſic trahi quidem æger poteſt, ſanari vero,

nifi

Nora ex oculis.

XIII. **N**Am, si lumen refugiant, & illacrimant, idque præter voluntatem, aut pervertuntur, alterque ex iis minor est, & quæ in illis alba esse debent, rubescunt: aut genæ pallent, atque in iisdem venulæ *livescunt*, aut nigricant, aut *oculorum sordes circa pupillam apparent*, aut frequens est oculorum motus: iique, aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt, *fuertintque squallidi, & minime lucidi*, atque universæ faciei color mutatus; hæc omnia signa mala, perniciosaque putanda sunt.

XIV. Quin etiam oculorum per somnum suspensiones observandæ sunt. Ubi enim palpebræ non committuntur; sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet; neque id fluens alvus, aut medicamenti potio præcessit, præsertim si quis non sic dormire consueverit, pravam hoc signum, lethaleque admodum est.

XV.

nisi febris cæteraque prava signa quieverint, non potest. Qui autem huiusmodi facie perseverante moriturus brevi est, ei pulsus in singulas horas extenuatur, deficitque, spiritus acervatim, aut crebro movetur, & fere etiam extrema livescunt, frigescentque. In longis morbis, uti tabe, hydrope, similibusque aliis vita hominis cum *Hippocratica* facie solet diutius, quam in acutis protrahi.

XIII. *Refugiunt*. Nec ullum vitium in oculo appareat, nec dolor adsit, cui lucis averratio adscribi queat. *Illacrimant. v. aph. 52.* IV. *Pervertantur*. Id est, distorquentur, aut contrahuntur, modo sursum, modo deorsum, modo in latus alterutrum. *Alba*. Quum tunica oculi albuginea rubore suffunditur. *Frequens*. Tum etiam si æger oculos ægre moveat; aut objecta fixis oculis intueatur. 4. *epid.*

XIV. *Ex albo*. Pejus est, si quid solum ex albo oculorum subappareat, quam si quoque pars iridis: tum enim non palpebrarum modo, sed ipsiusmet oculi perversio adest. *Lethaleque admodum*. Si perpetuus per somnum fuerit. *Vid. aph. 52.*

VI.

XV. Si palpebra , aut labrum , aut naſus retorquetur , aut pallet , aut livore inficitur , accedente quoque reliquorum ſignorum , ægrum morti proximum eſſe , haud dubitandum eſt. Mortem etiam portendunt labra reſoluta , ſuſpenſa , frigida , candicantia.

A decubitu nota.

XVI. **D**eprehendendus eſt æger in dextrum , ſiniſtrumve latus cubans , brachiis , cer-vice , ac cruribus paulum reductis , ac univerſo corpore molliter affecto , qui fere ſani quoque jacentis habitus eſt ; quippe quum optimus ſit ille decubitus , qui à ſanorum conſuetudine non variat.

XVII. Sed non laudatur *ſupinus* decubitus , quo brachia , cervix , & crura extenduntur.

XVIII.

VI. Minime vero huic ſoli ſigno præſtanda eſt fides ad mortem prædicendam. Etenim me uſus docuit , nonnullos cum eo ipſo eſſuſſe.

XV. *Naſus.* Id eſt , nares , quæ interdum hiant , ſæpius autem conſtringuntur , lethali ſigo *Vid. n. IX. & aph. 48. IV.*

Pallet. Pallor , livorque intelligendus eſt de palpebris , naſo , labris. *Reſoluta.* Quum in ſumma virium jactura cadere videntur. *Suſpenſa.* Quum abſunt à dentibus , verſus principium reflexa , ſic ut labrum ſuperius , veluti decurtatum , & tenuatum intro cadat , inferius extra productum , protuberantque.

Hic & ipſe ſignum proponam non minus lethale , nec ſemel obſervatum , vel in iis , quibus lethales faciei notæ , deerant , oculorumque. Hoc autem in linguæ motu conſiſtit. Quæ ſe ipſa retrahit , quum æger aërem reſpirans attrahit , producit vero , quum emittit eundem. Cui ſigno ſimile addam & alterum , licet lippis , atque tonſoribus notum. Incidit porro , quum æger itidem reſpirans , caput alternatim erigit , atque demittit. Primum accidit , quum pulmonem aër intrat , alterum quum ab eodem reſilit. Atque hujusmodi motus Italice dicitur : *capochiare.*

XVII. *Non laudatur.* *Supinus* quoque decubitus , quo præter conſuetudinem caput æger dextrorſum exporrigit , & pedes ſiniſtrorſum ; aut è contra , pravus eſt.

XVIII. Id vero gravius est, si se ipsum æger continere non valens, ad pedes subinde delabitur.

XIX. Ubi pedes nudat, neque *multus* iis calor subest, ubi brachia, cervicem ac crura inæquabiliter dispergit, ac nudat, mali morbi, angorisque signum est.

XX. Perniciosum est, ubi hians quis assidue dormit.

XXI.

XIX. *Nudat.* Adde: assidue per acutas, ardentisque febres. Nam si perraro æger brachia nudet, & pedes, aut non nisi in vigore febrium, quæ per circuitus increfcere solent, minus malum est. Ubi quis etiam in vehementi pleritide, peripneumoniaque pectus assidue nudat, licet pedes, manusque caleant, lethalis morbi notam usus esse significat. Tanti autem faciendum est hoc signum, ut cum abesset, corpusque una æqualiter caleret, non paucos avasisse viderim, quibus in pectore strepitus erat sputi multi per diem unum, & alterum. *Neque multus.* Si quis brachia, pedesque continenter nudet; eaque perpetuo frigescant, aut exiguo tepore afficiantur, dum interim ardenti feбри exæstuat, ac siti uritur, lethale, *aph.* 48. IV. 72. VII. nedum mali morbi signum esse solet. *Inæquabiliter dispergit.* Solent ægri in acutis febribus crura brachiave indefinenter projicere, positumque corporis sine intermissione variare, extremis frigescentibus. Anxii hi dicuntur. Qui si hoc modo jactantur ob succos acres, ventriculum, intestinaque irritantes, fere nausea, vertigine, doloribusque tentantur, vomituque orto, aut alvo fusa conquiescere, & recalescere solent. Similiter, si propter crism, *prorrhæ.* id eis accidat circa statum morbi, notis apparentibus salutaribus, prægressisque coctionis signis, finiri consuevit sudoribus, vomitibus, dejectionibus, urinisque multis. Quæ vero corporis irrequieta jactatio sine evacuatione persistit, aut hac ipsa consecuta non solvitur, cum extremorum frigiditate, teporeve, ac virium infirmitate, spem tollit. Huc etiam pertinet, quod quidam frequenter assurgere volunt citra, occasionem, & lectum commutare, delirii, & exitii certo signo. Quæ consuetudine ægri, inconstantia, teneritate, peculiari natura, ut puerorum, qui vix ullo stare loco possunt, dolore acerbior, incidit minus formidabilis jactatio est. *Jacotius coac.*

XX. *Hians.* Non de hiantes inter dormiendum, sed de assidue dormiente, atque hiantes intelligere oportet. Ingens quoque

ma-

XXI. Aut ubi ſupinus jacet , cruribus vehementer contortis , complicatiſque.

XXII. Si pronus jaceat is , qui per bonam valetudinem ſic dormire non conſuevit , aut delirium , aut ventris dolorem portendit.

XXIII. Ubi reſidere vult æger in ipſo morbi vigore , malum quidem indicium eſt in omnibus acutis affectibus , ſed longe peſſimum , pulmonibus laborantibus.

A ſtridore dentium.

XXIV. **S**Tridor dentium per febres , præter conſuetudinem à teneris contractam , *furem* ſignificat , & mortem. Atque ab utriſque futurum pe-

malum eſt , ſi æger ſine præcedenti longa vigilia aſidue dormiat , quamvis non hiet ; aut ſi dormiendi cupiditate continenter vexetur. Pernicioſum quoque eſſe , ſæpius vidi , ſi quis in acutis febribus , licet non dormiat , tamen aſidue hiet.

XXI. *Contortis.* Quidam legendum putant , *reductis admodum* , aut *distractis*. Attamen tam crura ſupini cubantis ad nates reducta , quam diſjecta , aut contorta admodum , & complicata , utique ſi alia prava ſigna adſint ; perniciem minantur.

XXII. *Si pronus.* Quotquot pleuritide , aut peripneumonia laborantes , decubitus ferre , niſi pronum , horizontalemque , non poterant , omnes è vivis ereptos fuiſſe , memini. Eorum quoque plures deceſſiſſe obſervavi , qui eodem affecti morbo ſic ſupini , planique jacebant , ut ne caput quidem ab horizontali ſede dimoveri paterentur.

XXIII. *Pulmonibus.* Id eſt , in inflammatione pulmonum. Peſſimum eſt etiam in vehementi pleuritide , erectum ſedere velle , itemque in utroque morbo peſſimum eſt non poſſe , niſi ſedendo , ſpiritum trahere.

XXIV. *Significat.* Intelligendum : *Plerumque.* Nam non ſemper ſtridori dentium , delirium ſupervenit , neque ſemper mors. In rigoribus criſim præcedentibus , in animi diliquiis , aut aliter , ſtridor , & colluſio dentium incidit non ita formidabili cauſa , quia in iis momentaneus eſt. Ubi vero longius permanet ,

aut

periculum denunciandum eſt. Si vero jam deliranti ſtridor quoque accedat ; vix aliam æque pernicioſam invenies notam.

Ab ulcere.

XXV. **U**Lcus, five ante, five in ipſo morbo natum eſt, obſervari debet ; nam ſi moriturus eſt homo, aridum, & livens, aut pallidum, & aridum ante mortem apparet.

A geſticatione manuum.

XXVI. **E**X manuum *motione* huiusmodi notas perpende. In acutis febribus, in peripneumonia, phrenitide, capitis dolore, ſi quis eas faciei admoverit, ut inde quidpiam ſupervacue venetur, aut feſtucas carpat, aut à veſte floccos, aut à pariete paleas avellat ; omnes hæ *notæ* malæ, lethalesque ſunt.

A

aut ſæpius redit, grave malum putandum eſt. *Holler. coac.*
Vix aliam. Sæpe pueri, in acutis morbis, ac præſertim vario-
 lis ſtridentes, & ſimul delirantes, ſervantur ; rariſſime prove-
 ctiores, quibus frequens eſt ſtridor cum acuta febre, & vigiliis,
 quamvis non delirent. Citius autem mori eum, cui jam deli-
 ranti ſtridor ſupervenit, quam cui ſtridenti delirium, notat
Jacotius coac.

XXV. *Moriturus.* Certiſſimum non modo mortis, ſed etiam
 vicinæ ſignum eſt ulcerum ariditas cum pallore, aut livore con-
 juncta. Sed non omnia ulcera, vulneraque, præcipue ſi mag-
 na, & ſinuoſa fuerint, ex toto exareſcere ſolent. Puris quidem
 exitus admodum minuitur, fere labra exſiccantur ulceris, ſed
 omnis humiditas fere non tollitur. Fonticulos pariter, quæque
 cantharidibus excitantur ulcera, eodem vitio, quo cætera, quæ
 ſponte fiunt, affici cernimus : morbilloſque, & variolas ante
 mortem pallere, aut liveſcere, & ſi pure ſcatent, exſiccari, &
 concidere ; tumores demum quoscumque plus, minusque deprimi.

XXVI. *Fæſtucas.* Eorum qui vellerent feſtucas, & aſidue,
 non ſolum quemquam non evaſiſſe vidit, ſed etiam brevi pe-
 riſſe,

A spiratione.

XXVII. **S**piritus frequens, aut doloris, aut inflammationis in partibus *diaphragmate* superioribus indicium est: magnus, & ex longis intervallis delirium declarat: frigidus ex naribus, & ore prodiens, lethalis admodum est.

XXVIII.

riisse, *Cardanus*. Scite *Cardanus* addidit: *assidue*, quippe, eorum qui non continenter id facerent, nonnullos evasisse scio.

XXVII. *Spiritus frequens*. Id est, respiratio frequens. *Doloris*. Si respiratio frequens incidat, id fere accidit propter aliquam noxam, laborem, vitium, inflammationemve, qua non modo partes afficiuntur, quæ supra diaphragma sitæ sunt, sed etiam diaphragma ipsum, musculique, qui respirationi inserviunt, reliqui. *Indicium est*. Intellige, magna ex parte. Etenim utero inflammato fere spiritus frequens est; sæpe quoque idem accidit eodem vitio affectis intestinis, ventriculo, hepate, vesica. Evenitque id ipsum aliquando etiam ob hystericas ægrotationes, & dolores quosdam ventris, Præterea nec frequens, nec visu difficilis respiratio est in pulmonum quibusdam morbis, ægri licet de ea quærantur assidue, vigilantque, ac tussiant, nec tamen doleant, nec vehementer febricitent; idque quod excreant modo cruore, modo flavo humore perfusum una est. Quorum alii, die vigesima, alii citius intereunt, spiritum, non nisi prope mortem trahentes difficilem. *Inflammationis*. Interdum etiam talis respiratio, pro ut major, aut minor febris est, sitis, æstus, vigiliæ, dolores, modo ardorem tantum, modo inflammationem subesse significat. *Magnus*. Ab ea respiratione, quæ magna est, & tarda, delirium, & inde mortem denunciandam esse, scribit *Holler*. I. c. Nec equidem ullum evasisse memini, qui magnum, & ex longis intervallis, quasi suspirans, spiritum duceret, plures vero interiisse sine ulla læsione mentis. *Frigidus*. Quum scribit * *psichron*, * parvum, & rarum spiritum intelligit, quia frigiditas magis sub sensum cadit, quam parvitas, & raritas, *Holler*. Novi ipse quendam, qui paucis ante mortem diebus, frigidum spiritum redderet, postea calidum sub mortem.

XXVIII. Facilis ſpiratio in acutis morbis, quibus febris copulatur, quique intra quadraginta dies finire ſolent, magnum habet ad ſalutem momentum.

A ſudore.

XXIX. **S**udores ſaluberrimi cenſentur in omnibus acutis morbis, ſi in diebus decretoriis oriantur, febrimque finiant, aut ubi toto corpore æqualiter inſudante, æger morbum facilius ſuſtinere videtur. Contra inutiles, qui id effıcere non valent. Peſſimi omnium ſunt frigidi, aut ubi caput dumtaxat, aut facies, aut cervix inſudat; quippe qui in acuta quidem febre mortem, in mitiori vero morbum diuturnum fore ſignificant.

XXX.

XXVIII. *Magnum.* Dummodo naturalis, facilisque reſpiratio toto morbi tempore perfeveret. Sæpe namque paucis ante mortem diebus, interdum etiam horis, reſpiratio mutatur, quæque facilis modo fuerat, difficilis, & prava redditur. Plurimi facienda eſt reſpiratio in morbis peſtoris, in quibus, notante *ſacotio*, ſola sæpe mortis, aut ſalutis diſcrimen facit. Recte *ſacotius* addidit, *sæpe*; quo de *vid. not. præced.*

XXIX. *Decretoriis v. aph. 36. IV.* Sudor criticus, id eſt, *ſalutaris*, in febre continua, hiſ notis cognoscitur: ſi coſtionis notis antegreſſis incidat, ſi die critico, & vigente natura; ſi toto corpore diſfluat; ſi ita moderatus ſit, ne vires diſſolvat, denique ſi febris inde, & omnia ſymptomata acquieſcant, *ſacotius*: aut inde æger levius habeat, *Holler.* ut in ſudoribus imperſecte criticis. *Inutiles.* Id eſt, mali; nam ſi moderate fluant, nec inde tollant, nec imminuant febrem; aut diuturnitatem, aut exacerbationem morbi ſignificant: ſi multi ſint, & aſidui, vires deſciciunt, & sæpe occidunt. *Frigidi.* Peſſimi hi ſunt quacumque ex parte, & quoquo modo fluxerint. Peſſimi quoque, qui ſolum è capite, facie, aut collo manant, etiam ſi ſint calidi: mortem enim prænunciant, tam ſi tenues ex virium reſolutione fuerint, leveſque, quam ſi multi cum aliis lethaliſibus ſignis, aut virium infirmitate. *v. ſacotius.*

XXX. Et qui per corpus eodem modo fiunt, quo circa caput. Qui autem milii inſtar, & circa collum dumtaxat fiunt, mali; qui vero guttatim, & exhalando, boni. Conſiderare autem oportet ſudorem in univerſum; alii enim propter corporis exſolutionem; alii propter inflammationis vehementiam fiunt.

A præcordiis.

XXXI. **A**Tque inter optima indicia ſunt præcordia, ubi ſine ullo ſenſu doloris in utraque parte æqualiter mollia ſunt. Inflammata vero, dolentia, & intentata, & ubi aliter in dextera, aliter in ſiniſtra parte afficiuntur, ſuſpecta haberi debent.

T

XXXII.

XXX. *Et qui.* Negotium facieſſit interpretibus obſcurus hic textus, quem equidem ſuſpicor eſſe mendosum, ſicqui poſſe reſtitui: * *cai oi cata pan to ſooma ooſautoos ginomenoi, agathoi peri teen cephaleen de oi kegchroeidees, cai mounon peri ton tracheelon ginomenoi, poneroi oi æe meta ſtalagmoon, cai atmizontes, agathoi.* * Id eſt: & qui æqualiter toto corpore emanant, boni; qui autem circa caput milii inſtar, & collum ſolummodo erumpunt, mali; qui autem vaporofi deſtillant, boni. Nimirum quamvis ſudores, qui toto corpore æqualiter fiunt, poſſint eſſe mali, ſi nec febrim tollant, nec imminuant; boni tamen ſunt, ſi conſerantur cum ſudoribus, qui è capite ſolum, & collo fluunt. Itemque, qui ex his partibus vaporofi deſtillant, quamvis deteriores ſint ſudoribus univerſalibus, boni tamen ſunt, id eſt, minus mali, quam qui milii inſtar, id eſt, rotundi granorum exiguorum inſtar, prodeunt ex eiſdem partibus, nimirum capite, & collo. *Vid. IV. aph. 36. 37. 40. & VIII. 4.*

XXXI. *Præcordia.* Si in acuta febre præcordia, id eſt, partes, quæ utrinque ſub inferioribus coſtis ſunt, ſine ullo ſenſu doloris æqualiter mollia in utroque latere deprehenduntur, optimum id indicium eſt. *Inflammata.* Non de vera inflammatione eſt intelligendum, ſed de æſtu, ardoreque, ſine renixu tamen, pulſu, & rubore. *v. Gorraus.*

XXXII. Præcordiorum venæ, si pullsent, turbationem, & delirium portendunt. Sed eorum, qui sic affecti sunt, oculos inspicere oportet, quippe frequens illorum motus *furorem* comminatur.

A tumoribus.

XXXIII. **P**Ræcordia tumida, dura, dolentia; si in universum sic affecta sint, maximum malum portendunt: si vero altera parte dumtaxat, ex sinistra minus periculum est.

XXXIV. Cæterum hujusmodi tumores, in principio quidem proximam mortem denunciant: ubi vero viginti dies excesserint, neque quiescente febre, neque tumore remisso, ad suppurationem vertuntur.

XXXV.

XXXII. *Venæ.* Arteriæ nobis audiunt, quarum pulsus vehemens esse debet sic, ut ab ægrotante percipiatur, & à medico: ibique loci, addit *Vallesius*, ubi arteriæ pulsus non solet percipi. *Turbationem.* Id est, delirium cum turbatione; magisque, si oculi crebrius moveantur, ut in *coacis* legitur.

XXXIII. *Dura.* Phlegmonem, sive tumorem vere inflammatorium internarum partium intellige cum calore, tensione, dolore, ac renixu. *In universum.* Id est, utrinque, parte nimirum dextera, & sinistra. *Ex sinistra.* Lienis enim inflammatio minus habet periculi, excindique viscus hoc in canibus exprimenta docent, quin moriantur. Contra periculi multo plus habet hepatis inflammatio ob vicinarum partium consensum: in convexa quoque hepatis parte periculosior est, quam in concava, quod inde diaphragma facile coafficiatur. *V. Facotius.*

XXXIV. *Proximam.* Si tumoris magnitudo eximia fuerit, & viscera vicina in consensum morbi adducta, dolor, febris, anxietas, sitis, & vigiliæ urgeant. Sic *Coi* sororem mortuam scimus secunda die, cui hepar elevabatur splenico modo; id est, in magnam molem, uti interdum lien solet facere. *v. epid. 2.* *Ad suppurationem.* Id est, inflammatus in pus tumor vertitur.

XXXV. Atque in primo circuitu ſanguis è naribus fluens non mediocri iſtis præſidio eſt. Sed tum ſanguinis eruptio expectari debet, quum interrogati, aut caput dolere, aut oculos caligare fatentur.

XXXVI. Id vero junioribus, necdum trigefimum quintum annum attingentibus magis evenire ſolet.

XXXVII. Mollis tumor, dolorem non inferens, & digitis cedens, longiori tempore finitur, ſed non ita grave ab eo periculum pendet.

XXXVIII. Quod ſi intra ſexaginta, dies neque febris deſinit, neque tumor ſubſidet, ſuppurationem expectare oportet. Idem haud ſecus in reliquis quoque ventris partibus perpenditur.

XXXIX.

XXXV. Primo circuitu. Qui ſeptenario, ſeu ſeptem diebus, deſinitur: quanquam ſecundo etiam ſeptenario interdum ſanguis utiliter fluat, ſed paucis, nono, & undecimo die, pauciſſimis decimo quarto, Jacotius. Quarta tamen die erumpens ægre morbum judicat, epid. 6. id eſt, cum bonis ſignis, morbi longitudinem, aut recidivam, cum lethalibus mortem prænunciat. Caput dolore. Addit Valleſius alia ſigna, ut naſi pruritum, aut lacrimas involuntarias, aut ruborem faciei. Cæterum non ſuppuratione ſolum, aut ſanguinis profluviū hujusmodi tumores diſcutit, ſed & ſudores boni, & multæ urinæ, & dejectiones etiam bilioſæ, nonnumquam etiam vomitus. v. Jacotius.

XXXVI. Id vero. Id eſt, expectari magis oportet fluxum ſanguinis uſque ad trigefimum quintum annum, quam ultra hunc. Valleſius.

XXXVII. Digitis cedens. Sic, ut cavitatis veſtigia impreſſa digitis in tumore appareant, ut ſuſpicatur poſt Galenum, Gorraus. Adverſatur Cardanus, & recte quidem; ratus Hippocratem per molle intellexiſſe id, quod digito cedit ſine tenſione evidenti; non molle, quod omnino duritie caret: quod utique in hypochondriorum tumoribus sæpe obſervatur. Finitur. Id eſt, judicatur, ſolvitur.

XXXVIII. Intra ſexaginta dies. Sunt enim, & alii quidam tumores inter iſtos medii, quorum terminus eſt quadrageſimus dies, prout materia minus craſſa, & frigida, calor copioſior,

XXXIX. Itaque durus, magnusque tumor, dolore crucians, mortis periculum non multo poſt fore denunciat. Mollis vero, & ſine dolore, quique prementi digito cedit, longus eſſe ſolet.

XL. Ventris tumores, non tam crebro, ut hii, qui in præcordiis oriuntur, abſceſſum efficiunt. Quod ſi ſub umbilico conſtituantur, *rariſſime* ad ſuppurationem convertentur.

XLI. Sed ex ſuperioribus maxime ſedibus ſanguinis fluorem expectare oportet; in quibus *tamen* omnis tumor diuturnus ad ſuppurationem fere ſpectat.

A ſuppuratione.

XLII. **I**Taque ſuppurationum obſervatio ſic accipienda eſt. Earum enim, quæ in exteriori partem erumpunt, optimæ ſunt parvæ, admodum emi-

tas vegetior, conſtitutio temporis aptior. *Jacotius. Subſidet.* Interdum tumor reſedit, ſeu diſſolvitur, reſoluta materia, vel expurgata per urinas, aut inteſtina. *Idem.* Sæpe quoque huiusmodi tumores tenuiori parte avolante, & craſſiori intus relictæ, in ſcirrhum abeunt, unde iſteritia, cachexia, hydrops, ac tandem mors ſupervenit. *v. Idem.*

XXXIX. *Itaque.* Confirmatio eſt eorum, quæ dicta ſupra ſunt.

XL. *Ventris.* Hoc loco hypochondria umbilicali regione finiuntur ſic, ut tumores, qui in umbilicali regione excitantur, longe rariſſe ſuppurentur, quam ii, qui in hypochondriis gignuntur, & adhuc omnium rariſſime, qui ſub umbilico, id eſt in regione hypogaſtrica.

XLI. *Sed ex ſuperioribus.* Id eſt, in tumoribus hypochondriorum expectanda fere eſt ſuppuratio, aut profluvium ſanguinis è naribus: in tumoribus umbilicalis, & hypogaſtricæ regionis, aut ſuppuratio, aut tumoris tranſitus in ſcirrhum, aut decubitus ad crura, aut hydrops. *In quibus.* Id eſt, in hypochondriis tumor omnis plerumque ſuppuratur, ſi diutius protrahatur, & febris perſeueret pertinacior.

XLII. *Parva.* Intellige ſecundum baſim tumoris (non enim ſem-

eminentes, atque in acutum fastigiatae; pessimæ vero sunt, quæ *magnæ*, quæque *plane* sunt.

XLIII. Sed illarum, quæ intus *rumpuntur*, optimæ censentur, quæ *cum externis partibus nihil communicant*, & contrahuntur, nulloque dolore cruciant, atque ubi exterioris cutis color manet uniformis.

XLIV. Pus illud optimum est, quod album, & læve est, & haud quamquam foetet: quod vero ab hoc variat, & pessimum est.




PRÆ-

semper expedit, parvas esse suppurationes, sed quantitati succorum respondentes). *Vallesius*.

XLIII. Sed illarum. Id est, sed tumorum internorum qui intus rumpuntur (quamvis longe optimum sit extra corpus rumpi) laudabiles sunt, qui colorem cutis non mutant, neque tumor, aut dolor extrinsecus apparet: teterrimi quippe sunt tumores interni, qui intro simul, & extra rumpuntur, quod difficillime carne repleantur. *v. Valles. Cardanus* autem per suppurationes, quæ *foras prominent*, interpretatur externas, id est, in musculis sitas per eas autem, quæ *intro rumpuntur*, profundas, & intra abdomen, sic, ut ruptio fiat ad locum vasorum, scilicet intestinorum, aut venarum, unde pus cum urina, aut alvi excrementis exeat, & non in cavitatem, quæ est inter intestina, & peritonæum, ubi saniei nullus exitus patet, ex quo subinde cutis è regione inficitur, & dolor oritur.

XLIV. Pus illud. Ut si è suppurato hepatis tumore, cujus sedes in dextero hypochondrio est, pus exeat album, læve, æquale, & minime foetidum, facile evadere æger queat; sin qualis amurca fluat, subcruentum, fœculentumque, ac foetidum, fere pereat. *v. VII. aph. 45.*



PRÆSAGIORUM HIPPOCRATIS

LIBER II.

I. **H***ydrops*, si ex acuto morbo cœpit, *periculosus* est; neque enim febrim solvit, sed doloribus torquet atque interficit: oritur vero magna ex parte vel ab ilibus, & lumbis, vel à jecinore.

II. Sed ubi ab ilibus, lumbisque ortum contraxit, pedes tumidos reddit, fluorem diuturnum inducit, qui neque lumborum, iliumve dolorem solvit, neque ventrem efficit molliorem.

III. At quibus à jecinore *hydrops* proficiscitur, ii tussi vexantur, & *tussiendi cupiditate*, sed qua pene nihil

I. *Ex acuto*. Id est, febre ardente, aut inflammatione hepatis, lienis, ventriculi, intestinorum, mesenterii, renum.

Periculosus est. Id est, præ iis, qui alia de causa oriuntur, periculosus. Immo dolorificus, & exitialis esse dicitur in *coacis*.

Ab ilibus. Id est, ab inflammatione mesenterii, aut intestinorum, unde dolor ilia, & lumbos excruciat. *Jecinore*. Siquidem acuto morbo laboraverit, ut inflammatione, erysipelate, ardore, non autem scirrho, aliove longo morbo.

II. *Fluorem*. Id est, alvi profluvium. *Qui neque*. Eo quia, internus ardor, & intemperies hectica maneat, in qua medicorum vulgus, quasi morbus omnis à plenitudine esset, medicamentis *purgantibus* affectus sæpe deteriores reddit, aut agrum præcipitem agit in mortem. *Jacotius*.

III. *At quibus*. Huc usque egisse visus est Hipp. de hydrope tympanitide, sive flatulento, v. *aph.* 11. IV. nunc de ascite, quo intus inter intestina, & peritonæum aqua contrahitur, & flatu quoque non multo intestina tenduntur. *Tussi vexantur*. v. *aph.* 35. VI. *Circa ventrem tumores*. Elevantur vicissim ventris partes, modo dextræ, modo sinistræ; & deinde sub-

hil excreatur ; pedes tument , dejectio dura , coactaque est , circa ventrem tumores , modo in dextera ; modo in sinistra parte attolluntur , deinde desinunt.

IV. Mali etiam morbi signum est , caput , & pedes , manusque frigidas habere , ventre & lateribus calentibus.

V. Securitatem pollicetur corpus , quod æqualiter molle , & calidum est.

VI. Quodque facile convertitur , & surgit.

VII. Gravitas vero , quæ vel manus , & pedes , vel reliquum quoque corpus premit , periculum significat.

VIII.

fidet flatu discusso , aut depulso , quod in tympanitide non accidit , in quo venter rotundior , & tumidior est , & vix quicquam variatur , dum flatu erumpit , aut æger de latere in latus convertitur.

IV. *Mali etiam , v. aph. 48. IV. & 26. 69. VII.*

V. *Securitatem.* Corpus æqualiter molle , calidumque esse , facileque ipsum per se converti , ac surgere * *ariston* , * *optimum* in acutis morbis signum est , si tamen permaneat , cæteraque securitatem polliceantur. Optimum est totum corpus calidum esse æqualiter ; id est , nullum in ventre ardorem esse majorem , quam in aliis partibus , & æque molle : id est , nullum in eo tumorem durum , aut mollem esse , aut magnam obstructionem , qua pars aliqua insigniter dura sit. *Vallesius.*

VII. *Gravitas vero.* Id est , quum corpus præ imbecillitate ægerrime convertitur , aut assurgit ; aut , quod longe pessimum , nullum sponte motum , aut totius corporis , aut partium obire potest , sed deorsum decidit , prolabitur , jacetque tanquam inanimis. „ Musculis à plenitudine oppressis , aut peculiari alio , quo vitio laborantibus , non ita metus est , sicut nec languente facultate subita aliqua evacuatione , aut occasione manifesta. “ *Jacotius.* *Nobilem adolescentem febris tenebat assidua , ad vesperras increscens , mitis tamen. Sitis , æstus , vigilia , dolor , cibusque fastidium aberat. Principium ab animi deliquio febris duxerat. Septima morbi die cum ad ægotantem accessissem , sic infirmatum deprehendi , ut ne manus quidem , pedesque , ipse per se movere valeret. Id domestici tristitia , timorique tribuebant , quibus se pridem tradiderat. Ipse ex tam gravi virium lapsu , quid perniciosum subesse ratus , ejus fratri periculum*

VIII. Quod ſi cum gravitate, unguēs quoque, ac digiti livore afficiantur, continuo perniciem expectare oportet.

IX. At omnino nigri tum digiti, tum pedes, minus quam liventes periculum portendunt: ſed tunc ad reliqua ſigna refugere oportet; etenim ſi æger facile malum ſuſtinet, adſintque alia quædam indicia, quæ ſecuritatem polliceri ſolent; ſuppurationem ſperabis, atque ſuperſtes manebit æger, ſed denigratæ corporis partes decident.

X. Teſticuli, pudendaque retracta, vehementes dolores, atque lethale periculum ſignificant.

De

lum nihil tale cogitanti denunciavi. Poſtridie tuſſis, & difficultas reſpirandi cum ſtertore ægrum nec opinantem invaſit, brevi- que poſt jugulavit.

VIII. *Digiti.* Fere enim ab his, & ab unguibus tam manuum, quam pedum livor incipit; deinde vero labia, & genas occupat. *Avicennas* ruborem in manibus, ac pedibus, ſcribit eſſe deteriorem nigrore; ac ſtatim eum mori, cujus extremitates cum gravitate rubescunt adinſtar coralli apud *Jacotium* legimus, *comm. coac. p. 99.*

IX. *Minus quam liventes.* Quia color lividus fere mortem ſignificat, niger etiam abſceſſum, quo æger interdum evadit. Id accidit, ſi orto in pedibus abſceſſu, febris ex toto deſinit, aut admodum imminuitur, facile ſpirat, alacrior eſt, magis dormit, minus ſitit, minus dolet, & excrementa ſanis ſimilia prodeunt: ſin contra, febris perſeveret, ſitis, vigiliæ, aut ſpirandi difficultas, delirium, naſea, animi deliquia, & pulſus vitioſus accedant, æger moritur v. *Jacotius. Decident.* Id eſt, ſponte ſeparabuntur à ſanis, niſi manu ante auferantur.

X. *Lethale.* Si retracta diutius permanſerint, & alia ſigna lethalia adſint: „quo tempore etiam ſæpe obſervare licet, non „ſolum teſtes revelli, & penem rugari: ſed etiam digitos, & „pollicem manifeſte inflecti, curvari unguēs, labra diſſidere, „molliorem auriculam reflecti, aliaque id genus, duobus, tri- „buſve diebus, interdum etiam pluribus ante mortem.“ *Jacot.*

De somno.

XI. **Q**UOD vero ad somni rationem pertinet, quemadmodum etiam fani solent, interdium vigilare, noctu vero dormire oportet; à qua consuetudine si quis aberraverit, *malum: minus autem nocebit, si dormiat mane usque ad tertiam diei partem. Qui vero postea somnus accidit, deterior est.*

XII. Pessimum tamen est, si somnus, neque noctu, neque interdium accedit. Id enim, vel ob dolorem, laboremve accidit, vel delirium futurum significat.

De alvi excrementis.

XIII. **A**LVI excrementa, inter bona indicia sunt, si figurata sunt, si eodem tempore, quo in secunda valetudine dejici solebant, excernuntur, si his quæ ingeruntur proportionem respondent, utpote quæ inferiorem ventrem recte valere declarant.

V

XIV.

XI. *Usque ad tertiam.* Id est, tertiam diei artificialis partem, quæ quatuor horis constat. v. text. II. lib. I.

XII. *Delirium.* Præsertim si per acutas febres, tendinum tremores, sive subsultus in carpis fiant, aut artuum contremiscentiæ, aut stillæ sanguinis de naribus, aut aurium sonitus, aut surditas permanens, aut capitis dolor, aut vertigo, aut pulsus in temporibus vehemens. Ubi vero somnus nullus est in vehementi pleuritide, præ dolore, ac tussi, aut perquam exiguus, & perturbatus, fere mortem prænunciat.

XIII. Hic loci notam, quam in pleuritide lethalem fuisse cognovi, lubet adjicere, quæ quamvis ad dejectionem non pertineat, tamen ad dejiciendi cupiditatem spectet, ut ex sequenti constat historia. *Cum quidam per initia pleuritidis, rubrum flavo mixtum sputum redderet, quinta die, sequentibusque incepit ad vespervas spumofum extusire sanguinem, mane vero singulo, lividum. Sudabat toto corpore, nec quicquam relevabatur. Dolor urgebat potissimum in dorso. Strepebat sputum in*

pe-

XIV. Si vero liquida fuerint , præstat , ut sine stridore , neque frequenter , neque ex brevibus intervallis dejiciantur. Etenim fatigatur æger , si crebro surgit , vigiliisque consumitur. Quum vero affatim , sæpeque dejicit , ne animus eum deficiat , periculum est.

XV. Convenire debent excrementa his , quæ assumentur , & bis , terve interdium , noctu vero semel dejici ; idque maxime matutinis temporibus pro cujusque consuetudine.

XVI.

pectore. Die septima strepitus quievit sputi. Febris intendebatur, sitis, vigiliæ, jactatio corporis, creber spiritus. Pridie antequam moreretur jactans se querebatur de summa corporis tensione, sibi exonerari alvum, nullatenus adstrictam, vehementer cupiebat, rogabatque. Hæc clystere ducebatur die morbi octava. Vespere ejus diei strepitus sputi rediit, usque ad interitum permanens. Lethalem hanc dejiciendi cupiditatem possem tribus aliis historiis confirmare, quibus, ne longior sim, lubens supersedeo.

XIV. *Affatim.* Id est, confertim. Quum enim multa, & sæpe descendunt, non modo deliqui animi, sed mortis etiam metum inferunt. 4. *de rat. vict. acut.*

XV. *Convenire.* Putat *Vallesius*, de dejectionis humidæ forma, *Hippocratem* fuisse locutum. Qui enim, inquit, bis die, aut ter dejicit, semel nocte, & summo mane plus etiam, is profecto, nec minutatim dejicit, neque crebro, neque admodum raro. Præterea, scire licet, respondere quantitati ingestorum, non esse tantum dejici, quantum ingeritur, sed, rationem quandam servare quæ egeruntur eorum quæ ingeruntur, quod per morbum etiam acutum potest fieri ; ut si laborans, quo die plus ingerit, plus egerit, quo minus, minus quoque idem. *Pro cujusque consuetudine.* Ratio hæc excretorum cum ingestis pergit idem, significat, retinere naturam aliquatenus modum dejiciendi, quo utebatur per bonam valetudinem, si non exacte, at secundum analogiam. Itaque non est collatio numeri dejectionum cum numero qui per sanitatem accidit ---- sed quasi opponens contrarium ei, quod dixerat : *sæpe & confestim fuit*, dicit, bis, aut ter die, semel in nocte. Sic subtiliter, sciteque conatur *Vallesius Hippocratem* adversus *Galenum* defendere.

XVI. Ad finem jam tendente morbo bonum est, si crassiora reddantur; ac *subfulva*.

XVII. Et odoris foeditate sani hominis alvum non vehementer excedant.

XVIII. Lumbricos etiam *rotundos* cum excrementis sub fine morbi descendisse, *expedit*.

XIX. Venter in quovis morbo *mollis*, corpulentusque *mediocriter* esse debet.

XX.

XVI. *Crassiora*. Si ex tenuibus, & aquosis fiant excrementa crassiora, nimirum coherentia, læviora, subflava; & non admodum foetida.

XVII. *Non vehementer*. Nam admodum foetida magnam humorum corruptionem indicant. Quæ vero nihil prorsus foetent, damnanda itidem sunt, ut cruditatis indicia. Significant enim prælanguidam esse ventriculi, intestinorum, reliquorumque viscerum vim in ingesta. *Ex Vallesio*.

XVIII. *Rotundos*. Id est, teretes. *Expedit*. Quia inde naturæ robur, & materiæ bonitas declaratur. Contra, qui sine excrementis exeunt in acutis, ineunte morbo, cruditatem significant, & malignam putredinem. *v. Jacotius, coac.* Putat *Vallesius*, lumbricos posse non in statu solum morbi, sed etiam in incremento, ubi proximus status est, salutariter descendere. At vivos ne, inquires, dejici præstat, an mortuos? *Paulus*, & *Aetius* primum laudant, *Rhazes*, & *Avicena* secundum. Verum prava vivi accidentia gignunt, uti tormina, anxietates, animi deliquia, convulsiones, epilepsiam, febrem, diarrhæam, colicam, cibi fastidium, vertigines, deliria, cordis palpitationem, atque id genus alia. Mortui autem, *Vallesio* observante, cum malignioribus succis eisdem enecantibus possunt esse conjuncti. Qui vero non symptomatice, id est, non ob morbi vim, magnitudinemque descendunt, sed ob concoctionem succorum, quo demum morbi tempore ea contingat, fere vivi cum excrementis jam crascescentibus excerni solent.

XIX. *Mollis*. Siquidem signum est, ei similiter viscera subesse mollia, atque adeo nullo ea humorum coitu, nulla solidorum, quibus texuntur, laborare tensione, contractione, duritie. *Mediocriter*. Multum enim extenuari eundem, & contabescere, prævum est. *II. aph. 35.*

XX. Periculofum itercus eſt, quod perliquidum, albicans, pallidum, vehementer ruſum, aut ſpumans eſt.

XXI. Item malum eſt, quod exiguum, glutinoſum, idemque ſubpallidum eſt.

XXII. Omnium maxime lethiferum eſt nigrum, pingue, æruſinoſum, livens, aut quod pejoris eſt odoris quam pro conſuetudine.

XXIII. Varia excrementa, quamquam diutius mortem differunt, non tamen minus ſunt lethalia; hujusmodi ſunt ramentofa, bilioſa, cruenta, porracea, & & nigra, modo ſimul inter ſe mixta, modo per vices prodeuntia.

XXIV. Inter optima ſigna eſt flatuſ, qui neque cum ſonitu, neque cum crepitu emittitur; quamquam enim ſatius eſt ipſum cum crepitu exire, quam includi; tamen hoc pacto prodiens, aut dolere, aut delirare ægrum ſignificat, niſi ſua ſponte flatum ipſum emiſerit.

XXV.

XX. *Pallidum.* Rectius, ex viridi pallidum, aut viride.

XXI. *Subpallidum.* Rectius, ex viridi ſubpallidum, aut ſubviride.

XXII. *Nigrum.* Dejectiones nigræ, lividæ, aruſinoſæ, & fœtidæ lethales ſunt, niſi ſi bene exeant. Bene autem exeunt, cum in ſtatu morbi à corpore excernuntur, prægreſſis ſignis coctionis in urina, & inſuper cum conferentia, & tolerantia, id eſt, cum allevatione morbi, & virium conſtantia. *Pingue.* Quod ſolet copioſe fluere, & eſt oleo ſimile.

XXIII. *Varia.* Quæ varios colores ſimul ſortiuntur, aut ſubſtantiam: ſcilicet ſi dejectio ſimul fuerit ramentofa, pinguiſ, nigra, eruginofa, viridis, livida, cruenta. *Bilioſa.* Intellige valde flava. Videndum tamen, ne pravus excrementorum color ſit ab ingeſtis. Nam mel, ova, olea, lac dejectionem flavam reddunt, legumina ſpumantem, herbarum folia viridem, portiones ſæpe perliquidam.

XXIV. *Quam includi.* Id eſt, flatum exire cum crepitu in delirantibus, quam intus retineri; quamvis cum crepitu erumpens delirium indicet, aut dolorem præſertim ventris: niſi ob impudentiam, conſuetudinem, aut de induſtria flatum æger cum

XXV. *Præcordiorum* recentes quidem dolores , & *protuberantias* , nisi inflammatio quoque accesserit , murmur in ipsis exortum solvit , ac una cum stercore , & urinis , atque flatu egreditur. Quod ubi non contingit , si tamen è sede sua transfertur , signum est bonum ; idque magis , si ad inferiora descendat.

De urinis.

XXVI. **U**Rina illa optima est , in qua per totum morbi decursum residet album , læve , & æquale : hæc nimirum securitatem , brevemque morbum significat. Quod si aliquid horum deest , ut modo *pura* sit , modo album , læveque in ipsa resideat , hæc ut longiorem morbum denunciat , ita securitatem minorem pollicetur.

XXVII. Subrubra urina , in qua subrubrum , læveque residet , quamquam superiore morbum diuturniorem , eundem tamen *perquam salutarem* fore declarat.

XXVIII.

cum sonitu ejiciat. Cæterum si flatus non exeat , dum venter flatu distenditur , malum est , in febribus , ut 2. *coac.* legitur : nam dolor capitis , vertigo , spirandi difficultas , & similes affectus sequuntur. *v. Jacotius.*

XXV. *Præcordiorum.* Id est , hypochondriorum dolores , & elevationes ob flatum intestina , quæ in hypochondriis sunt , distendentem ; qui si loco moveatur , & cum murmure descendat , brevi post inter dejiciendum , aut mingendum erumpit.

XXVI. *Urina.* Perfectæ concoctionis signa habentur , cum id quod in urina refrigerata residet , & sedimentum , seu hypostasis , dicitur , fuerit album , læve , & æquale. Porro æquale est sedimentum , quod sibi omnibus ex partibus simile existit sic , ut ejus partes omnes sint æque tenues , & albæ : læve est , quod est continuum , nulla ex parte divulsum , sed sibi undique cohæret æquabili superficie. *v. Gorraus. Horum deest.* Id est , si urina modo tale sedimentum habeat , modo careat ; minus erit securus morbus , & longior.

XXVII. *Superiore.* Id est , ea , quæ modo cum sedimento albo , lævi , & æquali redditur , modo sine eo.

XXVIII. Mala est urina, quum id quod residet, parti farinæ crassiori simile est: *pejus* vero, si *laminis*. Ac vituperatur quoque *album tenueque*, quamquam longe majus periculum ea urina portendat, in qua quædam tanquam fursura resident.

XXIX. *Nubecula*, quæ in urina gignuntur, albæ quidem bonæ sunt, nigræ vero malæ.

XXX. Cæterum, quoad urina rufa, tenuisque apparuerit, crudum morbum significat.

XXXI. Quod si diutius talis permanferit, *ne* priusquam *urina concoquatur*, æger viribus destitutus succumbat periculum est.

XXXII. Perniciosissima est urina, quæ mali odoris, & dilluta, & tenuis, & nigra, & crassa est.

XXXIII.

XXVIII. *Album*. Id est, sedimentum album, tenueque, quod inæquale, divulsunque sit. *Quamquam*. Id est, periculosior licet sit urina, cujus sedimentum est fursuri simile, quam illa, in qua subsident farinacea, crassiora, aut laminea, sive foliacea.

XXIX. *Nubeculae*. Harum nomine intelligit *Hipp.* totum id, quod in urina refrigerata conspicitur, nubeculam referens, sive id supremum, sive medium, sive infimum locum teneat in urina. *Bonæ*. Utique tales sunt, si cum nubeculis nigris conferantur. At malæ sunt, licet albæ, quæ farinæ subtiliori, aut squamulis candicantibus sunt similes, aut divulsæ sunt, non coherentes, spumæ instar.

XXXII. *Mali odoris*. Intellige admodum foetidam. *Diluta*. Id est, aquosa. Talis tamen perseverare debet. *Nigra*. Hæc fusca, obscuraque est, usto *caffè* similis. Est enim fere lethalis, multo magis, si & substantia, & contentis nigra sit; aut nigra, & tenuis, quæ inflammationem internam testatur. A sedimento nigro, & solo, multos evadere, scribit *Gal.* à substantia, & sedimento nigris, se vidisse neminem. *v. Jacot.*

Et crassa. Si legas conjunctim, *nigra*, & *crassa*, talis urina erit longe perniciosior, quam nigra tantum: sin disjunctive; pro *urina crassa*, intelligenda erit *perturbata*, non subsidens, qualis fuerat *Ægr. I. lib. 3. & II. lib. 4. epid.* Cæterum nigra

in-

XXXIII. In viris quidem , & mulieribus nigra ; in pueris vero tenuis , & diluta deterrima eſt.

XXXIV. Si urina tenuis , & cruda ſic diu fertur , ut reliqua ſigna ſalutaria ſint , plerumque infra ſeptum tranſverſum abſceſſus oriri ſolent.

XXXV. Neque læviter terrere nos debet urina , cui pinguedo telis araneorum ſimilis innatat ; quippe quæ hominem tabe conſumi ſignificat.

XXXVI. Nubeculæ *in urinis* , ſupremum ne locum , an intimum teneant , obſervare oportet. Nam , quæ in ima parte conſtituuntur , cum coloribus quos ſupra propoſui , bonæ ſunt , atque laudantur : quæ vero cum *relatis coloribus* ſurſum attolluntur , malæ , vituperandæque ſunt.

XXXVII.

interdum critice , ſeu ſalutariter mingitur , quod ex allevatione ægri , & ſymptomatum remiſſione intelligimus. *v. Idem.*

Et ipſe duas vidi mulieres urinam atramento pæne ſimilem per morbum reddentes , ex quo tamen convaluere. Harum altera, lumborum dolore diſcruciabatur ; capitis altera. Utramque febris occupabat, continuæ tertianæ ſervans ordinem.

XXXIII. *In viris.* In hiſ , atque in adultis mulieribus urina nigra , & craſſa deterior eſt , quia horum urinæ tenues eſſe ſolent. In pueris vero deterior eſt tenuis , & diluta , quia hi fere craſſiores urinas reddunt : quamvis , & in pueris deteriores ſint aquoſis urinæ nigræ. *Valleſius.*

XXXIV. *Septum tranſverſum. Diaphragma. Abſceſſus.* Fere is oritur , ſi febris perſeveret , neque ſputa cocta prodeant , neque bilioſæ dejectiones , neque urinæ multæ cum ſedimentis , quæ abſceſſus materiam ſubducant. *v. Facot.*

XXXV. *Significat.* Niſi fiat ex cauſa manifeſta , aut ex peculiari renum ardore. *Valleſius. v. VII. aph. 35.*

XXXVI. *Nubeculæ.* Nubeculæ hic accipi videntur pro hypoſtaſi , ſeu ſedimento , & pro eo contento , quod ſupremam urinæ partem attingit , pendetque , tanquam nubes in aere. Damnat *Hipp.* nubeculas , licet boni coloris , quæ altiorem in urina locum occupant ; laudatque eas , quæ cum iſdem coloribus inferiorem tenent.

XXXVII. Sed cave, ne veſica quoquo modo affecta, ſi hujusmodi reddiderit urinas, te decipiat; tales enim non ad univerſum corpus, ſed ad ipſam dumtaxat veſicam referri debent.

De vomitu.

XXXVIII. **P**erquam utilis eſt vomitus, qui bilem pituitæ mixtam habet, ſi neque craſſitie, neque multitudine admodum excedat: nam ſinceræ pituitæ, bilisve vomitus periculofus eſt.

XXXIX. Si vero viridis, aut lividus, aut niger eſt, quodlibet horum colorum acciderit, vitioſus eſt.

XL. Si vero omnes affatim in eodem appareant, mortis periculum, valde timendum eſt.

XLI. Ad ultima ventum eſſe teſtatur lividus vomitus, præcipue ſi malus in hoc odor eſt.

XLII. Si quidem foetores in quovis vomitu mali ſunt.

De

XXXVII. *Veſica*: Adde & *renes*, aliaque vaſa, per quæ tranſit urina. Sæpe namque harum vitio partium, & pinguedinoſæ, & foliaceæ, & carunculis refertæ, & prærubræ, & foetidæ, cruentæ, & nigræ redduntur urinæ ſine vitæ discrimine.

XXXVIII. *Perquam utilis*. Inter vomitus, qui hominibus per febres accidunt utilis iſ eſt, qui ſic putuitam bili mixtam habet, ut coloris ſit non admodum flavi; neque præterea ſit valde nimius, neque craſſior. Siquidem non iſ modo vomitus ſincerus eſt, adeoque inutilis, qui flavus ex toto eſt, aut viridis, aut æruginofus, aut ruber, aut niger; ſed etiam qui ſero, quo ſecundum naturam præditus quiſque humor eſt, prorſus vacat. *Sinceræ*. Quale eſt crudum ovi albumen. *Bilisve*. Cujusmodi eſt vitellus ovi crudus.

XL. *Omnes affatim*. Id eſt, ſi in eodem vomitu omnes hii colores cernantur.

XLI. *Si malus* --- odor. Vix vomitus eſt, niſi cibi modo ingeſti ſit, qui odore careat. Sed hic malignus intelligi odor debet, qualis eſt in morticiniis putreſcentibus. *Ex Valleſ.*

De ſputo.

XLIII. **I**N pulmonis, *laterumque* doloribus oportet, ut ſputum celeriter, facileque excreetur.

XLIV. Et *flavum* ſputo vehementer miſceatur.

XLV. Etenim, ſi multo poſt doloris initium, aut *flavum*, aut ruſum, aut non ſine multa tuſſi, nec adeo commixtum exſpuitur, vitioſum cenſetur.

XLVI. Quippe *flavum*, ſi ſincerum quoque fuerit, periculum ſubeſſe teſtatur; album vero, viſcidum, & rotundum inutile eſt.

X

XLVII.

XLIII. *Laterumque doloribus.* Id eſt, in pulmonum inflammatione, inque pleuritide; nam de his hic agi ex iis, quæ ſequuntur, manifeſtum eſt. *Celeriter. facileque.* Id eſt, cito, primoque niſu pectoris, ſive ſputum tuſſi, ſive excreatione ſine tuſſi feratur. Utileque perquam eſt in excreando, extuſiendoque & levem tuſſim, & mitiorem dolorem eſſe. Sed & in cæteris morbis, qui cum tuſſi, excreationeque affligunt, cujuſmodi humidum aſthma eſt, pulmonum ſuppuratio, empyema, tuberculum, vomica, phthiſis, catarrhus, commodum eſt, ſputum cito, facileque ejici.

XLIV. *Vehementer.* Neceſſe quoque eſt in pleuritide, & peripneumonia, ut flavus in ſputis humor ſit valde permixtus cum albo. Ex quo ſputorum color emergit ſubflavus. Nam, quod intenſe flavum eſt ſputum, inter ſincera reponit *Hippocrates*, reprobaturque *num. 46.*

XLV. *Multo poſt.* Sputum quippe per initia apparens morbi, non ejus modo maturat exitum, ſed ſæpe etiam pollicetur ſalutarem.

XLVI. *Album.* Non quale puſ eſt album, quod perſæpe laudat *Hippocrates*, ſed qualis catarrhus eſt crudus, viſciduſque, atque alieni coloris expers. Ubi enim in pleuræ pulmonumque inflammatione prodiſt, ſignum eſt, nocentem materiam in affectis hæere locis, catarrhum vero, quod morbum non facit, ab contiguis ſaniſque pulmonum locis exprimi, ut quæ continenter inflammata, tumentesque partes comprimunt.

Ac

XLVII. Mali etiam morbi testimonium est, quod admodum viride, quodque spumofum est.

XLVIII. Id vero omni alio deterius est, quod sic est sincerum, ut nigrum quoque videatur. Neque tutum est sputum, quod non expurgatur, nec projicit ipsum pulmo, sed ob nimiam plenitudinem seruet in gutture.

IL.

Ac si inflammatio tanta est, ut spirandi difficultas, febrisque, & dolor, & tussis, & vigiliæ vehementer urgeant, perpetuoque hujusmodi sputum feratur, plerumque æger moritur, interdum etiam in suppurationem, cujus exitus anceps est ei, morbus transit. *Rotundum.* Sputa globosa, sive catarrhi sint crudi, albique, sive alieno colore perfusi, sive etiam puris sputa sint, in pleuræ, pulmonumque inflammatione prava sunt. Sua quippe cuique humori inest humiditas, quæ tenuitatem eidem, fluiditatemque impertitur. Si hæc abest, fere autem ob febrem ingentem abest, quæ eam ipsam consumit, humores densantur, inflammatio augetur, sputumque, aut cum labore, dolore, multaue tussi redditur, aut brevi supprimitur, magno ægrotantium periculo.

XLVII. *Admodum viride.* Qualis est viridum herbarum succus recens expressus. Qui perpetuo in pleuritide, ac peripneumonia hujusmodi sputum extulsiunt, fere moriuntur. Ipseque unum evasisse memini, præterea neminem.

XLVIII. *Nigrum.* Ne te decipiat lucernæ, aut candelæ fumus, qui sputum sæpe atramento reddit simile, interdum etiam cœruleum. Sputum, quod eloquitur Hipp. nigrum, perquam simile est caffè ustio. Hoc quum perseverat, spiritusque difficulter trahitur, & febris, & dolor, & tussis, & vigiliæ permanent, lethale est. Non ita pridem mulier interiit, cui hujusmodi sputum copiosum erat, inodorumque. Multum sanguinis excreaverat ob ruptum in pulmone tuberculum. Pulsus erat equalis. Respirandi difficultas, febris, sitis, vigiliæ, jactatio corporis, mictio parcissima, urina rubra, crassiorque, tumor pedum aderat. Fere autem livido, nigroque sputum antecedit sanguineum. Pessimum porro est, ubi sputum sanguinem in album, læveque non vertitur. *Quod non expurgatur.* Id est, quod exscreatu potius levi, quam tussi ejicitur, ex summitate tantum

af-

IL. In omnibus morbis pulmonis , *gravedo* , sternutamentumque , sive præfuerint , sive supervenerint , periculum ostendunt ; quamquam in cæteris morbis vel periculosisimis utilitate non carent.

L. Sputum *flavum* , cui parum sanguinis admixtum est , in morbi principio , inflammato pulmone , projectum , securitatem , atque auxilium pollicetur : quod vero ad septimum usque diem , longiorive spatio tale apparet , non adeo tutum est.

LI.

asperę arterię. Sepe maximo cum periculo tenuia solum quędam sputi fragmenta rejiciuntur , crassiori materia intus hærente , ac strepente.

IL. * *Koryzees* , * *coryzæ* , id est , gravedines , II. *aph.* 40. nomine ait *Celsus* distillationem quoque comprehendisse *Hippocratem*. Ex quo *Vallesius* , non solum gravedinem , pulmonum morbis præire , & supervenire malum esse , putat , sed etiam catarrhum , & raucedinem sic , ut gravedine sit pejor catarrhus , longeque catarrho raucedo deterior. *Sternutamentumque*. Quod sane , pulmoni inimicum laboranti , quippe quod eundem exagitet , esse creditur. At fortasse non tam , ob ejus concussum , quam ob consensum partium , timeri debet ; non secus ; atque vomitus , qui capiti affecto supervenit , aut vertigo , capitisque dolor , laborante ventriculo. Quidam tamen , *Galeno* auctore , in pulmonum morbis , sternutationes ad materiam evocandam ciebant. Sed temerariam hanc curandi viam , quę per accidens tantum , ac fortuito prodesse valet , *Gorraeus* appellat. Nec videt *Vallesius* „ quo tempore in inflammatione pulmonum , sternutamentum usui esse possit , nisi forte abscessum aliquem in „ pulmone rumpere opus sit.“ Sed & hoc quoque periculo non vacat ; quin si magnus abscessus fuerit , affatimque is sternutatione excitata rumpatur , animi defectionem inferre valet , & mortem. VII. *aph.* 8.

L. Sputum *flavum*. Tale sputum flavorubescens dicitur ; cujus color oritur , quum sanguis , pituita , bilisque invicem commiscantur. *Securitatem*. Veruntamen ostendit eventus , hujusmodi sputo fidendum semper non esse. Nam etsi cæteris sit longe salubrius , tamen post primos morbi dies , haud raro immutatur , nec semper sanitatem promittit. *Ad septimum.*

Quo

LI. Omne sputum, quod dolorem non mitigat, malum est. Nigrum, ut supra demonstravimus, pessimum est. Sed longe saluberrimum est id, quod dolorem placat.

De suppuratione.

LII. **D**Olores in dictis sedibus, quos neque sputi purgatio, neque soluta alvus, neque sangui-

Quo tempore inutilis materia coqui solet, indeque decolorata, aut puri similia prodire sputa, morbo ad judicationem properante. At ubi ad septimum usque diem, aut amplius, tale permanet, quale initio morbi sputum apparuit, morbo ipso perseverante, cruditatem subesse significat, adeoque periculum facit, morbo autem inclinato, sæpe bonam valetudinem præstat. *Cuidam mulieri sputum hujusmodi exporrigebatur in dies amplius viginti, soluta jam pleuritide, summotoque omni prorsus dolore, atque adeo alacritate, somno, fame, coloreque redeunte. In viro quoque tot ferme dies perseverasse memini, post decesium pleuritidis.*

LI. *Dolorem placat.* Insuper levare eo febrem necesse est, spirandique difficultatem minui, &, si qua sunt mala signa, removeri. Quippe his perstantibus, urgentibusque, aut doloris reditus, aut delirium, aut mors quoque timeri debet. Vix enim est dolor, vel in lethali pleuritide, qui decursu morbi non remittat; interdum etiam intermittat diem unum, aut plures. Si acerbissimus in morbi statu movetur, unumque aut duos dies hæret cum gravibus signis, fere pars, quæ dolebat, emoritur, finitoque dolore respiratio cum stertore oritur, hominemque postridie, aut biduo post, jugulat. Sed etiam mitior dolor pleurumque ante mortem quiescit, quo tempore, fere quisque æger sibi relevatus esse videtur, anxietatemque non sentit, qua maxime premitur. *Perrarumque est, quod contigit patruo meo sacerdoti piissimo. Quem pleuritide occupatum dolor, qui principio magnus fuerat, deinde se tres amplius dies remisit ac postremo recruduerat, intolerabilis ne morientem quidem deseruit.*

LII. *Sedibus.* Id est, in pulmonibus, & thoracis partibus.

Soluta albus. Sive sit sponte soluta, sive infusis lotionibus, aut sorbitionibus alvum ducentibus. *Medicamentum.* * phar-

ma-

guinis miſſio, neque medicamentum, neque victus ratio ſedare potuit, ſcire licet eos ad ſuppurationem tendere.

LIII. Suppuratio erumpens, ſputo adhuc bilioſo apparente, ſive bilis ſeorſum, ſive una cum pure exſpuatur, admodum pernicioſa eſt.

LIV. Præſertim ſi die morbi ſeptimo incæperit *pus cum* huiusmodi ſputo procedere.

LV. Itaque timendum eſt ei, qui ſic expuit, ne decimaquarta die moriatur, niſi ſalutiferum aliquod indicium interea ſuperveniat.

LVI. Porro bonæ ſpei ſigna ſunt, ſi æger bene ſuſtinet morbum, ſi facile ſpirat, ſi dolor levatus eſt, ſi ſine difficultate ſcreat, ſi corpus æqualiter molle, & calidum eſt, neque ſitis infeſtet, præterea urina; alvî ſedimina, ſomni, ſudores, ut de ſingulis ſupra demonſtravimus, probe reſpondent; quorum ſi nullum deeſt, haudquaquam æger morietur. Contra: ſi intolerabilis eſt morbus, ſi *reſpiratio magna*, & frequens eſt, neque mitigatus eſt dolor, vix ſputum redditur, ſitis vehementer cruciat, febris inæqualiter corpus afficit: ſi denique ven-

maceias, * intellige expurgationes elleboro nigro, peplioque factas adverſus pleuritidem deſcendentem, ſeu eam, in qua dolor coſtas occupat ſpurias. v. de rat. vict. acut. 2. *Suppurationem*. Id eſt, vomicam excitant in inflammata parte pulmonum, aut thoracis.

LIII. *Suppuratio*. Id eſt, *pus* è vomica erumpens, ſputo admodum flavo, quod ante damnarat, perſeverante.

LV. *Niſi ſalutiferum*. Id eſt, niſi plura ſuperveniunt ſalutifera ſigna, qualia deſcribuntur n. 56. nullumque lethale appareat.

LVI. *Magna*, & *frequens*. Mala eſt in acutis morbis reſpiratio frequens, & parva; mala itidem eſt, quæ cum in eiſdem magna ſit, frequens ſimul eſt; minus tamen quam parva. Magnam, & frequentem ſimul eſſe, negat *Valleſius*, ideoque non magnam, & crebram, ſed ſublimem, & crebram intelligit. At enim cui ſublimis eſt reſpiratio, per quam ſummus thorax, ſcapulæque elevantur, non ſic crebro reſpirat, quemadmodum

venter, & latera vehementer calent, fronte, manibus, & pedibus frigore affectis; atque urina, & alvi excrementa, & ſomni, & ſudores ſupra propolitis notis periculum minantur; quidquid horum jam dicto ſputo ſupervenerit, aut nono, aut undecimo die ægrum moriturum ſignificat, ita ut decimum quartum non queat attingere. Huiusmodi conjectura lethale *iſtud* ſputum conſequi oportet, quod videlicet ad decimum quartum diem ægrum vivere non permittit. Ex prædictis itaque ſignis, tum bona, tum mala perpendere, ac ſubinde futura prædicere oportet.

LVII. Reliquæ autem vomicæ magna ex parte rum-puntur, ſed aliæ in die vigefimo, aliæ trigefimo, aliæ quadrageſimo, nonnullæ ad ſexageſimum uſque preveniunt.

LVIII.

is qui in reſpirando has eaſdem partes minus elevat. Præterea ſi reſpiratio magna, & ex longis intervallis delirium declarat, I. præſag. 27. magna, & ex brevioribus, quæ magna, & frequens eſt, & morbos pectoris, & malam ſuppurationem oſtendet. Cæterum ſi quis legerit: *Magna aut frequens*, non equidem repugnabo. Nam in morbis pectoris, maximeque in ſuppuratione, quæ extra, aut intus in pulmone eſt, uterque sæpe reſpirationis modus ſeorſim occurrit. Quo quo autem modo reſpiratio in his morbis à naturali ſtatu reſceſſerit, periculum ſub-eſſe teſtatur. *Febris inæqualiter*. Id eſt, febris ſine ordine accedit, & increſcit. *Lethale iſtud ſputum*. Nimirum illud, quod modo bilis eſt, modo puris, modo ſimul utriuſque, cum eo tamen, ut ad idem ſputum ipſum plures malæ notæ accedant, in primisque difficilis reſpiratio, ætus ingens, extrema frigida, pulſus imbecillus, nocturnaue vigilia.

LVII. *Die vigefimo*. Dies non à morbi principio, ſed à principio ſuppurationis ſunt numerandi. Conferunt ad celerio-rem ſuppurationem, purisque eruptionem, ætas juvenilis, regio, ægri temperamentum, & anni tempus calidum, & morbi im-petus, & calor æëris, qui in cubiculo eſt.

LVIII. Proinde ſuppurationis initium obſervare oportet, quod ab eo die *faciendum* eſt, quo primum quis, aut febricitavit, aut inhorruit, aut pro dolore, gravitatem illius partis ſenſit, quam antea dolor inteſtitabat. Nam talia in ſuppurationum principio accidere ſolent. Ab hoc igitur tempore, uſque ad jam definita ſpatia, vomicarum eruptiones expectandæ ſunt.

LIX. An vero alteram dumtaxat partem vomica occupet, ex his fere notis perpendere licet; ſi alterum
la-

LVIII. *Quo primum.* Si nulla febris antea fuerit, aut ſi eadem ex toto deſierit ante acceſſionem febris, quam movet ſuppuratio. *Aut inhorruit.* In pleuritide, & peripneumonia, fere febris cum rigore, horrore non accedit, niſi primo ejus impetu. Si quis igitur poſt ſeptimum, nonum, undecimum, & decimum quartum diem, riget, aut inhorreſcit, nec ſubinde morbus ſudore aliave criſi finiatur, aut admodum minuatur, ab eo, quo id æger patitur die, principium ſuppurationis ducito. Veriſimileque etiam eſt, tum ſuppuratum iri morbum, cum febris exaſperatur, & dolor intenditur, & nocturnæ vigiliæ urgent, & ſpirandi difficultas augetur, & tuſſis increbeſcit, & ſputum ſupprimitur, aut minuitur, & difficilius educitur, aut evaneſcente dolore, delirium oritur. Neque per ea tempora horreſcere, aut rigere æger ſolet, ſed ſolummodo, quum inclinata febris eſt, ex acutaque decedens ad vesp̄as accedit, noctu increſcit, ſummo autem mane cum ſudore remittit. *Gravitas m.* Conſecto pure, quemadmodum febris, ſic mitigatur, & dolor, aut is intermittit, aut hunc ipſum gravitas partis excipit, ſuperveniuntque ſigna alia, quæ infra recenſentur, *n.* 60. *Ab hoc ipſo tempore.* Id eſt, ab eo die, quo quis, aut primo febricitat, aut ſi jam febricitat, primo riget, aut horret; aut ſi ſine his, febris intenditur, morbique accidentia, quæ ſupra propoſui, augentur; numerandi reliqui dies ſunt ad uſque terminum jam definitum dierum 20. 30. 40. 60. quo vomica rumpi ſolet, poſtque in thoracis cavitatem effundi.

LIX. *Vomica.* * *Empyema*, * hic loci non vomica, ſed puris collectio ex vomica rupta, effuſoque pure in alterutram thoracis cavitatem debere, videtur intelligi. Quippe ſuppurata pleuritis, genitaque ſic vomica, nondum tamen rupta oppoſi-
tum

latus dolore cruciatur, & altero calidius est; atque ubi in partem sanam aliquis decubuit, interrogatus, onerari eam veluti ex pondere aliquo respondeat; quibus cognitis, in eo latere suppurationem esse conjicies, cui gravitas incumbit.

LX. Suppuratos omnes hoc pacto deprehendes: si febris non dimittit, eaque interdium levior est, noctu increfcit, multus sudor oritur, tussendi cupiditas est, sed

tum latus, dum homo in id ipsum decumbit, nullo solet gravare pondere, rupta vero gravare semper solet. Sæpe quoque puris sonus fluctuantis auditur, dum æger convertitur. Interdum etiam œdema, sive tumor mollis, indolens, aquosus oritur eo in latere, in quo pus continetur. *Dolore cruciatur.* Dolor quoque sedem puris indicat. Nam dolor partium, inflammationem, purisque generationem comitatur. Nec pure facto, dolor ipse finitur ex toto: *n. 58.* ac ne eo quidem in cavum thoracis effuso penitus conquiescit. Nam partes, quibus insidet, vexare pus solet. *Cui gravitas.* Id est, in eo latere, quod gravat oppositum.

LX. *Non dimittit.* Quo tempore solet dimittere, nimirum aut 9. aut 11. aut 14. die, eaque sive noctu, sive interdium cum rigore, vel perfrigeratione exacerbatur; si dolor perseverat, & spirandi difficultas, & tussis sicca, aut qua cruda solummodo exscreantur, & si sudor interim frequenter oritur, suppurari, seu in pus versam esse materiam significant. Horum plurima, quæ hic suppurationis proponuntur, signa suppuratis æque convenire scias, atque empyis, nec non etiam tabescentibus, siquidem tam in pleuritide suppurata, quam in empyemate, *n. 59.* & phthisi, nec febris dimittit, nec acuta perseverat, sed die levior est, ad vespertas vero, nocturne increfcit. Sudor multus oritur febrem non solvens, nec dolorem, nec tussim, nec spirandi difficultatem. Neque quicquam fere excreatur, antequam pus è vomica, aut è thorace in asperam permeet arteriam. Quo si confestim, affatimque irruat, fere animi deliquium affert, & vomitionem movet, interdum quoque strangulat; sin sensim illabatur, tussi subinde sine periculo ejicitur. *Malæ rubent.* Malæ similiter rubent, tam si laborat pulmo, quam si collectum pus in cavitate thoracis est, aut phthisis tenet. Cibi quoque

sed nihil pene excreatur, oculi cavantur, malæ rubent, ungues in manibus curvantur; digiti, maximeque summi calent, pedes tument, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore nascuntur.

LXI. Atque diuturnarum vomicarum hæ sunt notæ, quibus haud dubia fides adhibenda est. Sed quæ breviori spatio duraturæ sunt, sic indicantur: si quid eorum appareat, quæ inter initia fiunt, simul si spiritus majori cum difficultate trahitur.

Y. LXII.

que fastidium fere convenit tribus hisce morbis, non minus quam calor, qui potissimum volam manus occupat, interdum etiam digitos, extremaque eorundem. *Ungues in manibus.* Curvatio unguium, quæ in manu sunt, quæque etiam in pede, & pedum eorundem tumor, & oculorum cavitas, quum jam corpus, protracto morbo, extenuari incipit, in empyis apparere solent, non tamen solummodo in iis, qui ex phthisi tabescunt. Etenim plerosque ante quadragesimum diem post ruptam vomicam, atque adeo ante phthisis ortum, V. aph. 15. vidi empyios his signis fuisse præditos; quorum nonnulli etiam intra tale spatium, longiusve intervallum servabantur, sive urinis multis crassisque, sive maxime pure tussi ex ore rejecto, albo, æqualique, & lævi. *Pustulæ.* Maculæ sunt, quas equidem vidi, modo rubræ, modo lividæ, semper autem confitæ, periculisque, quibus malignis quibusdam in febribus, scorbuticisque morbis, interdumque etiam in tertianarum accessione febrium, quæ ex toto intermittunt, cutis sædatur universa, perquam similes. Perraro tamen eæ ipsæ occurrunt, nec equidem in magna suppuratorum, empyiorumque numero, nisi ter eas, quaterve vidi. Verumtamen ne unum quidem mihi contigit vidisse servatum eorum, qui hisce maculis conspergerentur, licet multum puris exscreassent.

LXI. *Diuturnarum.* Collectione, puris antiquæ innotescunt signis, quæ ultimo loco proponit Hipp. recentiores vero iis, quæ principio proposuerat, nimirum, si febris non dimittat, si cum perfrigeratione invadat, si sit noctu gravior, & sudor frequens oriatur, & inanis tussis, & loco doloris, gravitas percipiatur, & spirandi difficultas major, non ea, quam ante habuerat, sed quam is habet, qui ex simili morbo convalesceret, sine suppuratione.

LXII. Celeriores tardioresve eruptionem ita conficiēs : ſi protinus ab initio *dolor*, & *tuffis* fuit, & ſpiritus difficultas, atque ſputi excretio, vomica intra vigefimum diem erumpet. Si vero non adeo vehemens fuerit dolor, cæteraque illi ex proportionē respondeant, ſerius ruptura ſequetur : quo tempore, & dolorem, & ſpirandi difficultatem minui, atque ſputi excreatum increſcere, ante videlicet puris eruptionem, neceſſe eſt.

LXIII. Cæterum à periculo tuti ſunt, quibus eadem die, qua eruptio facta eſt, febris conquievit, deſieruntque urgere eibi faſtidium, & ſitis : alvus exigua quædam, & figurata reddit, pus album, læve, ſimplici colore, & ſine pituita eſt, atque ſine dolore, levi tuſſicula, ejicitur. Hæ ſunt notæ perquam ſalutares, quæ celeriter liberant hominem. Ab his ſecuritatem pollicentur, quæ ad ipſas proxime accedunt. At certum periculum eſt, ſi febris non conquievit, aut poſt quietem repetit. Item ſi ſitis eſt, ſi cibi faſtidium, ſi venter liquidus, ſi pus eſt lividum, aut ex *viridi* pallidum, ſi nihil niſi ſpumantem pituitam æger excreat. Itaque ſer-

vari

LXII. *Eruptionem*. Id eſt, diſruptionem tumoris in pus verſi, quem vomicam dicimus; cujus ſubinde diſruptionem puris ſputum ſequitur. *Dolor*. Sive acutus; dolor, & pungens, ſive gravitatis ſenſus, * *ponos* * enim utrumque ſignificat; quo hæc fuerint moleſtiora, eo citius diſruptio ſequetur. Fere enim dolori ſenſus gravitatis ſuccedit, & huic viciffim ſæpe dolor, uſque ad diſruptionem vomicæ. *Sputi excretio*. Id eſt, ſputi crudi, viſcidique ob compreſſionem pulmonaris ſubſtantix factam ab increſcente vomica. *Increſcere*. Quo plus augetur vomica, eo copioſior excretio eſt : ſæpe aliquot horis, interdum etiam integro die, ante diſruptionem, quam fere vomitus, & animi deliquium excipit, ſputa pure pauxillo infecta prodeunt.

LXIII. *Conquievit*. Aut certe levata febris eſt : nam quibuſdam interdum extenuata producit ad dies aliquot ſine metu, dummodo ſitis, dolor, tuſſis, vigilix, faſtidium cibi, aliaque ſimiliter deſinant, aut maxima ex parte minuantur. *Si pus eſt*

vari non poſſunt , quibus omnia hæc accidunt : quibus vero non omnia , alii quidem moriuntur , alii vero poſt longa temporum intervalla , ſani evadunt. Ex omnibus autem jam propoſitis conjecturis reliquarum quoque aſſectionum ſigna conſiderare oportet.

De abſceſſibus.

LXIV. **Q**uibus ob laborantem pulmonem abſceſſus ſecundum aures oriuntur , & in partibus infernis ſuppurantur , ac *fiſtula facta aperiuntur* , iis ſecunda valetudo contingere ſolet.

LXV.

eſt lividum. Si pus , ſi catarrhus , ſi alia materia quælibet , ſive ſpumans , ſive craſſa , ſive tenuis , perliquidave ſit , admodum fœtet , mortiferum eſt , in ſuppuratis , atque empyis , niſi cito finiatur , quod pluribus experimentis didici.

LXIV. *Et in partibus.* Sic quidem habet *Aldinus Codex* , unde intelligas abſceſſus ſecundum aures ortos , & diſruptos in parte declivi eorundem. At *Gal.* hanc ſequitur lectionem : * *ee es ta catoo chooria* , * *vel ad inferiora loca* ; ut ſenſus ſit , non-nullos inflammatione pulmonum laborantes liberari ſuppurato , & rupto prope aures abſceſſu ; aut eodem in inferioribus partibus excitato , uti in immo ventre , in inguinibus , in cruribus , diſruptoque ſic , ut fiſtulam efficiat. Hunc locum illuſtrare alter videtur poſſe , ubi legitur , *n. 67.* peripneumoniam juvari abſceſſu orto in cruribus , ſive iſ ipſe abſceſſus in tumore , ſive in dolore conſiſtat crurum. Huic igitur morbo auxilio eſſe poſteſt cum abſceſſus ſecundum aures natus , tum etiam in partibus ſi fiat infernis , ac potiſſimum in cruribus : eoque magis ſi ex eo pus effluat. Nec enim ex textu plane conſtat , nec neceſſe eſt ad acutum morbum ſolvendum , ut in fiſtulam ulcus abeat. Tales porro abſceſſus in peripneumonia naſci , inſolens eſt ; nec eos ipſe longo uſu artis , magnaſque horum morborum frequentia his in locis adhuc vidi genitos. Duas , treſve , ni fallor , obſervationes abſceſſuum , qui in cruribus aperti pulmonum morbum depulerant , dudum legi apud nuperum ſcriptorem Gallum.

LXV. In quibus hujusmodi notas obſervabis: ſi febris non conquieſcit, neque dolor mitigatur, ſi ſputum non pro ratione ejicitur, ſi alvus, neque bilioſa, neque liquida, neque ſincera excernit, *neque urina permulta eſt cum copioſo ſedimento*, ac reliqua quoque ſigna omnia ſecuritatem polliceantur, ejusmodi abſceſſus expectandi ſunt.

LXVI. Qui aliis quidem eveniunt in partibus infernis, ſi quodammodo inflammata fuerint præcordia, aliis vero in ſuperioribus, ſi præcordia ſunt *mollia*, neque dolore infeſtantur; ſed accedit pro tempore ſpiritus difficultas, quæ deinde ſine ulla evidenti occaſione quieſcit.

LXVII. In vehementi, periculoſaque peripneumonia, non inutiliter in cruribus naſcuntur abſceſſus; nec poteſt aliud quidquam melius acciderè, præſertim ſi mutato ſputo ſic appareant; ſive enim tumor, ſive dolor ſentitur, ſputo *flavo* in pus jam converſo, excretoque, tutiſſimum id indicium eſt. Nam & æger à periculo

LXV. *Liquida*. Id eſt, bene ſoluta, & facile fluentia. *Sincera*. Id eſt, unius tantum evacuati humoris ſpeciem habentia, & aliis humoribus impermixti. *Expectandi*. Præſertim ſi dolores partem ante occupaverint, aut nunc occupent, ubi fieri abſceſſus ſolent; nimirum prope aures, aut in inferioribus partibus. Cumque, præſertim apud nos, rariſſimus hic caſus ſit, uti dictum nota præcedenti eſt, cave, ne abſceſſum temere inconfiderateque præſagias.

LXVI. *Infernis v. text.* LXIV. *Quodammodo inflammata*. Quod indicat hypochondriorum tenſio, elevatio, calor, aut dolor. *Sed accedit*. Quo tempore materia ſurſum movetur, obiter infert difficultatem ſpirandi, quæ ſine cauſſa evidente ceſſat, hoc eſt, ſine ope medica, aut notabili evacuatione, *Holler*.

LXVII. *Abſceſſus*. De his v. IV. aph. 31. Hic de illis ſermo eſt, qui vel tumorem in ea, quam occupant parte, excitant, vel dolorem tantummodo creant. *Vid. num. 64.* *In pus jam converſo*. Id eſt, ex flavoſcenti factò albo, lævi, & æquali, quod concoctionis ſignum eſt, ſputa enim ſunt cocta, quæ ſunt

culo liberatur, & abſceſſus doloris expers, celerrime con-
quieſcit. At, ſi neque ſputum probe excernitur, nihil-
que reſidet in urina, quod bonam ſpem fulcire videat-
ur, ne ex eo articulo claudicet æger, vel plurima cer-
te ſuſtineat negotia, periculum eſt.

LXVIII. Si vero *ſubſidunt* abſceſſus, *atque intro re-
currunt*, non prodeunte ſputo, ac perſeuerante febre,
gravis timor eſt, ne delirium ſubeat æger, aut moriatur.

LXIX. Sane ex ſuppurationibus, quas pulmonum
morbi concitarunt, fere ſeniores moriuntur; ex cæteris
junioribus.

LXX. Lumborum, inferiorumque partium dolo-
res, quibus febris quoque accedit, ſi ad *diaphragma*
trãſeunt, relictis inferioribus, admodum pernicioſi ſunt;
ani-

ſunt ſimilia puri, *de rat. viſſ. acut. Probe.* Id eſt, celeriter,
facileque. *Quod bonam ſpem.* Qualem præſertim promittit ſe-
dimentum album, læve, & æquale. *Claudicet.* Quia abſceſ-
ſus, qui ſiunt ad crura, fere *cruris* articulos occupant. *Vel
plurima.* Id eſt, vel ea parte diutius, & vehementius laboret.

LXVIII. *Subſidunt.* Id eſt, repente detumefcunt. *Intro
recurrunt.* Id eſt, refluunt in eadem loca, unde venerant;
cujus ſigna ſunt, ſubita doloris, vel tumoris occultatio, febris
vel aucta, vel eadem manens; humor, *ideſt* ſputum, nec
concoctus, nec exclusus, & acerbiorum ſymptomatum ſucceſ-
ſio, cujuſmodi deliria ſunt, aut ſopores, angina, ſtrangula-
tus. *v. Jacotius.*

LXIX. *Seniores.* Quicumque in ſenii gradu fuerint conſti-
tuti: ex cæteris inflammationibus juniores magis, quam ii,
qui *crudi ſenes* appellantur, nimirum ab anno 50. ad 67. quip-
pe qui febribus acutis, deliriis, & doloribus minus infeſtantur,
quam juvenes.

LXX. *Diaphragma* * *phrenes* * proprie mentem ſignificat,
Gorraus: & * *phrenoon aſſin*, * *mentis emotionem* vocat *Hipp.*
Hinc rectius fortaſſe legeris: Lumborum, inferiorumque par-
tium dolores, ſi, accedente quoque febre, occultati mentem
perturbaverint; aut mortem inferunt, aut ſuppurationem mo-
vent in ea parte, quæ ante delirium doluerat. Sic ſurarum do-
lo-

animadvertenda tamen reliqua quoque indicia sunt ; si enim periculosum aliquod signum accesserit , hominem à spe deponit.

LXXI. Quum uruntur suppurati , si pus fluxerit purum , candidum , & sine foetore , servantur : si vero subcruentum , cœnosumque pereunt. Si ad *diaphragma* malum ascenderit , nullo reliquorum signorum periculum ostendente , futuræ suppurationis indubitata spes est.

Ex vesica nota.

LXXII. **V**esica dura , dolens , grave periculum , & lethale comminatur ; idque *maxime* , si continua quoque febris accesserit. Nam vesicæ dolores validam necandi vim obtinent : quo tempore alvus etiam nihil reddit , nisi dura quædam , ac ne ea quidam , nisi cogatur.

LXXIII.

lores mentem emonent. *v. coac. & prædict.* Sic *Crito* , ex digiti pedis dolore ingenti deliravit , & periit. Sic *Calvus* occultato femoris dolore , in delirium incidit , & mortuus est acutissime. *v. epid.* Cæterum & de diaphragmate , seu septo transverso , vera potest esse sententia. Quippe morbum humor faciens lumbis , inferioribusque relictis partibus , potest eas , quæ in pectore sunt , invadere , ibique loci suppurationem movere.


LXXI. Quum uruntur. Hæc est interjecta sententia , iisdem fere verbis descripta *Sec. VII. aph. 44.* quem vide. Si ad *diaphragma*. Hæc pertinent ad textum LXX. cujus extrema verba cum his , quæ sequuntur sic sunt conjungenda : Si enim periculosum aliquod signum accesserit , hominem à spe deponit : sin autem dolores delirium moverint , nullo reliquorum signorum periculum ostendente , futuræ suppurationis indubitata spes est ; nimirum ibi , ubi fuerat dolor : * *empyos* * enim non modo is dicitur , cui pus in thorace , aut pulmonibus , sed quacumque corporis parte , collectum sit. *v. Gorræus.*

LXXII. Alvus etiam. Nec solum subsistit alvus , sed urina fere ægerrime excluditur ; dolorque , & aliquando manifestus tumor est in pube. Itaque inflammatione partis , & febre con-

LXXIII. At vero urina purulenta procedens, in qua refidet album, & læve, metum detrahit.

LXXIV. Quod si ab hujusmodi urina dolor levatus non est, neque vesica mollior effecta est, neque febris conquievit, laborantem per primos morbi circuitus moriturum denunciandum est.

LXXV. Id vero pueris, à septimo anno ad decimum quintum præcipue, evenire solet.




PRÆ-

tinua, doloreque excruciente ægrum, quamquam aliquando clementior sit, periculum grave imminet ægro, ac paucissimi evadunt. *Holler.*

LXXIII. *Metum detrahit.* Id perpetuum non est. Vidi enim aliquos, qui emicta urina purulenta, lævius quidem ad tempus habuerunt: sed postea renata inflammatione, urinaque iterum suppressa, obierunt. *Idem.*

LXXIV. *Per primos.* Nimirum quarta die, aut septima. Siquidem morbi sunt acutissimi, horrendaque accersentes symptomata, nimirum convulsiones, rigores, tremores, deliria, vomitus, singultus, extremarum partium, cum internarum æstu, sitique inexplebili, frigiditates, inordinatosque, ac frequentes, & imbecillos pulsus. *Vid. Aretæum.*

LXXV. *A septimo anno.* Nam per hanc ætatem facile calculus in vesica gignitur, qui acutas sæpe febres, nisi extrahatur, accendit, cruciatusque ingentes vesicæ, & ulcera, & inflammationes, & gangrenas etiam creat mortíferas.



PRÆSAGIORUM HIPPOCRATIS

LIBER III.

I. **F**Ebres, five sanus ab ipsis quis evadat, five pereat, æquali dierum numero finiuntur.

II. Ut enim saluberrime febres, quæ videlicet tutissimis fulciuntur notis, die quarto, vel antea quiescere solent; ita pessimæ quæque, & quibus periculofissima adsunt signa, die quarto, vel citius interficiunt.

III. Primus itaque earum insultus ita finitur; alter in septimum diem producit, tertius in undecimum; quartus in decimum quartum; quintus in decimum septimum; sextus in vigesimum. Igitur accessiones ipsæ ex acutissimis morbis per quatuor in viginti auctæ, finiuntur.

IV. Verum hujuscemodi supputatio per dies integros nimirum fieri non potest, quippe quum nec annus, nec menses ipsi integris numerentur diebus.

V.

I. *Æquali.* Idem est, ac si dixisset: in febribus crises contingunt iis diebus, nimirum criticis, *aph.* 24. II. quibus evadunt, aut moriuntur homines.

II. *Periculofissima.* Cujusmodi sunt delirium, vigiliæ, spirandi difficultas, sitis vehemens, acutus dolor, convulsio, & præ cæteris anxietas perseverans eum extremarum partium perfrigeratione, ob quam æger continenter artus huc, illuc dejicit, positumque corporis assidue mutat.

III. *Primus.* Nimirum primus febrium circuitus die tertio, aut quarto finitur. *Per quatuor.* Id est, accessio, five circuitus morbi perquam acutissimi, tertio, aut quarto die finitur; acutissimi septimo; perquam acuti undecimo; acuti simpliciter decimoquarto, acuti non exacte decimo septimo, aut vigesimo.

IV. *Fieri non potest.* Nam, si per dies integros accessiones fe-

V. Deinde eadem ratione , atque additione , primus circuitus ad quatuor , & triginta , alter ad quadraginta , tertius ad ſexaginta dies perveniet.

VI. Sed hujusmodi morbos , qui longiori ſpatio finire debent , ab initio perquam difficile eſt diſcernere , quod ſimillima ſint eorum principia. Animadvertere tamen à prima die oportet , atque ſingulos dierum quaterniores obſervare ; ſic enim aut obſcure ſcies , quo ſe converſurus ſit morbus.

VII. Ac quartanæ quoque conditio hunc ſervat ordinem.

VIII. Morbi autem tempore brevifſimo finem attingen-

Z

gen-

februm ſuppurari deberent per quatuor in viginti auctæ dies , critici eſſent dies 4. 8. 12. 16. 20. non vero 4. 7. 11. 14. 17. 20.

V. *Primus circuitus.* Febrim ſcilicet , quæ ex acutis decidunt , quæ , ſimiliter per dies non integros ſuppurando , judicantur primo circuitu , nimirum 34. die , altero circuitu die 40. non autem 41. tertio circuitu die 60. non autem 61. Si eadem ratione atque additione , nimirum per quatuor dies proceſſeris in acutis , & in his , qui ex acutis decidunt , morbis , ſuppurando dies emergent 4. 7. 11. 14. 17. 20. 24. 27. 31. 34. 37. 40. 44. 47. 50. 54. 57. 60. Sin autem per ſeptenarios dies pariter non integros ſuppuraveris , habebis dies 7. 14. 20. 27. 34. 40. 47. 54. 60. inter quos *Hipp.* ſolum nominat dies 34. 40. & 60. quod fortaffe , qui ex acutis decidunt , his præſertim diebus judicari morbos noverit.

VI. *Longiori ſpatio.* Nimirum morbi , qui vigefimum diem ſuperantes dicuntur ex acutis decidere (quippe quia acutorum terminus quatuordecim dies ſunt , interdum etiam viginti , aut unus , & viginti) exporrigunturque in dies 30. 40. 60. & amplius quoque aliquando. *Quaterniores.* Id eſt , animadvertendi ſunt quaternarii dies ſinguli ; nimirum 4. 7. 11. 14. His namque potiſſimum mutationes ſiunt , quæ brevem , longumque morbi exitum declarant.

VII. *Hunc ſervat.* Id eſt , per quatuor movetur dies.

VIII. *Ab initio.* Si morbi initium primos morbi dies intellexeris , ſcias , plures lethales morbos , nec dolorem initio in-

gen-

gentes facilius dignoſcuntur, utpote qui maximis protinus ab initio diſtinguuntur differentiis; ſiquidem ad ſanitatem tendentes facile ſpirant, non dolent, dormiunt noctu, ac reliqua quoque ſigna maximam eis ſecuritatem pollicentur.

IX. Perituri vero difficulter ſpirant, delirant, vigiliant, cæteraque id genus peſſima ſigna eis accedunt.

X. Igitur (his ſic ſe habentibus) morbos ad iudicium tendentes conjectura conſequi oportet, & ex tempore, & ex ſingulis additionibus.

XI. Ita eadem quoque ratione in mulieribus morborum iudicia à partu numeranda ſunt.

XII.

gentem, nec ſpirandi difficultatem, nec vigiliam comitari; contra ſæpe ſalutares morbos incipere cum acutis doloribus, vigilia, aut delirio. Igitur aut morbi initium erit totum illud tempus, quo materia adhuc cruda eſt, aut reliqua ſigna erunt per initia morborum animadvertenda, ſiqua aderunt, quæ certius præſagium reddant.

IX. *Perituri.* Non eſt neceſſe ad mortem inferendam ſimul delirium concurrere, & ſpirandi difficultatem, & vigiliam; ſed unum horum ſufficit, ſi cum acuta febre, aliſque lethaliſus ſignis continenter affligerit: quin, ſi id quoque intermiſerit, occidet, ſi vires fractæ fuerint vehementia morbi.

X. *Ex tempore.* Id eſt, protinus conjiciendum eſt, an ſalutaris, vel lethalis ſit morbus, brevis futurus, aut longus; conjecturaque procedendum in ſingulis quaternariis diebus, uſque dum iudicetur morbus.

XI. *Morborum iudicia.* Id eſt, qui cum febre ſunt, mulieresque quæ pepererunt, aut fœtum perdiderunt, occupant, iſdem diebus, quibus cæteri morbi finiri ſolent, ſolventur nimirum 4. 7. 11. 14. 17. 20. 30. 40. &c. numerandi dies erunt à partus die, utique ſi febris, quæ poſtridie, aut tertio, quartove poſt partum die, fereque cum rigore horrore accedens ab utero proficiſcatur, phlogoſi, id eſt, ardore, aut inflammatione laborante. Id autem uteri dolores, lumborumque acuti & perſeverantes indicant, uterique purgamina, aut ex toto ſuppreſſa, aut admodum imminuta, regio uteri longe durior

tu-

XII. Capitis in febre vehementes , perpetuique dolores , accedente lethaliū notarum aliqua , valde ſunt pernicioſi : Si vero nullo tali ſigno apparente ; diem vigefimum dolor exceſſerit , neque febris conquieſcat , ex naribus ſanguinis fluorem , aut in partibus inferioribus abſceſſum expectabimus. Similiter dolori etiam recenti ſanguinis profuſio ex naribus , aut ſupuratio ſupervenire ſolet , præcipue ſi dolor & tempora , & frontem inteſtaverit.

XIII.

tumidiorque , quam ante , eſt ; manuque contrectata vehementer dolet. Si hæc abſunt , uterusque ſine vitio , ſine dolore eſt , contrectatusque indolens , mollisque deprehenditur , ejuſque purgamenta copia qualitate , tempore , modoque convenienti feruntur : non à partu , qui culpa caret , ſed à primo febris impetu dies numerare incipies , ut , quo dierum ſpatio ſolventur morbus ſit , recte conſicias.

XII. *In febre.* Etiam ſine febre interdum capitis occidit dolor. *Mulieri gravida hemicrania laboranti oculi pervertebantur poſt menſem. Convulſiones etiam ſæpe incidebant , & vertigines ſine febre , & , quo partum die eliſit , medicis obiit inopinanti-bus.* Dolor capitis , itemque vertigo , crebra cum vomitione inanique invadens brevi plures apoplecticorum more ſuſtulit. *Non paucos quoque novi , qui ex magno capitis dolore poſtridie vocem amiſerant , dementesque continuo facti decimo undecimo-que extinguebantur die. Quatuor horum ſecui cadavera ; inque ſingulis anteriores cerebri ventriculi ſero limpidi replebantur.*

Lethaliū. Cujusmodi eſt delirium vehemens , difficilis ſpiratio , pulſus intercідens , deficiens , urina nigra , perturbata , aquoſa , vocis privatio , dentium ſtridor , oculi perversio , rubor faciei cum tumore , aſſidua vigilia , vomitus frequens , convulſiones , artuum tremores. *Sanguinis fluorem.* Quamquam ante viceſimum , atque adeo ſeptimo die , vel prius , hæmorrhagiæ fiunt magis , poſt ſeptimum ſanguinis quoque , & puris vacuatio : poſt viceſimum , minus quidem hæmorrhagia expectari poteſt , ſuppuratio magis , & abſceſſus. *Holler. Præcipue.* Dolor capitis acutus circa frontem , & tempora ſanguinem , aut pus prænunciat : labor vero in parte aliqua interiori corporis , illuc abſceſſum fore declarat. *Idem.*

XIII. Maxime vero sanguinis fluxio expectanda est in juvenibus, qui quintum & trigefimum annum nondum superaverunt; nam majoribus natu suppuratio fere oritur.

XIV. Auris dolor acutus cum febre non intermitte, vehementique, grave periculum minatur; nam, & mentem turbat, & hominem rapit. Quum igitur *his fallax sit modus*, à primo protinus die omnibus signis accurate animum adhibere oportet.

XV. Nam ex eo casu juniores quidem intra septimum diem, seniores vero multo tardius moriuntur: quip-

XIII. *Maxime vero.* Florentibus quidem annis hæmorrhagiæ fiunt magis, & fluxus puris, *ex naribus, aut naribus*: declinantibus abscessus. *Idem.* At si nec sanguinis profluvium è naribus, nec puris eruptio ex iisdem, aut auribus, nec abscessus ad inferiora fiat, non protinus est desperandum; solvitur enim dolor interdum, & mensium in mulieribus eruptione, & sputis multis puri similibus, & alvi profluvio, & abscessu ad vesicam mejendi difficultatem faciente, & tumore prope aures abortu, ut in *coac.* legitur, aut ulcerum eruptione.

XIV. *Auris dolor.* „Aurium inflammationes, doloresque interdum ad dementiam, mortemque præcipitant“ *Cels.* ex eisque multos ægros, & delirare, & derepente quosdam etiam mori, perinde atque apoplecticos, observante. *Jacotio.* *Cum fere.* *Hac sine magnus auris dolor virum tenebat, sanguis bis detrabebatur è vena. Exemplo, misso sanguine, vocem amisit, itemque sensuum usum omnium. Secta rursum vena nihil levabatur, quartoque die morbi periit. Juveni ex vehementi auris cruciatu eodem die suppuratio fiebat, purisque multum albi effuebat ex aure, desitque dolor acerbissimus eo ipso die. Fallax.* De morte pronunciandum ante non est, quam alia signa in exitium ægri conspirent, quæ videlicet ostendant humoris, febris, & inflammationis *malitiam*; ut vires præter naturam infirmæ, urinæ crudæ, aut confusæ; vigiliæ, deliria, dolor totius capitis, & similia. *Jacot.*

XV. *Nisi pus candidum.* Id est, album, læve, & æquale. *In coacis* scribitur: nisi pus multum. Liberantur & copiosa sanguini-

quippe qui non æque magnas *patiuntur* febres, neque adeo infaniunt; proinde sustinere possunt, donec suppuretur affectus. Quod si morbus hac in ætate revertatur, maxima ex parte interficere solet. Sed juniores, antequam auris suppuretur, pereunt, nisi pus candidum ab ea defluens securitatem polliceatur; præsertim ubi salutarium quoque signorum aliquod apparet.

XVI. Neque leviter terreri debemus, ubi febricitanti fauces exulcerantur: cui si aliud quoque ex malis signis, quæ supra declaravimus accesserit, in periculo hominem versari denunciandum est.

De angina.

XVII. **A** Ngina periculosissima est, celeriterque enecat, si neque in faucibus, neque
in

guinis è naribus profusione, quamquam nec ipsa omnino tuta est, quod sæpe symptomata sit vi febris, aut inflammationis. *Idem. Præsertim.* Quasi dicat: „nec inde certa salutis spes, est, nisi alia signa salutaria consentiant, ut delirii, ac febris, remissio, somnus *auctus*, & suavis, urinæ coctæ, pulsus constans, spiratio libera.“ *Idem.* Nonnullos vidi *fluente licet pure eoque albo fuisse sublato, malis perseverantibus signis. Vidi quoque, quem servasset delirantem acuteque febrientem constitutum in Ecclesiastica dignitate virum, non tam puris fluxus ex aure, quam ejusdem puris ingens eruptio prope aurem dolentem, ubi tumor repente exoriebatur apariebaturque, facta.*

XVI. *Malis signis.* Qualia sunt urina cruda, aut vitiosa, delirium, difficilis spiritus, pulsus infirmus, intercepta deglutitio, & similia. *Idem. In periculo.* Ego testari possum, *inquit Vallesius*, me signum hoc nempe *faucium exulcerationem*, magni facere, vidissequè multos, quibus febris ardens jam videbatur inclinare, cum hac affectione perire: quod accedit gravissimum, est fastidium quoddam maximum, adeo ut nihil possint accipere, sed potum etiam detestentur, quamvis exurantur.

XVII. *Faucibus.* Id est, lato illo spatio, quod dum aperitur os, & deprimitur lingua inferius apparet, ubi gemina ora
sunt,

in cervice quicquam apparet : si dolor vehemens est , si vix spiritus trahitur ; etenim eodem die jugulat , licet interdum usque ad secundum , aut tertium , aut etiam quartum protrahatur.

XVIII. Quæ vero in reliquis quidem non minori dolore afficit , in faucibus vero tumorem , ruboremque excitat , superiori non minus periculosa est ; sed longius spatium habebit : præcipue si vehemens fuerit rubor.

XIX. Sed tum præcipue malum prolongatur , quum non solum fauces , sed cervicem quoque rubor occupat.

Ma-

sunt , videlicet : œsophagi , & laryngis. *Cervice.* Rectius, *collo.* Hipp. enim modo * *aucheena* , * modo * *ton tracheelon* , * *collum* appellat , huncque debere intelligi apparet ex *aph.* 37. VI. ubi *Hippocratis* * *too tracheeloo* , * *collo* utitur , ut tumoris locum indicet. *Quicquam.* Id est , si nullus tumor , ruborque effatu dignus in faucibus , collove appareat , qui in reliquis mitioribus anginis tonsillas occupat in faucibus sitas , collique musculos è regione tonsillarum. Ubi igitur nihil effatu dignum his in locis apparet (nam aliqualis rubor non potest abesse à faucibus vel in hac ipsa angina sævissima *judicio Vallesii* , ob vicinarum partium inflammationem , strangulationemque (angina appellatur latens , quæ statim , notante eodem *Vallesio* , privat hominem voce , hiareque facit , & respirare distenta cervice. *Si vix spiritus.* Quum ob metum suffocationis æger se se erigit ad respirandum , thoracem vehementer elevans in attrahendo aërem , & narium pinnas movens.

XVIII. *Quæ vero.* Id est , quæcumque vero similem laborem pariunt : id est , similem dolorem , similemque fere respirandi difficultatem , quorum causa plerumque intereunt , quamquam tardius quod hæc mala diutius sustineant propter faucium tumorem , ruboremque. Primum anginae genus numquam vidit *Cardanus* , secundum hoc raro apparere scribit in regionibus nostris : seque duos hoc morbo sublatos audivit Mediolani : ipse duos vidi. Accidit frequenter in pestilentia , malignisque morborum constitutionibus primum , & alterum anginae genus.

XIX. *Si rubor.* Cum eo tamen , ut hujusmodi rubor respirandi difficultatem , dolorem faucium , & febrim minuat : contra,

Maxime vero potest ab ea secunda valetudo contingere, si rubor simul & collum, & pectus comprehendat, neque ad interna revertatur erysipelas.

XX. Quum vero deletur erysipelas, sed non in decretoriis diebus, neque in exteriores partes convertitur tumor, neque pus creat æger, sed levis, & à dolore immunis videtur; id aut mortem significat, aut dolorem *reversurum*.

XXI. Tutius est, & tumorem, & ruborem in externas maxime partes converti; si vero ad pulmonem conversio fiat, dementiam excitabit, quamquam nonnulli sic affecti magna ex parte suppurantur.

XXII.

tra, si hæc perseveraverint, aut inde increverint, signum erit, tantum esse ad fauces humorum confluxum, ut ad externa quoque regurgitent. *v. Vallesius.*

XX. *Decretoriis.* Id est, criticis, *aph. 24. II.* qui bonis signis fiduciam malis metum addunt. *Mortem.* Si cætera perniciosissima signa responderint, uti virium infirmitas, pulsuum pravitas, extremorum refrigeratio, jactatio, vigiliæ, sudores particulares, aut frigidi. *Dolorem.* Plura exemplaria legunt * *ton erithreematos* * *ruboris*, non doloris reditum.

XXI. *Conversio.* Quam colligere est, non modo ab allevatione doloris, & strangulatus faucium, sed etiam à rubore genarum, pectoris gravitate, atque angustia, pulsuque duro, inordinato, atque inæquali. Qui sic affecti sunt, ii statum 4. aut 5. vel ad summum 7. die moriuntur. Si vero hos dies effugerint, suppurantur. *v. aph. 10. V. & comm. Holler.* nisi tamen fiat pituitæ excreatio, ut in *coacis* legitur, quod tamen vix umquam locum habet, nisi in morbo levissimo, & materia admodum benigna, annotante *Jacotio.* *Dementiam excitabit.* Id est, delirium movebit, quod fere à suppuratione proficiscitur, in quam humor vertitur è faucibus in pulmones illapsus. *Suppurantur.* Suppuratio quoque periculo non caret, nisi febrim, sitim, vigiliæ, spirandique difficultatem tollat, aut certe plurimum minuat, vires consent, pusque facile extusfiatur, sitque læve, æquale, album. Periclitantur maxime senes; nec evadunt juvenes, si frigido sudore, aut inutili disfluant,

XXII. Gurgulio, si cum rubore tumescit, sine periculo præcidi non potest; etenim inflammatio, sanguinisque profusio ei accedit. Proinde satius est aliis quibusdam auxiliis uti, quibus extenuari possit: Quum vero pallidior efficitur, uva nominari solet; quod si tum imma ejus pars crassa, & rotunda, summa vero tenuis videatur, intrepide præcidi debet. Satius tamen fuerit, antequam manus adhibeatur, alvum vacuare, si tempus id ita permittat, ut interim suffocatio hominem non præoccupet.

XXIII. Quibus febres, neque salutaribus notis apparentibus, neque in diebus decretoriis conquiescunt, si reversionem timere debent.

XXIV. In longa febre, ex qua tamen æger liberari potest, si neque ob inflammationem, neque ob aliam ullam

fluant, si pus fuerit prævum, spumofumque, si vigiliæ urgeant, si sitis, ac æstus infestet, si spiritus difficulter trahatur, si pulsus fiat imbecillus, aut alvus cita. Apud nos benigniores sunt anginae, fere in inflammatione tonsillarum consistunt, quibus primis quatuor, aut sequentibus aliis quatuor diebus disruptis, aut scalpello pertusis, effluxoque pure sanitas redit. Tumor in collo oritur è regione tonsillæ inflammatae tumentisque: vox sæpe rauca, febris acuta, vigiliæ, sitis, calor, dolor ingens, atque deglutiendi difficultas, sed respiratio, in qua maxima salutis spes est, vix à statu naturali recedit.

XXII. *Gurgulio.* Columella. Uvam *Celsus* appellat: caruncula est, quæ in fine palati ad fauces dependet inter tonsillas; cujus ante præcisionem, & sanguinem mitti, & alvum duci expedit. Prius quoque filo pertenui in dies magis constringenda est, donec gracilescat, qua parte, aut secare, aut scarificare, aut urere, constitueris.

XXIII. *Salutaribus.* Salutares notæ sunt manifestæ excretiones, aut abscessus, præcedentibus coctionis signis in urina. *V. aph. 71. IV. Decretoriis. v. text. XXI.* Minor tamen est suspicio recidivæ, si cum salutaribus notis solvatur febris, quamvis die non critica. *Vallesius.*

XXIV. *Longa.* Quæ vicessimum transgreditur diem. *Ma-*
ni-

ullam manifeſtam cauſam dolor infeſtat ; aut tumidum, aut doloroſum in articulis abſceſſum expectare oportet, præcipue in immis partibus.

XXV. Maxime vero in his ætatibus, quæ triginta annos non exceſſerunt, ejuſmodi abſceſſus naſci conſueverunt, idque in tempore breviori.

XXVI. Non tamen expectandus eſt abſceſſus, donec vigefimum diem febris præterierit.

XXVII. Is natu majoribus raro accidit, quamvis longo ſpatio duret febris.

XXVIII. Solet etiam continuis febribus abſceſſus ſupervenire. *Intermittens* vero febris, eademque errabunda, in quartanam mutabitur, præcipue ſi autumnus proximus eſt.

XXIX. Atque, ut abſceſſus oriuntur in his, qui triginta annis minores ſunt ; ita quartana eos, qui trigeſimum annum, aut agunt, aut exceſſerunt, præcipue corripit.

XXX. Igitur ſcire licet, abſceſſus hieme magis accidere, ſerius finire, & minus intro recurrere.

De vomitione ſpontanea.

XXXI. **S**I cuiſpiam in non lethali febre caput dolet, aut ante oculos obſcura quædam

Aa

ob-

niſeſtum. Cuiuſmodi eſt error in victu, mala temporum anni conditio, regio infeſta, prævum domicilium, animi perturbatio. *Aut tumidum.* Id eſt, aut abſceſſus cum tumore, aut dolor expectandus eſt in articulis, iſſque maxime, qui ſunt in parte inferiori, nimirum in femoribus, pedibuſve quos dolor vexat.

XXV. *Breviori.* Id eſt, poſt paucos dies à febris initio, abſceſſus in articulis ſunt : ſenioribus rarius, ac tardius. *Cardanus.*

XXVIII. *Errabunda.* Quæ paroxiſmos inordinatos habet: ut qui interdum tertio, vel quarto die ſiant, interdum quinto, vel ſexto. *Præcipue.* Nam autumnò quartanas febres fieri ſcripſerat. *aph. 22. III.*

XXXI. *Non lethali.* Quippe quum lethalia ſigna adſunt, non vomitus, ſed mors expectanda, præſertim ſi ad hæc rigor quo-

obverſantur , & etiam oris ventriculi morſus accidit , is bilem evomet. Si vero rigor apprehenderit , & inferiores præcordiorum partes frigore afficiantur , citius ad vomitionem properabit , quod ſi eo tempore quidpiam aut biberit , aut ederit , id quoque quam celerrime evomet.

XXXII. Quibus itaque à primo protinus die dolor ſupervenerit , iis quarto , & quinto die ingraveſcit ; mox in ſeptimo liberantur. Sunt non pauci , qui tertio die do-

quoque acceſſerit. *v. coac.* *Evomet.* Confirmatur vomitus præſagium , ſi multa , ac tenuis ſpuitio addatur , tremorque inferioris labii. *Gal. criſ. & prorrh.* Dolores capitis ingentes aſſiduique hominem interdum vel non febrientem tollunt. Pernicioſiſſima ſigna ſunt vertigo , vomitusque frequens dolorem non ſolvens , maximeque vocis privatio , ſenſuumque. Horum nonnulli perpetuo ſine voce , intelligentiaque interiøre die morbi decima , undecimavo , *v. num. 12. n.* nonnulli etiam citius , fere quidem ſine febre uſque ad interitum. Erant qui ad mingendum ipſi ſe cum impetu erigerent. Qui citius moriebantur primum comatoſi fiebant , deinde apoplectici. In horum numero vir fuit nobilis nuperrime extinctus , ætatis annorum 45. Prima die cœpit capite vehementer dolere ſine febre. Secunda decubuit , acceſſitque frequens vomitus dolorem non tollens , neque minuens. Tertia die ſibi pedis venam ipſe per ſe juſſit ſecari , cliſteremque injici. Coma ſequebatur. Quarta die rurſum vigil , mente tamen parum conſtans. Perſeverabat vomitus. Hic ad vesp̄as ejus diei receſſit , comate redeunte , vocisque privatione ſecuta. Manus levibus concuſſionibus per intervalla tentabantur. Spiritus facilis. Vix quicquam levis ſpumæ interdum circa os apparebat. Ager interim ipſe ſe convertebat , vocatusque incondita voce aliquando reſpondebat. Noct̄e , apoplectico modo raptus eſt. Poſt mortem ſanguinis , ſerique multum ex ore , naribusque fluxit. Remedia non proſuere reliqua , fortasſe quia nimis ſero adhibita.

XXXII. Dolor. Si dolor capitis in acuta febre quarto die maxime ingraveſcat , & quinto , ſolvetur die ſeptimo , quo die , morbi finiuntur acutiſſimi. *v. text. IV.* Si febricitantem dolor capitis tertio die occupet : cum manifeſtum ſit ob febris exacerbationem excitatum fuiſſe dolorem , & quinto die exacerperetur , ſerius quidem , at die tamen impari ſolvetur , ſcilicet

dolere incipiunt, quinto maxime molestantur, deinde nono, vel undecimo tuti evadunt. Sed quos dolor quinto die vexare cœperit, & reliqua *pro ratione prioribus* respondeant, iis decimo quarto die finitur morbus.

XXXIII. Hæc tum viris, tum mulieribus, sed in tertianis maxime contingere solent. Junioribus vero, cum in iis ipsis, tum præcipue in *perassiduis* febribus, & tertianis sinceris.

XXXIV. Itaque quibus in hujuscemodi febre caput dolet, oculi vero obscuras illas imagines non vident; sed caligatione hebetantur, aut splendentia quædam cernere se putant: ac *loco morsus oris ventriculi*, in alterutra parte præcordia tenduntur, ac neque dolor infestat, neque inflammatio, iis pro vomitu, sanguis è

na-

cet nono, aut undecimo. Si demum quinto febris die invadat, dolor, & reliqua *pro ratione prioribus* respondeant, id est, aut nono, & undecimo dolor admodum urgeat, aut, ut vult *Cardanus*, si omnia rite peragantur, nec æger aberret, decimo quarto die cessabit dolor; qui quamvis par sit dies, rationem tamen habet imparis, scilicet septenarii, cum sit septimus secundæ septimanæ, & acutos morbos judicet. *v. aph. 23. II.*

XXXIII. *Tertianis.* Tam continuis, quam intermittentibus, sive exquisitæ 12. horarum ex fuerint, *aph. 59. IV.* sive nothæ 15. horarum, & amplius.

XXXIV. *Hujuscemodi.* Id est, quæ notas salutes habet. Signa quæ hic proponit *Hipp.* salutarem crism prænunciant, aut profluvii sanguinis de naribus, aut biliosi vomitus. *Neque dolor.* Non eo dolorem, & inflammationem excludit, quod numquam in his salutariter sanguis è naribus profluat, *v. text. XXXVI. lib. I.* sed quod sæpius in febribus hæc crises accidant tenso alterutro hypochondrio sine dolore, tumore, & duritie, quæ inflammationem subesse significant. *Sanguis è naribus.* Sunt & alia signa quæ sanguinis è naribus fluxum portendunt, cujusmodi sunt non voluntariæ lacrimæ, dolor colli, nasi pruritus, gravitas temporum. *vid. Hipp. 1. epid. Vel superaverunt.* In senibus magis expectandus vomitus, quam fluxus sanguinis è naribus: utrumque enim horum accidit magis juvenibus, quam senibus, tamen senibus accidit minus sanguinis flu-

xus

naribus profluet ; idque præcipue junioribus accidit. Si vero trigefimum annum , vel agunt , vel ſuperaverunt vomitum potius , quam ſanguinis fluorem , expectabimus.

De convulſione.

XXXV. **S**I pueris in acuta febre alvus nihil dejicit, neque ſomnus accedit , ſed terrentur, ſlent , color mutatur , ut modo *ex viridi* pallidus , modo lividus , aut ruber efficiatur , nervorum diſtentionis timeri debet ; utpote quæ pueros , qui ſeptimum annum nondum exceſſerunt quampromptiſſime invadit. Grandiſculos vero pueros , atque adultos , non adeo in febribus nervorum diſtentionisprehendit , niſi vehementis admodum malitiæ ſignum aliquod affuerit , qualia videlicet in phreniticis videntur.

XXXVI.

xus , quam vomitus. Senectus quidem idoneos magis ſuccos habet ad abſceſſus , quam juvenus ; craſſiores enim habet ſuccos , ſed ſenibus raro fiunt abſceſſus : contumaciores enim eorum ſucci cum facultatis , ut *Valleſius inquit* , debilitate , id eſt cum virium cordis , arteriarumque infirmitate , fibrarumque corporis externarum rigiditate , inertiaque ; mortem magis , quam abſceſſum accerſere ſolent. Notatque *idem Valleſius* , præ cæteris pueros ſæpiſſime in abſceſſus incidere ob voracitatem , viriumque cordis per ætatem robur cum fibrarum corporis externarum mollitie , faciliſſime extensione conjunctum.

XXXV. *Nervorum diſtentionis v. aph. 57. IV.* Hæc quoque timenda eſt in dentientibus pueris , qui corpulentiores manent , & altiore ſomno utuntur. Non tamen omnes occidit pueros , ſed plures etiam ſervantur : raroque convelluntur , qui dentientes acuta febre tenentur , aut alvus crebrius demittit. *De dentit. Malitiæ ſignum.* Cujusmodi ſunt denſæ urinæ , & perturbatæ , dentium ſtridor , repentina tumoris retroceſſio , tendinum ſubſultus , artuum tremores , perverſiones palpebrarum , oculorum , naſi , labrorum , teroces intuitus , excitationes è ſomno turbulentæ , & quæ his ſimilia ſunt.

XXXVI. Ergo ex omnibus signis , ut de singulis morbis singula præscripta sunt , & morituros , & eos , qui ad bonam valetudinem redire poterunt , five pueri sint , five natu majores , sic conijcere oportet.

XXXVII. Atque hæc de acutis morbis , atque de his , qui ab iis nascuntur dixisse velim.

XXXVIII. Cæterum si recte discernere volueris , & morituros , & eos , qui à periculo tuti sunt , & quis morbus longo , & quis breviori spatio finietur , disce omnium signorum inter se collatorum vires , ut supra demonstravimus , accurate judicare , tum aliorum , tum præcipue urinæ , ac sputi , quum scilicet simul & pus , & bilem æger excreat.

XXXIX. Item *populariter grassantium* quoque morborum impetum , ac temporum anni conditionem accurate observare oportet.

XL.

XXXVIII. *Cæterum.* Attendenda sunt maxime salutis , & mortis signa , singulique signi æstimandæ sunt vires , considerando , an id periculosum sit , an admodum periculosum , an lethale , an admodum lethale , & è contra. Tum cum bonis bona signa conferes , cum malis mala ; & bona cum malis , & mala cum bonis : neque uni lethali signo fidendum ad mortem prædicendam , sed pluribus : neque pluribus bonis ad salutem , si quod lethale signum subesse videris. Quodlibet enim signum , five bonum , five malum , confirmatur consensu reliquorum signorum. Consensus quippe signorum evidentem , *ut ait Vallesius* , prænotationem efficit salutis , aut mortis. Ut si adest unguium livor , atque simul facies Hippocratica , ulcus nigrum , revulsa genitalia , spiritus frigidus , frigusque extremorum , mors sit præ foribus , sin cum unguium livore ægrotus dormiat , facile spiret , ac calidum , sine facie tristi , sine delirio , sine extremorum frigiditate , sine jactatione corporis , sineque aliis , quæ his similia sunt , signis pravis , fallax sit livor. *Quum scilicet v. text. LIII. lib. II.*

XXXIX. *Populariter.* Epidemici morbi dicuntur , & communes , è communi causa nati , non tamen patrii , & familiares , sed potius externi , & adventitii , *v. Gorraus* , qui solent

XL. Poſtremo quod ad conjecturas, reliquaque ſigna pertinet, haudquaquam vel ignorandum, vel negligendum eſt, quod quovis anno, & quovis anni tempore, mala ſigna timorem, utilia vero bonam ſpem denunciant.

XLI. Etenim in Libya, & Delo, atque Scythia propoſita hæc ſigna, vera eſſe comprobavimus.

XLII. Unde ſcire licet, iisdem terris multo plura, quam ſupra propoſuimus, illum facile aſſequi poſſe, qui ea recte & judicare, & perpendere didiſcerit.

XLIII.

lent ſignis ſive bonis, ſive malis quicquam virium addere, aut detrachere. Idem fere dicendum de ætatè ægri, natura, viribus, deque anni temporum conſtitutionibus. Equidem in lethalibus pectoris inflammationibus populariter graſſantibus, perſæpe inter plurimas pleuritides initio gravioreſ periculoſioresque, plures quoque earum deprehendi, quæ cum per initia, id eſt, primis morbi diebus, mitiores viderentur, longeque à lethalibus cæteris diverſæ, quarta tamen, quintave morbi die feritatem oſtendere cœperant, brevique ægotantes, atque eodem prope numero dierum rapiebant, quo reliquæ, quæ per initia morbi ſævirent.

XLI. *Libya.* Quæ bona, aut mala ſunt ſigna, ea non modo quovis anno, & anni tempore, ſed quavis etiam regione mala ſunt; nimirum & in Libya, ardentiffima regione, & in Scythia frigidiffima, & in Delo temperata. *Vera eſſe.* Cum enim in ſingulis locis homines ſinguli à ſingulis non differant hominibus in præcipua internarum partium ſtructure, uſu, numero; naturæ quoque judicia non differre ob locorum diverſitatem veriſimile eſt. Etenim ſigna, quæ ſalutaria, lethaliaque eſſe Hippocrates ſcripſerat, non minus æſtate reſpondent, quam hyeme, non minus vere, quam autumnò, non minus aère ſereno, quam pluvio, neque minus perſſantibus, quam ſilentibus ventis. Igitur & ubique terrarum ſigna per morbos bona, malaque eventu conſentire, æquum eſt, licet non ubique locorum idem ſit caloris, & frigoris gradus, eademque ſiccitas, atque humiditas. Cum enim Delum peragraverit, Lybiamque, & Scythiam Hippocrates, ſigna que à ſe propoſita in ſingulis hiſce locis vera eſſe cognoverit, haud inſcite argumentum nobis reliquit de univerſa terra.

XLIII. Sed nullius morbi hic non descripti nomen considerandum est: nam omnes, qui in dictis temporum spatiis, morbi finiuntur, iisdem quoque indiciiis discernuntur.

XLIII. Sed nullius. Id est, non est quod desideres scire singula morborum nomina, quibus proposita signa convenient: nam horum plurima communia sunt, tum acutis morbis, tum iis quoque, qui ex acutis decidunt, aut ex iisdem nascuntur; ideo ex his ipsis signis cognosces, quisnam morbus 4. exempli gratia, die finiendus sit, aut 7. aut 14. aut 20. & quisnam salutem allaturus, aut mortem.

FINIS.



ERRATA, SIC CORRIGENDA.

Praefatione linea 29. præfangiendi, *leg.* præfagiendi. *Ead.* Praef. pag. 4. linea 28. qui ac medicinæ Studium, *leg.* qui ad medicinæ Studium. *Ibid.* Adjectio multo locupletiori, *leg.* adjectio multo locupletiori. Pag. 5. linea 9. quo Celsus recitat, *leg.* quos Celsus recitat. Pag. 5. nota 11. extenuitis, *leg.* extenuatis. Pag. 6. nota 12. quam morbum lateralem appellat, *leg.* quæ morbus lateralis appellatur. Pag. 11. nota 3. circa finem. Qua de me liceat mihi meminisse materteræ, *leg.* Quare de mea liceat mihi meminisse matertera. Pag. 19. linea 17. formidabilis vigiliam, *leg.* formidabilis vigilia. Linea 18. neque longum somnum, *leg.* neque longus somnus. Pag. 26. nota 7. linea 8. conquiescite, *leg.* conquiescere. Pag. 28. nota 11. opthalmios, *leg.* opthalmias. Pag. 29. Sent. 17. contendunt, *leg.* compingunt. Pag. 33. Sent. 1. veredi, *leg.* vereri. Pag. 34. linea 11. notura, *leg.* natura. Pag. 34. nota 4. lin. 15. ulio, *leg.* ullo. Pag. 35. linea ultima, nota 5. sanguinæ, *leg.* sanguine. Pag. 42. linea 22. fornicans, *leg.* formicans. Linea 23. exilis sit, *leg.* exilis fit. Pag. 43. linea 33. Mercuriales, *leg.* Mercurialis. Pag. 44. nota 26. seu gelatinosas pars, *leg.* seu gelatinosa pars. Pag. 47. nota 28. linea 3. obstrictionem, *leg.* obstructionem. Pag. 49. nota 46. linea 7. me in rigore deficiat, *leg.* ne in rigore deficiat. Pag. 50. nota 47. linea 7. exereunt, *leg.* exeunt. Pag. 53. nota 58. linea

19. supor, *leg.* sopor. Pag. 57. nota 66. linea 9. hæmorrhagiasque, *leg.* hæmorrhagiasque. Pag. 58. nota 70. linea 11. fina, *leg.* signa. Ibid. nota 71. linea 4. in infirma, *leg.* in infima. Pag. 61. nota 79. linea 6. fabulosa, *leg.* fabulosa. Pag. 62. nota 1. linea ultim. sætumque ejicientibus, *leg.* fœtumque ejicientibus. Pag. 63. nota 5. linea 7. alterotriusque, *leg.* alterutriusque. Pag. 66. lin. 3. nota 11. sed quæ isthæc, *leg.* sed necque isthæc. Pag. 67. nota 14. linea 11. secto andavere, *leg.* secto cadavere. Pag. 68. nota 16. linea 8. ubi Animam efflavit, *leg.* ibi Animam efflavit. Pag. 71. nota 30. linea 9. varioris, *leg.* variolis. Pag. 72. Sent. 33. menstruis deficientibus, *leg.* Mulieri menstruis deficientibus. Pag. 73. nota 43. linea 6. ureri, *leg.* uteri. Pag. 90. nota 18. lin. 10. oræ, *leg.* ora. Ibid. linea 11. exteriori ventris vulneri, *leg.* exteriora ventris vulnera. Pag. 91. nota 22. linea 3. ex violenti ictu, *leg.* ex violento ictu. Pag. 92. nota 25. linea 6. Erysipelus, *leg.* Erysipelas. Pag. 93. Sent. 27. utuntur, *leg.* uruntur. Pag. 93. nota 27. linea 1. vomice, *leg.* vomica. Pag. 95. nota 21. linea ultima, egelidas, *leg.* egelida. Pag. 99. Sent. 43. ad dysenteria, *leg.* à dysenteria. Pag. 98. nota 41. lineis 4. & 6. potes, *leg.* potest. Ibid. deprehendere, *leg.* deprehendi. Pag. 147. nota 35. linea 7. Caput dolore, *leg.* Caput dolere. Pag. 164. nota 50. linea 14. summotoque, *leg.* semmotoque. Pag. 10. nota litter. b. linea 7. Democriteam philosophiam, *leg.* Democritea phylosophia. Ibid. Herodicique medicinam, *leg.* Herodicique medicina. Pag. 11. linea 3. Laterius, *leg.* Laërtius. Pag. 193. linea 5. judicat, *leg.* indicat. Pag. 173. Sent. 70. linea 3. transeunt, *leg.* transeunt. Pag. 177. in fine notæ 4. suppurari deberent, *leg.* supputari deberent. Ibid. nota 5. linea 9. suppuraveris, *leg.* supputaveris. pag. 180. Sent. 14. vehementique, *leg.* vehementique. Ibid. nota 14. linea 6. exemplo, *leg.* extemplo. Pag. 181. nota 15. linea ultima; aperiabaturque, *leg.* aperiebaturque. Ibid. nota 17. linea 2. inferius, *leg.* inferius. Pag. 182. Sect. 19. prolungatur, *leg.* prolongatur. Pag. 209. damnantur, *leg.* damnatur.

*Plura ex his errata, & alia si forte apparuerint,
originalis libeli vitio tribuat Lector.*

APHORISMORUM, PRÆSAGIORUMQUE HIPPOCRATIS INDEX,

*In quo numerus romanus sectionem, vel li-
brum iudicat; arabicus sectionis, vel libri
textum: litera p. præfagia, n. notas
ad textum designat ap-
positas.*

- A** *Bortus quibus in mulieribus facilis. V. 44. 45.
Abscessus quid. IV. 31. n.
In debili parte excitatur. IV. 32. 33.
Hunc prænunciant lassitudines. IV. 31.
Quid eundem impediat. IV. 33. n. 75.
Abscessus febrem non solventes, longitudinem præfagiunt.
IV. 51.
In febribus sunt continuis. p. III. 28.
Qua potissimum ætate expectandi. p. III. 25. 27. 29.
Frequentiores in pueris. Ibid. 34. n.
Quibus febris diebus accidant. Ibid. 26.
Hieme facilius excitantur, seriusque finiuntur.
Ibid. 30.
Qua in parte expectandi. VII. 36. p. II. 66.
In peripneumonia utiles ad crura. p. II. 67.
Suppurantes perraro in peripneumonia occurrunt. Ibid.
64. n.
Iis tamen eadem interdum discuitur. Ibid.
Abscessu intro recurrente, aut delirii metus est, aut mortis.
p. II. 68.
Abscessus futuri signa. Ibid. 65.
Accessio febris. I. 11. n.*

Acidum eructantes, raro fiunt pleuritici. VI. 33.

Acutas febres, aëris gignit siccitas. III. 7.

Acuti morbi quinam. II. 19. n.

In quatuordecim diebus judicantur. Ibid. 23.

Et quinam inter eos. Ibid. n.

Exitus praesagium omnino certum non habent.

II. 19. n.

Purgationem plerumque rejiciunt. I. 24.

Adolescentes inedia difficulter ferunt. Ibid. 13.

Adolescentium morbi. III. 19. 29.

Aeris aestus forriora purgantia non patitur. IV. 5. n.

Siccitas quos morbos pariat. III. 16.

Humiditas quos gignat. Ibid.

Aestas, corporisque gracilitas vomitui favent. IV. 6.

Similis veri sudores in febribus portendit. III. 6.

Aestatis morbi. Ibid. 21.

Aestus vehemens, morsusque oris ventriculi in acuta febre pessimus. IV. 65.

Aetas opportuna phthisi. V. 9.

Aetate plures morbi curantur. III. 28.

Aetates ad alia bene, maleve se habent. Ibid. 3.

Alvi fluxus comitatus hydropem. p. II. 2.

Lethalis in tabidis. V. 12. 14.

Non semper proximam mortem denunciat. Ibid. 12. n.

Ex longo morbo malus. VIII. 5.

Alvi profluvium vomitus solvit spontaneus. VI. 15.

Alvus in juvenibus humida, iis senescentibus exsiccatur, & e contra. II. 20.

Mollis in juvenibus sicca salubrior. Ibid. 53.

Angina latens. p. III. 17.

Periculosissima, celeriterque jugulat. Ibid.

Angina ad pulmonem versa delirium, suppurationemque movet, saepeque etiam interimit. V. 10. p. III. 21. n.

Angina superveniens tumor in collo, bonum. VI. 37.

Interdum etiam, malum. Ibid. n.

Anginam saepe levat colli, pectorisque rubor. p. III. 19.

Rubor idem evanescens sine ratione, aut mortem, aut mor-

- morbi exasperationem significat. Ibid. 20.
 Angina apud nos benigniores incidunt. p. III. 21. n.
 Angina affectum tumor in pectore, ruborque juvat. VII. 49.
 Anxii qui dicantur. p. I. 19. n.
 Anxietas quando lethalis. IV. 65. n. p. I. 19. n.
 Apoplexia fortis quanam. II. 42. n.
 Hanc solvere est impossibile. Ibid.
 Debilis quanam. Ibid.
 Hac quoque soluta difficilis. Ibid.
 Apoplexia redivit in senibus facilis. II. 42. n.
 Signa ejusdem futuri redivit. Ibid.
 Apoplexia ætas opportuna. VI. 57.
 Aqua qua levissima. V. 26.
 Aqua ex hydropicis educi potest affatim, universimque.
 VI. 27. n.
 Aqua repleti anteriores cerebri ventriculi. p. III. 12. n.
 Aquilonis mali effectus. III. 5. 17.
 Ascarides vermes. III. 26. n.
 Ascites hydrops. VI. 27. n.
 Asthma quid. III. 22. n.
 Attra bilis lethalis, morbo inchoante. IV. 21.
 In extenuatis postridie occidit, interdumque eadem die.
 Ibid. 23.
 Attra bilis eruptio solet reverti. Ibid. 22. n.
 Malitiam non tam color, quam accidentium gravitas
 declarat. Ibid.
 Auris dolor cum febre vehementi, assiduaque formidandus.
 p. III. 14.
 Delirium facile movet. Ibid.
 Suppuratione in juvenibus sæpe solvitur. Ibid. 15.
 Interdum quoque hæmorrhagia. Ibid. n.
 Austri damna. III. 5. 17.
 Autumni morbi. III. 22.
 Autumno morbi acutissimi. Ibid. 9.
 Autumnus tabidis malus. Ibid. 10.

B

- B** Albi ad alvi fluxum proclives. VI. 32.
 Biliosa dejectiones cessant, superveniente surditate, &
 e contra. IV. 28.
 Bubo quid. IV. 55.
 a Bubone febres malæ præter diarias. Ibid.

C

- C** Achexia, malus habitus. III. 31. n.
 Calidum quæ mala pariat. V. 16.
 Ejus salutatis effectus. Ibid. 22.
 Calor ubi, aut frigus, ibi morbus. IV. 39.
 Caloris, frigorisque mutationes, longitudinem morbi signi-
 ficiant. Ibid. 40.
 Cancer quid. VI. 38. n.
 Occultus curari non debet. Ibid.
 Quisnam sit curandus, & quomodo. Ibid. n.
 Capitis dolor ex aëre. III. 13.
 Febri quandoque curatur. VI. 51.
 Quenam febris, & quando invadens id ipsum præstet.
 Ibid. n.
 Cum acuta febre perniciosus. p. III. 12.
 Lethalis & ejus signa. Ibid. n.
 Quibus diebus finiatur. p. III. 32.
 Bilis vomitu sæpe depellitur. Ibid. 31.
 Solvitur etiam interdum abscessu, interdum hæmorrhæ-
 gia. p. III. 12.
 Quando vomitu, quando fluxu sanguinis tollatur. Ibid. 34.
 Mensium quoque eruptione cessat, alvi fluxu, spuris aliis-
 que. p. III. 13. n.
 Capitis dolori quid profit. VI. 10.
 Capitis dolorem prænunciant urine perturbata. IV. 70.
 Capitis lethalis per morbos motus. p. I. 15. n.
 Catarrhi in valde senibus, difficulter coquuntur. II. 40.
 Cito senes extinguentes. III. 12.

- Quot diebus coquantur.* VII. 38.
- Cautiones in purgandis corporibus.* IV. 1. n.
- Cerebri concussi accidentia.* VII. 58.
- Cholera.* III. 30. n.
- Cibi fastidium in longa dysenteria malum.* VI. 13.
- Cibi quibus temporibus facilius, quibus acrius ferantur.*
I. 18.
- Cibo leduntur impura corpora.* II. 10.
- Cibus in accessione febrium noxius.* I. 11.
- Copiosior morbum facit.* II. 17.
- Febricitanti morbus.* VII. 62.
- Snavior insuavi, licet meliori, preferendus.* II. 38.
- Circuitus febris quid.* I. 11. n.
- Cocti, non crudi, sunt humores purgandi.* I. 22.
- Coctionis signa in urina.* p. II. 26. 27.
- Colli perversio sine tumore in acuta febre, lethalis.* IV. 35.
- Comedentem a morbo non proficere, malum.* II. 32.
- Comitiales morbi, si in pubertate non desinunt, post 25.
ann. raro curantur.* V. 7.
- Conceptus signa.* Ibid. 62.
- Consistere morbum quid sit.* I. 10. n.
- Consueta, quamvis deteriora, minus insuetis molesta esse
solent.* II. 50.
- Consuetudo observanda in victus ratione.* I. 16.
- Convalescentes a morbo, cibus non proficere quid significet.*
II. 8.
- Si non proficiant cibum fastidientes, purgandi fiunt.* Ibid.
- Convulsio quid.* II. 26. n. VI. 56. n.
- Ex vigilia proficiens, malum.* VII. 18.
- Sape febris superveniente solvitur.* II. 26. n. IV. 57.
- Quenam eam non solvat febris.* Ibid.
- Febris ad eam ipsam solvendam apta.* Ibid.
- Mala febris superveniens.* II. 26.
- Hac tamen in pueris minus formidanda.* Ibid.
- Convulsiones evanescere solent, variolis erumpentibus, quae
sub easdem variolas excitantur.* VII. 41. n.
- Interdum occidunt, puerulos quia eos invadunt die.* Ibid.

In febris variolarum secundariis, sapissime pueros jugulant. Ibid.

Lethales quam. V. 2. n.

Convulsionibus quartana prodest. V. 70.

Convulsionem movens cholera. Ibid. 4. n.

Convulsionis causae ex Hipp. VI. 39.

Convulsio ex elleboro, lethalis. V. 1.

Itemque ex vulnere. Ibid. 2.

Ex fluxu muliebri, mala. V. 56.

Ex nimia purgatione, mala. Ibid. 4.

Per somnum in acuta febre, mala. IV. 67.

Convulsio in acuta febre, viscerumque dolor, malum. IV. 66.

Corpora crassiora difficulter ferunt purgationem. II. 36. 37.

Crassiora citius intereunt. II. 44.

Longo morbo exstenuata, lente reficienda. II. 7.

Corporis, ejusque partium gravitas per morbos acutos periculosa. p. II. 7.

Exstenuatio in morbis nimia, aut nulla, malum significat. II. 28.

Proceritas senibus inutilis. Ibid. 54.

Corporibus humidis, fames convenit. VII. 59.

Corpus aequaliter calidum, molleque bonum. p. II. 5.

Plenus, ac succulentius periculosum. I. 3.

Hoc ipsum quantum debeat minui. Ibid.

In morbis ipsum per se converti, ac facile, surgere bonum. p. II. 6.

Crisis quid. II. 13. n.

Duas habet partes. Ibid.

Futurae signa. I. 8. n.

Crisi imperfecta fere morbus recrudescit. II. 12.

Crisin praecedit nox gravis, leviorque sequitur. Ibid. 13.

Crisium salutarium signa. I. 2. n.

Cucurbitula mammis adhibita, menses reprimit. V. 50.

D

D*Ecubitus pronus quid significet. p. I. 22.*

Supinus qualis malus. Ibid. 17. 21.

- Defectio animi ex fluxu muliebri mala.* V. 56.
Deglutitio impedita sine difficultate spirandi, aliquando lethalis. IV. 35. n.
Dejectio sincera quanam. VII. 6. n.
In morbo diuturno mala. Ibid.
Nigra pessima. IV. 21.
Interdum tamen hac quoque salutaris. Ib. n.
Frequens agrotum fatigat. p. II. 14.
Respondere ingestis debet. Ibid. 15.
Crassescere quoque in fine morbi. Ibid. 16.
Periculosa quanam. p. II. 20.
Quanam damnanda. Ibid. 21.
Dejectionem sinceram, dysenteria subsequens, malum. VII. 13.
Dejectiones quanam bonæ. I. 2. n. 23. n.
Mala quanam. II. 14. n.
Biliofa cessant, surditate superveniente. IV. 28.
Delirii futuri signa in pleuritide. VII. 12. n.
Delirium in absurdis sermonibus non semper consistit. II. 6. n.
Cum difficili spiritu in acutis febribus fere lethale.
 IV. 50.
Delirium, spiritus difficultas, vigilia una ingruentes signa sunt exitiosa. p. III. 9. n.
Deliria cum risu iis, quæ cum studio fiunt, securiora. VI. 53.
Cum temeritate periculosissima. Ibid. n.
Furibunda, & lacrimosa deteriora iis, quæ cum risu fiunt, minus vero mala quam studiosa. Ibid.
Dentium nigrities in acutis febribus gravissima. IV. 53. n.
Stridor in acutis sine consuetudine pessimus. p. II. 24.
Destillationes, catarrhi, ubi probabiliter pro apoplexia accipiantur. III. 12. n.
Dies critici propriè sunt septenarii. II. 24.
Dies intermedii indices, & propriè critici. IV. 36.
Difficultas urinæ. III. 31. n.
Suppurato, ruptoque meatus urinarii tuberculo solvitur.
 VII. 57.
Difficultatem urinæ, venæ sectio solvit. VI. 36.
Digiti, pedesque lividi in acutis morbis periculosi. p. II. 9.
 Dis-

Dispersus pedum, brachiorumque in acutis malum ostendit.
p. I. 19.

Distentio nervorum. IV. 57. n.

Divinum in morbis quid. p. I. 7. n.

Dolor sine ratione in acutis evanescens, delirii est indicium.
II. 6. n.

Vehemens, minus vehementem obscurat. II. 46.

Ingravescit, dum pus conficitur. II. 47.

Ventris, lumborumque pertinax in hydropem siccum desinit. IV. 11.

Aurium in acuta febre periculosus. p. III. 14.

Ventris diuturnus cum febre suppurationem movet.

VII. 22.

Viscerum, & convulsio in acuta febre, malum. IV. 66.

Acutissimus in graviore pleuritide ferè funestus. p. II.
31. n.

Dolorem, qui omnind non sentiunt, delirant. II. 6.

Capitis posteriorem, sectio venæ frontis levat. V. 68.

Dolori capitis quid profit. VI. 10. p. III. 12. 13. 31. 34.

Dolores oculorum solventia. VI. 31. VII. 46.

Partium inferiorum occultati in acutis febribus perniciosi. p. II. 70. n.

Pessimi, si relictis inferioribus partibus, diaphragma occupent. Ibid.

Pleura, pulmonumque sæpè suppurationem inducunt.
p. II. 52.

Dysenteria. III. 2. n.

Ab atra bile, lethalis. IV. 24.

Ex alvi profluvio. VII. 72.

Dysenteria diuturna lethalis exitus. VI. 43.

Dysenteriam lienteria secuta. VII. 73.

E

E *Brietas quando lethalis.* V. 5.

Ex ebrietate rigor, & desipientia, malum. VII. 7.

Elleborus periculosus in præpinguibus. IV. 16.

Em-

Empyi qui dicantur. Ibid. 44. n.

Empyici quum secantur , quale pus securitatem , quale periculum ostendat. VII. 44.

Empyicorum secandorum modus , tempusque ad id aptum. Ibid. n.

Epilepsiam juvenum, quæ tollant. II. 45.

Erisipelas in osiis nudatione. VII. 19.

Intro recurrens , malum. VI. 25.

Putrescens , suppuransque , malum. VII. 20.

Evacuationes an profuturæ sint , necne , ante morbi exitum , scitu difficile. I. 1. n.

Per loca conferentia faciendæ. I. 2. n.

Ubi nec tollunt , nec minuunt morbum , tamen sustentur , quid agendum. Ibid.

Evacuacioni nimie quomodo occurrendum. I. 22. n.

Evacuacionum salutarium signa. I. 2. n.

Perniciosarum indicia. II. 27. n. & IV. 1. n.

Evenientibus præter rationem , non fidendum. II. 27.

Evenientia præter rationem , nimium non sunt formidanda. Ibid.

Excrementa alvi, quænam laudanda. p. II. 13.

Varia , ut mortem differant , tamen lethalia. Ibid. 23.

Excrementorum mutationes ad bona juvant. II. 14.

Exercitatus homo liberalius alendus. I. 15.

Excreationes in febribus lividæ , malæ. IV. 47.

Exsolutio quid. II. 41.

Frequens , ac fortis , sine causa manifesta repente occidit. Ibid.

F

Facies Hippocratica non semper præcedit mortem.
p. I. 9. seqq.

Cc

Mor-

Mortem precedens qui cognoscatur. Ibid. II. n.

Quibus in morbis, quibusque morbi temporibus appareat. Ibid. 12. n.

Restituta non semper sanitatem promittit. Ibid.

In morbis longis, pluribus ante mortem diebus, quam in acutis, apparet. Ibid.

Fames humidis confert corporibus. VII. 59.

Quibus inimica. Ibid. n.

Famem quinam difficulter ferant. II. 4. n.

Fauces quid. IV. 34. n.

Faucibus non tumidis strangulatio per acutas febres lethalis. Ibid. 34.

Faucibus ægrotantibus quid observandum. II. 15.

Febris ardens. IV. 58.

Raro senes invadit. II. 14.

Invadens eos ferè occidit. Ibid. n.

Febris intermittens, erraticaque, facile in quartanam mutatur. p. III. 28.

Febris ephemera. IV. 55. n.

Convulsionibus utilis quænam. IV. 57. n.

Febres in senibus, licet parvæ, magni faciendæ. I. 14. n.

Quænam abscessus gignant. IV. 31. n.

Tertio quoque die fortiores, magis periculosæ. IV. 43.

Continuæ, si intermiserint, periculo vacant. Ibid.

Autumnales, & compositæ, in quæ mala transeant. IV. 43. n.

Intermittentes quos valeant interficere. Ibid.

Longæ, tumores in articulis gignunt. IV. 44. p. III. 24.

Ex bubonibus malæ præter ephemeræ. IV. 55.

Intermittunt, quæ quotidie a rigore incipiunt. Ib. 63.

Tutissimæ cito liberant. p. III. 2.

Pessimæ cito enecant. Ibid.

Febrinum accessiones eadem hora incidentes , difficiles.

IV. 30.

Recrudescentium causse. p. III. 23.

Perquam acutissimarum , aliarumque circuitus. Ibid.

3. seq.

Flatum sine strepitu exire in morbis , bonum. p. II. 24.

Cum sonitu , prater voluntatem , erumpere quid arguat. Ibid.

Frigiditas extremorum cum interno aestu , siti , acutaeque feбри , lethalis. IV. 48. p. II. 4.

Frigido ubi utendum. V. 23.

Frigidum quibus partibus , morbisque inimicum. V. 17.

18. 20. 24.

Frigoris noxa. V. 17.

Frigus extremorum in acutis malum. VII. 1.

Cum aliis signis conjungendum ad mortem prædicendam. VIII. 13. n.

Furor , mania , quid. VI. 56. n.

Furori quenam salutaria. VII. 5.

Melancholico hæmorrhoides , varicesque prosunt.

VI. 21.

G

G*Enarum pallor , aut livescences , nigricantesque in iis venule per acutos morbos , malum. p. II. 13.*

Glaucedines senum morbi. III. 31.

Graciles diutius vivunt obesis. II. 44.

Graciles , & facile vomentes supra purgandi. IV. 6.

Gravedines , & rancedines difficulter solvuntur in senibus. II. 40.

Gravedo quid. Ibid.

Gravida , collapsis repente mammis , abortit. V. 37.

Bene colorata marem, male feminam concepit. Ib. 42.

Laborans tenesmo, plerumque abortit. VII. 27.

Ex alvi fluxu, periculum subit abortus. V. 24.

Gravidam acutus morbus persape occidit. Ibid. 30.

Gravida quenam facile abortiant. Ibid. 44. 45.

Gravidis, uteri lethale erisipelas. Ibid. 43.

Gravidarum purgandarum tempus. IV. 1.

Gumorum sanguinis mictus. IV. 80.

Gurgulio quid. p. III. 22.

Inflammatu, tumensque, qua ratione curandus. ibid.

H

H *Æmorrhoides, varicesque juvant maniacos. VI. 21.*

Hæmorrhoidibus curatis quenam insistent pericula.

Ibid. 12.

Hepatis inflammatio singultum movet. V. 58.

Hyeme, & vere liberius alendum. I. 15.

Hyemis morbi. III. 23.

Hippocrates Heraclitum sequitur. I. 14. n.

Hippocratis dictata, ubique terrarum veritati consentiunt. p. III. 41. n.

Historia mulieris quinque menses continenter vigilantis.

II. 3. n.

Virginis sine potu, ciboque degentis dies amplius viginti. II. 4. n.

Mulieris vulvulo affecta, vinoque epoto sanata. Ibid.

21. n.

Pleuritici sexta die mortui, bile erumpente atra.

IV. 22. n.

Dysenterici atra bilis exitu sublata. Ibid.

Februm lethalium quotidie cum rigore accedentium.

IV. 63. n.

Mu-

Mulieris perturbatam urinam emittentis, savissimoque capitis dolore tentata. Ibid. 70. n.

Ebriorum obmutescentium, resolutorumque, qui discussa ebrietate, in integrum restituebantur. V. 1.

Viri ob ossa articularum reposita, convulsione correpti, extemploque sanati, dimotis e sede ossibus. Ibid. 2. n.

Senis nervorum distentione occupati, interemptique.

V. 6. n.

Virginis phthisica, toto trimestri sine tussi, sputoque degentis. Ibid. 14. n.

Senis, cui angina ad pulmones versa, vitam eripuit.

V. 10. n.

Virginis ex spontaneo timore in apoplexiam delapsa.

VI. 23. n.

Ascitica mulieris, e cuius ventre unico ictu, salutarique exitu, mille, & triginta uncia aquae pondo educebantur. Ibid. 27. n.

Filiolae auctoris dentientis, convulsionibusque vita privata, qua iis die tentari coepit. VII. 41. n.

Hydropici tussis impetu, nec opinantis extincti. VI. 35. n.

Mulieris, cui hydrops tussim dispulit. Ibid.

Virginis cui tussis exporrigebatur ad solutionem usque hydropis. VI. 35. n.

Theologi, cui urina supprimebatur quolibet fere plenilunio, neque restituebatur, nisi aut luna declinante, aut vena secta. Ibid. 36. n.

Lethalis anginae cum insigni colli, aliarumque partium tumore. VI. 37. n.

Juvenis empyici sine ulla tussi, spirandique difficultate. Ibid. 41. n.

Virginis, cui solutus fuit icterus, nec inde tamen emoluitum hepar. VI. 42. n.

Viri, cui vesica calculus cibi fastidium movebat, ac vomitum. Ibid. 44. n.

Morborum, quibus auctor tentatur. VI. 51. n.

Viri, cui vesica multa urina, licet mingeret, distendebatur cum assiduo vomitu, cibique fastidio eductaque uri-

- na rediit appetitus, vomitusque discessit. Ibid. 4. n.
 Vomitionis animi defectionis, sensuum defectus ex vomica in pulmone rupta. VII. 8. n.
 Virginis vomica in pulmone rupta, extemplo jugulata. Ib.
 Mulieris ex utero inflammato, post partum, vulvulo interfecta. Ibid. 10. n.
 Mulieris lethali peripneumonia laborantis, quæ interea dum phrenitica fiebat, neque difficulter spirabat, neque iussiebat. Cessante phrenitide, peripneumonia recruduit, citoque mulierem rapuit. Ibid. 12.
 Mulieris gravida hemicrania occisa. p. III. 12.
 Viri, dolore capitis oppressi, comateque, & apoplexia subsecutis extincti. Ibid. 31. n.
 Virginis per acutam febrem, dies, noctesque undecim vigilantis, nec inde delirio, aut convulsione tentata. VII. 18. n.
 Hepatis suppurati cum dolore mitri, mittique febris. Ibid. 45. n.
 Tumoris in musculis, hepatis superpositis, siti insignis, laticque pus cœnosum, fœtidumque fundentis, hominemque enecantis. VII. 45. n.
 Lethalis similis, alius tumoris in musculis lienis superstratis excitati. Ibid.
 Viri sanguinem extusientis, postridieque suffocati. Ibid. 75. n.
 Adolescentis febris ad tactum parva, corporisque, atque artuum impotentia laborantis, brevique postea tussi, stertoreque correpti, mortuique. p. II. 17.
 Pleuritis, cui pridie ante mortem maxima incidebat, inanisque deijciendi cupiditas. Ibid. 13. n.
 Mulierum urinam reddentium nigram, ex eaque convalescentium. Ibid. 32. n.
 Mulieris sputo interempta nigro, inodoroque. Ib. 48. n.
 Doloris intolerabilis, ne morientem quidem pleuriticum deferentis. Ibid. 51. n.
 Humores, quo vergunt, ducendi, evacuantique. I. 21. & IV. 4. n.

Hydrops ascites. VI. 27. n.

Sictus, sive tympanitis. IV. 11:

Hydropem, alvi profluvium valet solvere. VI. 14.

Hydropi inveteratior, ussis superveniens lethalis. VI. 35.

Hydropici quinam, & quando purgandi. Ibid. 14. n.

Ex acuto morbo facti, admodum periclitantur. p. II. 1.

Hydropicos quosnam tussis vexet. p. II. 3.

Hydropicorum tympanitide extinctorū observatio anatomica.

IV. 11. n.

Hydropis sicci imminentiis signa. Ibid.

Hypochondria mollia, & sine dolore esse in acutis optimum indicium est. p. I. 31.

Hypochondriorum dolores, elevationesque, sine febre, sæpè flatuum eruptio solvit. p. II. 25.

Hypochondriorum pulsus delirium minatur. p. I. 32.

Tumores inflammatorii per initia morbi, mortem proximam portendunt. Ibid. 34.

Iidem tumores post 20. dies, solent suppurari. Ibid.

Hæmorrhagia 7. orta die, us ipsis prodest tumoribus.

Ibid. 35.

I

Icteritia. IV. 62.

Febri superveniens, quænam bona, & quando. Ibid. 64.

IctERICI non multum flatuosi. V. 72.

Ictericis hepar indurescere, malum. VI. 42.

Ileos quid. Ibid. 44. n. VII. 10. n.

Ex eo, singultus, delirium, convulsio, malum. VII. 10. n.

Impetigines. III. 20. n.

Inædia plurium dierum. II. 4. n.

Ischiadicorum curatio, ne claudicatio consequatur. VI. 60.

Judicatio morbi. I. 20.

Judicii difficultas, unde pendeat. Ibid. 1. n.

L

Labrorum signa mortifera. VIII. 14. p. I. 15.

Quibus præsertim in morbis. Ibid. n.

- Lac copiosus, imbecillum foetum significat.* V. 52.
Extra graviditatem, puerperiumque, interdum gignitur.
Ibid. 39.
Epotum quibusnam noxium. *Ibid.* 64.
Lacryma non voluntaria, per acutos morbos, mala. V. 52.
Lassitudines spontanea quanam. II. 5. n.
Abscessum portendunt. *Ibid.* 31.
Lentores in febribus circa dentes, dentiumque nigrities
acutum, gravemque morbum significant. *Ibid.* 53. n.
Lethargus. III. 23. n.
Lethargicorum tremor, malus. VIII. 8.
Leucophlegmatia, ascite curatu faciliior. VI. 14. n.
Forti alvi fluxu solvitur. VII. 29.
Lienosi, quinam. VI. 43. n.
His, dysenteria utilis. *Ibid.* 48.
Lienteria. III. 22. n.
Lingua nigra, cruentaque, & sicca, in acutis mala.
VIII. 9. n.
Linguae incontinentia quid significet. VII. 40.
Linguae lethalis motus in morbis. p. I. 15. n.
Lumbricos, cum excrementis exire, sub morbi finem exped-
dit. p. I. 18.
Eosdem ne praestet vivos descendere, an mortuos? *Ibid.* n.

M

- M** *Alus habitus.* III. 31. n.
Mammae repente exstenuata, quid praesagiant. V. 53.
Mania, v. Furor.
Manibus scalpere in acutis lethale. p. I. 26.
Non tamen id ipsum perpetuo lethale. *Ibid.* n.
Medico considerata. VII. 76. n.
Melancholia. VI. 56. n. III. 20. n.
Melancholiam quinam sequantur morbi. *Ibid.*
Melancholici quinam fortius purgandi. IV. 9. n.
Melancholicis haemorrhoides utiles. VI. 11.
Menses decolores, inordinatique. V. 36.

Men-

Mensium eruptio sanguinis sputum, vomitumque tollit. lb. 32.

Misio sanguinis, ad animi deliquium damnantur. I. 23. n.

Morbi principium quodnam. Ibid. 24. n.

An purgationem postulet. II. 29.

Morbi reversuri signa. Ibid. 12. n.

Sedem, non urina, sed partis labor indicat. IV. 76. n.

Vigor, sive status. I. 8. n.

Morbi acuti quinam. II. 19. n.

Purgationem ferè respiciunt. Ibid.

In 14. diebus judicantur. Ibid. 23.

Longi, vix curantur in senibus. Ibid. 39.

Morbi, à nimia pluvia. III. 16.

A nimia siccitate. Ibid.

Puerulorum. III. 24. 25.

Adolescentium. Ibid. 19. 29.

Senum. Ibid. 31.

Ex acutis decedentes. p. III. 6. n.

Longi quinam. II. 39. n. p. III. 6. n.

Morbi comitialis varia nomina. III. 20. n.

Morbo incipiente non purgandum. I. 22.

Morbis vigentibus quiescendum. II. 29.

Morborum acutorum, non omnino certum presagium salutis, aut mortis. Ibid. 19. n.

Morborum, in mulieribus dies, an à partu sint numerandi. p. III. 11.

Populariter grassantium, ratio maximè attendenda. Ibid. 39. n.

Morbus simpliciter acutus. I. 4. n.

Peracutus. Ibid. 7. IV. 10.

Regius. IV. 62.

Mulier perquam crassa, difficulter concipit. V. 46. n.

Quanam facile abortiat. Ibid. 44. 45.

Bene colorata marem, male feminam concepit. Ibid. 42.

N

Narium constrictio, signum in morbis pessimum. p. I. 9.
e Naribus sanguinis fluxuri signa. Ibid. 35.

Dd

Na-

- Nasi perversio , pallor , livor nota sunt mortifera. Ibid. 15.*
Natura crassiores , citius intereunt. II. 44.
Naturarum , aliæ ad hyemem , aliæ ad æstatem , salubrius degunt. III. 2.
Natura , omne nimium nocet. II. 51.
Utiles motus adjuvandi , si deficient. IV. 1. n.
Conatus quinam reprimendi. Ibid.
Nervorum distentio , rigor. Ibid. 57. n. V. 6. n.
Rigore correpti , in 4. diebus pereunt. V. 6. n.
Nervorum distentionis signa in pueris. p. III. 35.
Nervorum distentioni pueri corpulentiores , somnolentique obnoxii. Ibid. n.
Nigra urina , pessima. p. II. 32. seq.
Niger vomitus , vitiosus. Ibid. 39.
Nigræ in urinis nubecula , mala. Ibid. 29.
Nigrum sputum , deterrimum. Ibid. 48. 51.
Nox gravis crîsim præcedit. II. 13.

O

- O** *Culi caligantes , lucemque aversantes , malum. VIII. 15.*
Illacrimantes , lumen fugientes sine ullo in iis vitio , malum. p. I. 13.
Oculorum doloribus , quæ conferunt. VI. 31. VII. 46.
Signa lethalia. VI. 52.
Perversio , concidentia , tumor , malum. p. II. 13. n.
Frequens motus , aut tardior , aut fixus intuitus , malum. Ibid.
Album , rubore perfusum , sordescque circa pupillam apparentes , malum. Ibid.
Frequens motus furorem prænunciat. p. I. 32.
Omentum , nisi reponatur , putrescit. VI. 58.
Ophthalmia quid. III. 11. n.
Sicca quanam. Ibid. 12. n.
Oris exulcerationes æstate gignuntur. Ibid. 21.
Osse nudato , erysipelas. VII. 19.
Osis abscessuri signa in ulceribus diuturnis. VI. 45. n.
Cor-

Corrupti caro livida , malum. VII. 2.

Cura ejusdem. Ibid. n.

Corruptionem abscessus ejusdem consequitur. VII. 74.

P

P *Alpebra per somnum non commissa, malum. I. 14.*

Pectus assidue nudare inflammato pulmone, exitiosum.

Ibid. 19. n.

Pedum , brachiorumque dispersio, in acutis pessima. Ibid.

Frigidorum nudatio frequens itidem pessima. Ibid.

Peripneumonia. III. 23. n.

Huic accedens phrenitis, malum. VII. 12.

Phrenitis. III. 30. n. VII. 12. n. VIII. 1.

Phthisi obnoxii. IV. 8. n.

Phthisis, imminētis signa post sanguinis sputum. VII. 15. n.

Phthisicis vomitus inutilis. IV. 7. n.

Funestus capillorum defluxus, sputique fœtor. V. 11.

Alvi fluxus , perniciosus. Ibid. 12. 14.

Hic tamen , non semper mortem indicat imminētem.

Ibid. 12. n.

Pleuritis. III. 23. n.

Eo citius finitur, quo citius apparet sputum. II. 12.

à Pleuride, & Peripneumonia alvi fluxus, malum. VI. 16.

à Pleuritide peripneumonia , malum. VII. 11.

Pleuritis in 14. diebus non sanata , suppurat. V. 8.

Pleuritici suppurati , quānam tempore ad phthisim transeant. Ibid. 15.

Pleuritidum graviorum sedes. VII. 11. n.

Podagra quosnam raro infestet. VI. 28. 29. n.

Finiri solet 40. diebus. VI. 49.

Quibus moveatur temporibus. Ibid. 55.

Ad nasum repens inveterata ferè funesta. Ibid. n.

Profluvio sanguinis delirium, convulsione accedens , malum. VII.

Pudenda retracta quid indicent. p. II. 10:

Pueri in diem vix sustinent. I. 13.

Qui-

- Quinam faciliè convulsionibus corripiantur.* III. 25. p.
 III. 35.
Pueris familiares abscessus. p. III. 34. n.
Itemque hamorrhagia. III. 27.
Humidum alimentum confert. I. 16.
Puerorum morbi quando finiantur. III. 28.
Puerulorum morbi. III. 24. 25.
Pulsus explorandus, ut signum. IV. 23. n.
Purgandum, in acutis raro. I. 24.
Purgandum initio morbi, materia turgente. Ib. 22. IV. 10.
Per ea loca quæ petit natura. Ibid. 21.
Purgatio immodica, periculosa. I. 3.
Purgationem præcedat hîmectatio corporis. II. 9.
Purgationis inferioris adhibendæ signa. IV. 20.
Puris, sanguinis, quæ mictio, exulcerationis est signû. IV. 75.
Puris optimi conditiones, p. I. 44.
Puris sputum phthisis sequitur. VII. 16.
A sanguinis sputo, malum. Ibid. 15.
Puris, quantum educendum, sectione. VI. 27.
Pus, dum sit febris, & dolor, urgent. II. 47.
Interdum sine febre, doloreque, gignitur. Ibid. n.
Pustulæ suppuratorum quales. p. II. 60. n.
Putredines quid. III. 16. n.
Genitalium æstate accidunt. Ibid. 21.

Q

- Q***uartana, qua maximè ætate invadat.* p. III. 29.
Æstate ingruit. Ibid. 21.
Autumno quoque oritur. Ibid. 22.
Solvitur interdum hamorrhoidibus, largaque hamorrhagia. VII. 3. n.
Quartana quanam breves, quanam longæ. II. 25.
Earum productio. Ibid. n.
Hibernæ, faciliè in acutos morbos transeunt. Ibid.
Ordinem variantes citius desinere solent. Ibid.
Convulsiones serè arcent, pelluntque. V. 70.
Quartana, sanguinis e naribus profluvium, inutile. VIII. 3.
 Hoc

Hoc tamen utile experiebatur Alpinus. ibid. n.
in Quartanam quanam febres mutari solite. p. III. 28.

R

- R** *Abies quanam in acutis exitiosa. Vlll. 16.*
Rachitis. III. 26. n.
Recidiva metus. IV. 61.
Refectioes nimia periculosa. l. 3.
Renum, & vesicae vitia in senibus difficilis solutionis.
V. 6.
Renum, vesicae exulcerationem quanam significant.
IV. 75.
Repletio evacuatione curatur, & e contra. II. 22.
Residere velle in acutis malum, pessimum vero pulmone
laborante. p. I. 23.
Respiratio facilis in acutis, magnum habet ad salutem mo-
mentum. ibid. 28.
Difficilis cum delirio in acutis mortifera. IV. 50.
Duplicata in acutis mala. IV. 68. VI. 54. n.
In morbis pectoris maximi facienda. p. I. 28. n.
Magna simul, & tarda in acutis pessima. Ibid. 27. n.
Frequens pectus indicat affectum. Ibid.
Frequens est etiam interdum ob vitia aliarum par-
tium. p. I. 27. n.
Visui facilis, agrotanti perquam difficilis interdum
accidit. Ibid.
Frigida perseverans lethalis est. Ibid. 28.
Respiratio difficilis multiplex. IV. 50. n.
Rigor quid. IV. 29.
Incidens non deficiente febre, agrotoque debili letha-
lis est. Ibid. 46.
Ex ebrietate, nisi recalescat ager, exitiosus. VII. 7. n.

Sex -

Sexto febris die apparens malus. IV. 29.

Quotidie accedens, quoti die febrem solvit. Ibid. 63.

Ardentem febrem discutit. IV. 58.

Rigor nervorum. Ibid. 57. n. V. 6.

Ructus acidus, frequensque, saepe pleuritidem arcet. VI. 33.

S

S *Anguis in ventrem effusus, putrescit. VI. 20.*

E naribus fluens, menstruis deficientibus, bonus. V. 33.

Sanguis, pus, squamula cum urina excreta, pravusque odor vesicae renumve exulcerationem significant. IV. 81.

Sanguis sponte mictus, venam in renibus ruptam declarat; ibid. 78.

Sanguinis e renibus, vesicaeque provenienti signa. IV. 78. n.

Sanguinis profluvium, convulsionem, singultumve movens, malum. V. 3.

Nocet ciborum coctioni. IV. 27.

Pueris familiare e naribus. III. 27.

Sanguinis haemorrhoidalis utilitas. IV. 25. n.

Sanguinem supra ferri, id est per os emitti, malum. ibid. 25.

Sanguis supra ferri solet multipliciter. ibid. n.

Sanguinis sputum unde emanet, signa. ibid.

Sanguis e pulmone quotupliciter sursum feratur. VII. 15. n.

Interdum sine tussi fertur. VII. 75. n.

Interdum etiam vomitu quasi quodam ejicitur. ibid.

Sanguinis e pulmone sputum, non semper post se trahit puris sputum. ibid.

San-

Sanguinis rejectio e pulmone phthisim invehit. Vll. 75.

Hanc tamen non perpetuo gignit. ibid. n.

Neque, si gignat, eam aque celeriter infert. ibid.

Sanguis spumans interdum ex hepate, utero, liene per pulmones extusitur. Vll. 75. n.

Sanguinis sputum sine febre minus periculosum. ibid. 37.

a Sanguinis sputo puris sputum. Vll. 15.

ad Sanguinis sputum adstringentia caute usurpanda.

Ibid. 37. n.

Satietas nimia periculosa. ll. 4.

Interdum sanis prodest. ibid. n.

Hec enim eos purgat. ibid.

Satiestate utebantur veteres quidam ad purganda corpora. ibid.

Satyriasmus. lll. 26. n.

Senes erudi, viridesque dicti. l. 13. n.

Facillime jeunium ferunt. ibid.

Quomodo nutriendi. ibid.

Senes decrepiti parum, & saepe nutriendi. l. 13. n.

Senes catarrhis cito extinguuntur. lll. 12.

Senibus proceritas corporis inutilis. ll. 54.

Senum morbi. lll. 31.

Sensuum internorum, auditusque abolitio in acutis lethifera. Vlll. 16.

Serenitates imbribus salubriores. lll. 15.

Sicca tussis, levisque per acutas febres sitim minuit. IV. 54.

Signorum consensus ad prænotionem rite instituendam requiritur. p. lll. 38.

Sincera dejectio quanam. Vll. 6. n.

Singultus a vomitu, oculorumque rubor, malum. ibid. 3.

A nimia purgatione in senibus perquam malus. ibid.

41. n.

Ex

- Ex superflua evacuatione, malus. V. 3.*
Ex hepatis inflammatione, malus. Vll. 17.
Somnus quomodo laborem faciat. ll. 1. n.
Laborem faciens quando occidat. ibid.
Juvans fere est salutis prænunciis. ibid.
Delirium sedans, plerumque bonus. ll. 2.
Modum excedens, malus. ibid. 3.
A crisi interdum producit. ibid. n.
Interdum trahitur post dolores. ibid.
Somnus multus, astusque assiduus in acutis, exitialis.
Vlll. 15.
Somnus in acuta febre, timores, aut convulsiones movens,
malus. lV. 67.
Neque noctu, neque die accedens, pessimum. p. ll. 12.
Sopor interdum ex pertinaci vigilia. ll. 27. n.
Spumofus sanguis e pulmone emittitur. V. 13.
Sputa mala quanam. lV. 47. n.
Salutaria. ibid.
Suppurationis metum incutientia. V. 8. n.
Sputum flavescere in pleuriide, bonum. p. ll. 44.
Cito, facileque ferri debet. ibid. 43.
Intense flavum, album, viscidum, rotundum, pra-
vum est. ibid. 46.
Admodum viride, spumofumque, malum. ibid. 47.
Nigrum omnium pessimum. ibid. 48.
Sanguineum in album laveque verti, optimum. p. ll.
48. n.
Quod pulmo non projicit, malum. ibid.
Flavo-rubrum in pleuriide landatur. ibid. 49.
Fœtens in suppuratis, mortale. p. ll. 63. n.
Stercus periculosum quodnam. p. ll. 20.
Sternutamentum in pulmonum inflammatione noxium.
ibid.

ibid. 50.

Partum adjuvat. V. 35.

Secundæ exitum promovet. *ibid.*

Delirio accedens mortale. *ibid.*

Struma. III. 26. n.

Stridor dentium in acutis, præter consuetudinem metuen-
das. p. l. 24.

In pueris dentientibus minus periculosus, quam in
adultis. *ibid.* n.

Stupor ex ictu capitis malus. VII. 14.

Sudor ubi, ibi morbus. IV. 38.

Partis cuiuspiam non semper malus. *ibid.* n.

Per somnum multus unde. *ibid.* 41.

Multus cum cibi fastidio quid postulet. *ibid.*

Febrim non solvens, neque minuens, malus. IV. 56.

Arsidus suppurationis interdum est signum. *ibid.*

74. n.

Semper fluens, purgationem desiderat. VII. 61.

Sudores saluberrimi quinam. p. l. 29.

Quinam pessimi. IV. 37. n. p. l. 29.

Frigidi in acutis mortem, in longis, morbi longitudi-
nem portendunt. IV. 37.

Quibus diebus fere salutare, quibus infidi, difficilef-
que. *ibid.* 36. p. l. 29.

Cum impetu erumpentes mali. VIII. 4.

Morbum producentes quinam. IV. 56. n.

Ob inflammationem, aut ob exsolutionem sæpe fiunt.

p. l. 30.

Sudoris lethalis nota. *ibid.*

a Sudore horrescere malum. VII. 4.

Suffusus aromatum muliebria ducit. V. 28.

Suppurati quinam. VI. 27. n.

Ee

Sup-

Suppuratio cum sputo bilioso procedens, formidanda. p.

ll. 53.

Quibus diebus erumpat. ibid. 57. 62.

Qua parte pectoris delitescat. ibid. 59. n.

Quibus notis indicentur. p. ll. 57. n.

Incipiens, ejusque signa. ibid. 58.

Suppurationem quam maturent. p. ll. 57. n.

Quinam effugiant, quinam moriantur. ibid. 56. 63.

Suppuratorum nonnulli 14. morbis die sunt in periculo. ibid. 55.

Suppuratio ex angina pulmonaris periculo non vacat. p. ll. 21. n.

A dolore ventris diuturno. Vll. 22.

Suppurationum intus excitatarum notæ. ibid. n.

Abditarum causæ. Vl. 41.

Surditatem in febribus quam tollant. lV. 60.

Suppiria luctuosa in acuto morbo mala Vl. 54.

T

T *Abes quid. III. 16. n.*

Tabes, strictius phthisis, ut plurimum a 18. ætatis anno ad 35. oriuntur. V. 9.

ad Tabem proclives juvenes. III. 29.

in Tabe exitiosum alvi profluvium. V. 14.

Fœtens sputum, capillorumque defluxus, signa sunt lephalia. ibid. 11.

Tabes autumnis sæpiissime incidunt. ll. 22.

Tabidis malus autumnus. ibid. 10.

Tabificos morbos gignunt squalliores. ibid. 16.

Tempora autumnales morbos præsagentia. ll. 4.

Tempora anni quibus ætatibus faveant. ibid. 18.

Temporum mutationes morbos pariunt. ibid. 1.

Tenesmus quid. VII. 27. n.

In gravidis periculum infert abortus. *ibid.*

Tertiana exquisita septem circuitibus fere finitur. IV. 59.

Testes, pudendaque retracta lethale in acutis periculum habent. VIII. 11. n. p. II. 10.

Tetanus quid. v. Rigor nervorum.

Occidit sæpe quarta die. V. 6.

Tetanus æstate frigida quandoque perfusio solvit. *ibid.* 21.

Timor, mæstitiaque perseverans melancholiæ signum. VI. 23.

Per somnum in acutis malus. IV. 67.

Tremor in acutis febribus, malus. VI. 26. n.

Interdum etiam criticus, salutarisque. *ibid.*

In lethargicis, pessimus. VIII. 8.

Tubercula, laboresque ad articulos longis in febribus. IV. 44.

Quibusnam arceantur evacuationibus. *ibid.* n.

Tuberculis in cute obortis, excretiones consideranda. II. 15.

Tuberculi intus rupii accidentia. VII. 8.

Intus orti varia nomina. *ibid.* n.

Tuberculum in pulmone disruptum interdum extemplo necat. *ibid.*

Tuberculo in meatu urinario suppurato, ruptoque solvitur dolor. VII.

Tumores molles, boni. V. 67.

Ante mortem fere concidunt. p. I. 25. n.

Externi laudantur parvi, eminentes, fastigiati in acutum: magni vero, planique damnantur. p. I 42.

Tumores articulorum, aliosque morbos interdum perfusio extenuat frigida. V. 25.

Tumores vulneribus, ulceribusque supervenientes sæpe convulsionem, & delirium arcent. V. 65.

Ven-

Ventris raro suppurantur. p. I. 40.

Aliquando in scirrhum, aliosque morbos transeunt.

Ibid. 38. n.

Hypochondriorum saepe suppurantur. ibid. 40.

Sub umbilico constitui rarissime suppurantur. ibid.

In vulneribus non apparentes, malum. V. 66.

Tumores hypochondriorum per initia mortem proximam denunciant. p. I. 34.

Tumorum internorum laudabilium signa. p. I. 43.

Tumorum suppuratio quando expectanda. p. I. 38.

Hi ipsi tamen elapsis 20. diebus solent suppurari. ib. nisi haemorrhagia discutiantur. ibid. 35.

Turgentia humorum. I. 22.

Plerumque dcest. ibid.

Tusses hieme maxime exitantur. III. 23.

In valde senibus curatu difficiles. II. 40.

Sicca leviter irritantes in ardenti febris non admodum siticulosae. IV. 54.

Tusses, & tubercula vere gignuntur. III. 20.

Tussis hydropi superveniens, mala. VI. 35. VII. 47.

Tympanitis hydrops. IV. 11.

Tympaniide sublatorum anatomica observatio. ibid. n.

V

V*arices, haemorrhoidesque melancholicis furentibus opitulantur. VI. 21.*

Variola, morbillique ante mortem concidunt, pallent, liventve. p. I. 25. n.

Vena ubi secanda ad urinae difficultatem. VI. 36. n.

Ventris nomine quid intelligendum. I. 15. n.

Venter mollis, mediocriterque corpulentus esse debet in morbis. p. II. 19.

Ven-

Ventrem imum nimium exstenuari in morbis , malum. II.

35. VIII. 5. n.

Ventris , lumborumque dolor pertinax in siccum transit hydropem. IV. 11.

Profluvium ex longo morbo , malum. VIII. 5.

Tumores qui cerebro, qui raro suppurantur. p. I. 40.

Ventres , hyeme , & vere calidissimi. I. 15.

Ventriculi dolor, aestusque ingens in acutis, malum. IV. 65.

Veris morbi. III. 20.

Vermes ascarides. Ibid. 26. n.

Verruca quid. Ibid. 26.

Vesicae laborantis indicia. VII. 39

Exulceratae signa. IV. 81.

Affectae indicia sunt mictio sanguinis, urinaque difficultas, ac dolor. Ibid. 80.

Vesicae , renumve ulcus, puris , sanguinisque mictio indicat. IV. 7.

Vesicae , renumque vitia, difficulter curantur in senibus. VI. 6.

Vesica tumida , dura, dolens , cum acuta febre mortem minatur. p. II. 72.

Vesicae dolores inflammatorii , ut plurimum exitiales. Ibid.

Inflammatiō, solvitur pure albo, levi, aequalique prodeunte. Ibid. 73.

Quae purulenta non solvitur urina vesicae inflammatio, brevi enecat. Ibid. 74.

Inflammatiō alvum siccam efficit. Ibid. 72.

Inflammatiō frequens in pueris. Ibid. 75.

Vesicam inflammata mala comitantia. p. II. 74. n.

Vitius ratio in febrium circuitibus. I. 19.

Vitius humidus febricitantibus confert. Ib. 16.

Cautiones quas postulet. Ibid. 17.

Tenuis apud antiquos qualis. I. 4. n.

Tenuis, periculosus morbis in longis. Ibid.

Extreme tenuis, qualisnam probabiliter fuerit. Ibid. 4. n.

Plenior declinante morbo adhibendus. I. 7.

Tenuissimus morbo convenit videnti. Ibid. 8.

In victu acutorum morborum quid observandum. Ib. 9. 10.

Nimium tenui errores graviores, quam in paulo pleniore.

Ibid. 5.

Vigilia, modum excedens mala. II. 3.

Vigilia, somnique modum, excedentium signa. Ibid. 3. n.

Vigiliam longam somnus sequitur longior. Ibid.

Vigilia pertinax interdum in soporem migrat. II. 27. n.

Vigilia, per acutas febres quæ mala pariant. VII. 18. n.

In acutis febribus assidue delirium præsagiunt. p. II. 12.

Vigor morbi. I. 8. n. II. 29. n.

Purgationem respuit. II. 29.

Vinum, famem minuit. Ibid. 21.

Vires, potenter instaurat. Ibid. 11. n.

Sistit interdum vomitum. Ibid. 21. n.

Vini potio ad urinæ difficultatem. VII. 58.

Vino jurulenta uberius nutriunt. II. 11. n.

Vitiligo quid. III. 20. n.

Visus sæpè citius, quam auditus, ante mortem perit. IV. 49. n.

Ulcus, quale ante mortem. p. I. 25.

Ulcera in hydropicis, ægrè sanantur. VI. 8.

Diuturniora, ossis abscissum solent parere. Ibid. 45.

Ulcus, vulnerumque tumores, sæpè convulsionem arcent.

V. 65.

in Ulceribus, vulneribusque orta, pulsatio sanguinis

movet profluvium. VII. 21.

Unguium, digitorumque lethalis color. VIII. 12.

Vocis privatio, e capitis dolore ferè mortifera. p. III. 31. n.

Volvulus, ex urinæ stillicidio. VI. 44.

Vomica, tuberculique ruptio, interdum repente suffocat.

VII. 8. n.

Vomica, quibus rumpantur diebus. p. II. 57.

Vomitum frequens, capitis dolorem non solvens, pessimus.

p. III. 31. n.

Cavendus in tabidis, inque ad tabem proclivibus. IV. 8.

Quibus periculosus hominibus. Ibid. 7. n.

Blandis ciendus remediis. Ibid. 4. n.

Quinam salutaris. I. 2. n. p. II. 38.

Viridis, lividus, niger, vitiosus est. p. II. 39.

- Lividus, fœtidusque, perniciosus. Ibid. 41.*
Vomitum quæ indicent. V. 12. n. 17. 18.
Imminentem quæ præfagiant. p. III. 31. & n.
Vomentes difficulter, crassique per inferiora purgandi.
IV. 7. n.
Uretra tubercula non semper suppurantur. Ibid. 82. n.
Urina, minus morbi sedem, quam labor, dolorve partis indicat. IV. 76. n.
Carunculas, capillose, habet sæpè à renibus. Ibid.
Furfuracea vesicam scabie, veluti quadam affectam significat. Ibid. 77.
Arenosa, calculo vesicam laborare declarat. IV. 79.
Bullas habens quid indicet. VII. 34.
Cum alba nubecula laudatur, vituperatur cum nigra.
p. II. 29.
Tenuis, crudum morbum significat. Ibid. 30.
Fœtens, nigraque, & crassa, periculum ostendit. Ibid.
32.
In adultis nigra, in pueris aquosa damnatur. Ibid. 33.
Cui pinguedo innatat, hominem tabe consummi significat.
p. II. 35.
Tenuis in acutis perseverans cum salutaribus signis abscessum fore significat. Ibid. 34.
Urina difficultas tollitur, suppurato, ruptoque uretra tuberculo. VII. 57.
Difficultatem, venæ sectio juvat. VI. 36.
Stillicidii causæ aliquot. V. 58.
Urina in febribus turbata, dolorem capitis prænunciant.
IV. 70.
Tenuis, aquosæque in phreniticis malæ. Ibid. 72.
Distantes,urbationem indicant. VII. 33.
Urinarum sedimina, veluti farina crassior, quid denotent.
Ibid. 37.
Nubecula. IV. 71.
Tenuum pericula. Ibid. 72. n.
Uteri erysipelas lethale malum in gravidis. V. 43.
Os compressum sterilitatem invehit. Ibid. 46.

Os connivet , contrahiturve in gravidis. Ibid. 51.

Hæmorrhagiam sistit cucurbitula ad mammas apposita.

Ibid. 50.

Uterina suffocationi sternutatio accedens , bonum. Ibid. 35.

Vulnera interna quædam mortalia. VI. 18.

*Vulneribus magnis , pravisque , si non superveniat tumor ,
malum admodum est. V. 66.*

FINIS.

IODALIA

Granulado Yodo-Tánico Fosfatado

La forma granulada
es la más práctica
y la más recomen-
dable en la medi-
cación yodo-tánica.



BONETTI FRÈRES

12, RUE VAVIN, PARIS

